

- 44★★★★
☑☑☑ 喘息の補助診断として末梢血好酸球を測定することが望ましい。
- 45★★★★
☑☑☑ 喫煙歴がある場合は呼吸機能検査を実施してCOPDとの鑑別を行う。
- 46★★★★
☑☑☑ 喀痰とは、下気道で過剰に産生された分泌物が、口腔内を経て体外に排出されたものの総称である。
- 47★★★★
☑☑☑ 気道分泌物には抗原特異的に作用するIgMや非特異的な抗菌蛋白が含まれる。
- 48★★★★
☑☑☑ 気道上皮の表面は気道分泌により3層性に被覆されている。
- 49★★★★
☑☑☑ 気道上皮の表面の下層はゲル層と上層はゾル層である。
- 50★★★★
☑☑☑ 粘膜下腺の粘液細胞からMUC5B、杯細胞からMUC5AC、MUC5Bが産生され、ゲル層を形成する。
- 51★★★★
☑☑☑ MUC5Bは粘膜下腺の粘液細胞から分泌される際に、繊維が束になったロープのような形状で気道表面に向けて分泌される。
- 52★★★★
☑☑☑ MUC5ACは、糸状、シート状の形状をしている。
- 53★★★★
☑☑☑ MUC5Bは喘息の病態への関与が示唆されている。
- 54★★★★
☑☑☑ 粘膜下腺と杯細胞の分泌は交感神経優位の自律神経支配を受けている。
- 55★★★★
☑☑☑ 生理的な気道分泌は粘膜下腺からの分泌が大部分を占めている。
- 56★★★★
☑☑☑ 粘液腺には α -アドレナリン受容体、漿液腺には β -アドレナリン受容体が多く存在する。
- 57★★★★
☑☑☑ 喘息においてSABAの過剰使用やLABAを単独投与した場合には、病態の悪化や重症化をきたす可能性がある。
- 58★★★★
☑☑☑ 喀痰の膿性は細菌感染に対する特異的で感度の高いマーカーである。
- 59★★★★
☑☑☑ 吸入ステロイドでは喘息の喀痰症状は改善しない。