

- 60★★★★ 喀痰調整薬は粘液溶解薬、粘液修復薬、粘液潤滑薬、気道分泌細胞正常化薬の4種類に大きく分けられる。
☑☑☑
- 61★★★★ 喘息においてアレルギー検査は有用でない。
☑☑☑
- 62★★★★ アレルギー検査はアレルゲン免疫療法や抗IgE抗体療法（オマリズマブ）の適応について判断する際にも有用である。
☑☑☑
- 63★★★★ 喘息の発症に最も関与するアレルゲンはスギである。
☑☑☑
- 64★★★★ アレルギー検査には主に皮膚テストと血液を用いて行うアレルゲン特異的IgE抗体価の測定がある。
☑☑☑
- 65★★★★ 日本におけるアレルゲン血液検査では、各項目を個別に選択する「単項目測定法」のみが実施できる。
☑☑☑
- 66★★★★ アレルゲン血液検査の単項目測定法では、保険診療内で10項目まで測定可能である。
☑☑☑
- 67★★★★ ダニとハウスダストのIgEは95%以上の相同性がある。
☑☑☑
- 68★★★★ アレルゲン血液検査の項目は患者ごとに変更せず同じものを測定することが推奨されている。
☑☑☑
- 69★★★★ アレルゲン血液検査項目における真菌の主要アレルゲンは、アスペルギルス、アルテルナリア、トリコフィトンである。
☑☑☑
- 70★★★★ アレルゲン血液検査項目における花粉の主要アレルゲンは、ヒノキ、ハンノキ、ギョウギシバ、オオアワガエリである。
☑☑☑
- 71★★★★ 呼気中一酸化窒素濃度（FeNO）は気道上皮細胞の誘導型NO合成酵素に由来する。
☑☑☑
- 72★★★★ 2型好酸球性喘息では、FeNOが低値となる。
☑☑☑
- 73★★★★ FeNOはIL-4、IL-13の刺激下で発現が低下する。
☑☑☑
- 74★★★★ FeNOは簡便かつ非侵襲的であるため、喘息の診断や気道炎症の評価法として有用である。
☑☑☑
- 75★★★★ 日本人の非喫煙者・アレルギー疾患のない健常成人のFeNOの平均値は15 ppbである。
☑☑☑