

- 155★★★ 過敏性肺炎では抗原と特異抗体(Ⅲ型アレルギー)と感作リンパ球(Ⅳ型アレルギー)が関与している。
☑☑☑
- 156★★★ 過敏性肺炎のうち、わが国では夏型過敏性肺炎と鳥関連過敏性肺炎が多い。
☑☑☑
- 157★★★ 夏型過敏性肺炎は古い家屋に増殖するスエヒロタケが原因である。
☑☑☑
- 158★★★ 慢性過敏性肺炎で薬物療法が必要な症例は進行性であり、5年生存率は50~70%と予後不良である。
☑☑☑
- 159★★★ 過敏性肺炎では約50%の症例でfine cracklesを聴取する。
☑☑☑
- 160★★★ 過敏性肺炎の画像では小葉中心性の粒状影・辺縁不明瞭な小結節・汎小葉性のすりガラス影を呈する。
☑☑☑
- 161★★★ 過敏性肺炎では血清KL-6とSP-Dが上昇する。
☑☑☑
- 162★★★ 過敏性肺炎では下肺野優位に陰影が出現する。
☑☑☑
- 163★★★ 過敏性肺炎の治療の基本は抗原回避であり、呼吸不全例ではステロイド治療を行う。
☑☑☑
- 164★★★ 急性好酸球性肺炎と慢性好酸球性肺炎はともに女性に多い。
☑☑☑
- 165★★★ 慢性好酸球性肺炎では喘息の合併が多い。
☑☑☑
- 166★★★ 慢性好酸球性肺炎の胸部X線検査ではphotographic negative of pulmonary edemaがみられることが多い。
☑☑☑
- 167★★★ 好酸球性肺炎のメディエーターとしてeotaxinが関与する。
☑☑☑

