

5 特発性間質性肺炎

重要度

設問

特発性肺線維症 (idiopathic pulmonary fibrosis: IPF)

1~29

- 1★★★★
☑☑☑ 男性の発症リスクは女性に比べて高い。
- 2★★★★
☑☑☑ ほとんどが 50 歳以上の成人に発症する。
- 3★★★★
☑☑☑ 画像・病理組織パターンは通常型間質性肺炎 (usual interstitial pneumonia: UIP) である。
- 4★★★★
☑☑☑ 発症時には乾性咳嗽や労作時呼吸困難はみられない。
- 5★★★★
☑☑☑ 肺底部の捻髪音 (fine crackles) は 90%前後に聴取される。
- 6★★★★
☑☑☑ ばち指は 90%前後に認められる。
- 7★★★★
☑☑☑ チアノーゼ、肺性心、末梢性浮腫は IPF の末期に認められる。
- 8★★★★
☑☑☑ 血液検査は IPF の確定診断に有用である。
- 9★★★★
☑☑☑ 血清 KL-6、SP-D、SP-A が異常高値となる割合は 90%前後である。
- 10★★★★
☑☑☑ 血清 LDH は上昇しない。
- 11★★★★
☑☑☑ 急激な血清 KL-6 上昇がみられた場合、ニューモシチス肺炎やサイトメガロウイルス (cytomegalovirus: CMV) 肺炎を考慮する。
- 12★★★★
☑☑☑ 胸部単純 X 線ではびまん性網状影が両側中下肺野、末梢側優位に広がり、多くは肺の容積減少を伴う。