

25~29 ★★★	IPF の発症危険因子はどれか。
25 ☑☑☑	喫煙
26 ☑☑☑	胃食道逆流症
27 ☑☑☑	粉塵吸入
28 ☑☑☑	糖尿病
29 ☑☑☑	ヒト白血球抗原 (HLA)

IPF の診断 30 ~ 42

- 30★★★
☑☑☑ 診断に際しては、原因の特定できるほかの間質性肺疾患を臨床的に除外する。
- 31★★★
☑☑☑ 確定診断には外科的肺生検 (surgical lung biopsy: SLB) が必須である。
- 32★★★
☑☑☑ 臨床像、HRCT 所見から IPF は診断可能である。
- 33★★★
☑☑☑ SLB が施行された症例では、HRCT 所見と SLB 所見の組み合わせで判断する。
- 34★★★
☑☑☑ 呼吸器専門医、画像診断医、病理診断医が多職種で協議し (multi-disciplinary discussion: MDD) 総合的に判断することが重要である。
- 35★★★
☑☑☑ 診断、予後評価に気管支肺胞洗浄は必須である。
- 36★★★
☑☑☑ 気管支肺胞洗浄は他疾患を除外するために有効な場合がある。
- 37★★★
☑☑☑ 気管支肺胞洗浄液の細胞分画ではリンパ球比率が正常に近い。