

63~67 ★★★	ビルフェニドンについて正しいのはどれか。
63 ☒ ☒ ☒	急性増悪などの急性期における治療効果は示されていない。
64 ☒ ☒ ☒	主な有害事象に食欲不振などの消化器症状がある。
65 ☒ ☒ ☒	体重増加がみられることが多い。
66 ☒ ☒ ☒	光線過敏症が特徴的な有害事象である。
67 ☒ ☒ ☒	光線過敏症がみられたらすぐに使用を中止する。
68~72 ★★★	ニンテダニブについて正しいのはどれか。
68 ☒ ☒ ☒	主な有害事象は下痢である。
69 ☒ ☒ ☒	半数以上に体重減少がみられる。
70 ☒ ☒ ☒	光線過敏症が特徴的な有害事象である。
71 ☒ ☒ ☒	重篤な有害事象に血栓塞栓症がある。
72 ☒ ☒ ☒	重篤な有害事象に消化管穿孔がある。
73~77 ★★★	特発性肺線維症（IPF）の治療について、正しいものを選び。
73 ☒ ☒ ☒	禁煙は必須である。
74 ☒ ☒ ☒	感染予防として肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンの接種が推奨される。
75 ☒ ☒ ☒	在宅酸素療法による長期酸素療法は生存率を向上させる。