

113★★★
☑☑☑

FVC や FEV1 の経年的低下は軽度にとどまる。

114★★★
☑☑☑

DL_{CO} は低下しない。

115★★★
☑☑☑

原発性肺癌の合併が多い。

116★★★
☑☑☑

肺高血圧の合併は少ない。

特発性間質性肺炎 (idiopathic interstitial pneumonias: IIPs)

117★★★
☑☑☑

IPF は IIPs には分類されない。

118★★★
☑☑☑

IIPs は原因を特定しえない間質性肺炎の総称である。

119★★★
☑☑☑

膠原病が原因の NSIP は IIPs に分類される。

120★★★
☑☑☑

既存の疾患概念に当てはまらない疾患は分類不能型と診断される。

121★★★
☑☑☑

上葉優位型の肺線維症である idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis (IPPFE) は IIPs に分類される。

122★★★
☑☑☑

日本では、IPF とは異なる重症度分類を用いる。

123★★★
☑☑☑

疾患の挙動 (disease behavior) に応じて臨床分類と治療目標を定めることが推奨されている。

特発性 NSIP 124 ~ 135

124★★★
☑☑☑

特発性 NSIP と診断した症例の中で経過中に膠原病を発症する症例がある。

125★★★
☑☑☑

好発年齢は 40~50 歳代である。

126★★★
☑☑☑

男女比 7:3 で男性に多い。