

151★★★ 副腎皮質ステロイドでは効果が不十分のため免疫抑制剤を併用することが多い。
☑☑☑

152★★★ 副腎皮質ステロイド治療後も再発することが多い。
☑☑☑

IPPFE/上葉優位型肺線維症 153 ~ 165

153★★★ HRCT で病変の主座が両側上葉にある慢性線維化性間質性肺炎である。
☑☑☑

154★★★ IPPFE は病因となる基礎病態や原因疾患を同定しえない原因不明の PPFE である。
☑☑☑

155★★★ 慢性期の移植片対宿主病は二次性の PPFE の原因と推定されている。
☑☑☑

156★★★ るいそうが認められる頻度は少ない。
☑☑☑

157★★★ 扁平胸郭がしばしば認められる。
☑☑☑

158★★★ 気胸を合併することは少ない。
☑☑☑

159★★★ FVC は低下する。
☑☑☑

160★★★ 残気率は低下する。
☑☑☑

161★★★ 胸部単純 X 線では両側肺門の挙上がみられる。
☑☑☑

162★★★ 胸部 CT では胸膜に直行する太い線状影や気管支血管束の肥厚がみられる。
☑☑☑

163★★★ 副腎皮質ステロイドが有効である。
☑☑☑

164★★★ 慢性経過中、感染症の合併は稀である。
☑☑☑

165★★★ IPF と同様に予後不良である場合がある。
☑☑☑