

ARDS のベルリン定義 10 ~ 15

- 10★★★
☑☑☑ 侵襲または呼吸器症状の出現・悪化から 10 日以内の発症であることが必要条件である。
- 11★★★
☑☑☑ 両側性の肺陰影が診断基準に含まれる。
- 12★★★
☑☑☑ 右心カテーテル検査により、左心不全のみでは病態が説明困難であることを確認する。
- 13★★★
☑☑☑ 陽圧換気 (positive end-expiratory pressure: PEEP) 0 cmH₂O で PaO₂/FiO₂ 300 mmHg 以下の酸素化障害がある。
- 14★★★
☑☑☑ PaO₂/FiO₂ 120 mmHg は重症に分類される。
- 15★★★
☑☑☑ PaO₂/FiO₂ 250 mmHg は急性肺障害 (ALI) に分類される。
- 16★★★
☑☑☑ 小児についての Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference (PALICC) の定義では片側のみの胸部陰影でも ARDS と診断される。

ARDS の人工呼吸管理 17 ~ 27

- 17★★★
☑☑☑ 早期気管切開が原則として推奨される。
- 18★★★
☑☑☑ 初期の呼吸管理として、非侵襲的陽圧換気 (NPPV) は検討してよい。
- 19★★★
☑☑☑ 1 回換気量は実測体重を元に 6~8 mL/kg に設定することが望ましい。
- 20★★★
☑☑☑ プラトー圧が 30 cmH₂O 以下になるように設定する。