

21★★★★
☑☑☑

中等症以上の ARDS では高めの PEEP を用いる。

22★★★★
☑☑☑

高頻度振動換気法 (high frequency oscillatory ventilation: HFOV) が推奨されている。

23★★★★
☑☑☑

重症度を問わず筋弛緩薬を用いた人工呼吸管理が推奨される。

24★★★★
☑☑☑

中等症・重症例において、腹臥位療法を行う。

25★★★★
☑☑☑

通常の人工呼吸管理で対応できない重症 ARDS では体外式膜型人工肺 (extracorporeal membrane oxygenation: ECMO) が選択肢となる。

26★★★★
☑☑☑

高濃度酸素曝露による肺損傷を避けるため、吸入酸素濃度 80% 以下での管理を目標とする。

27★★★★
☑☑☑

プロトコル化された人工呼吸器離脱を行うことが推奨される。

28★★★★
☑☑☑

ARDS では肺動脈カテーテルを用いた水分管理が推奨される。

29★★★★
☑☑☑

ARDS 患者では ARDS でない人工呼吸患者と比べ、人工呼吸器関連肺炎の発生率が高い。

30★★★★
☑☑☑

ARDS では全例で抗菌薬投与が推奨される。

ARDS の治療薬 31 ~ 38

31★★★★
☑☑☑

副腎皮質ステロイド大量療法が推奨されている。

32★★★★
☑☑☑

好中球エラスターゼ阻害薬は、熱傷や外傷に伴う ARDS において積極的に投与する。