


疾患と気管支肺胞洗浄液 (BALF) 所見との組み合わせ


26 ~ 29

26★★★★



肺胞蛋白症 — 白濁した BALF (bronchoalveolar lavage fluid)

27★★★★



肺胞出血 — 血性の BALF

28★★★★



過敏性肺炎 — BALF 中の好中球増多

29★★★★




BALF 中の好酸球増多やリンパ球減少がみられる場合、副腎皮質ステロイドの治療効果が期待できる。

免疫チェックポイント阻害薬における薬剤性肺障害の特徴


30 ~ 3

30★★★★



腫瘍周囲のすりガラス陰影

31★★★★




薬剤投与 1 年後以降の遅発性に起こることはない。

タバコ


32 ~ 35

32★★★★




2020 年 4 月から全ての飲食店で原則屋内禁煙となった。

33★★★★




新型タバコ (非燃焼・加熱式タバコや電子タバコ) はニコチンが含まれておらず、依存性はない。

34★★★★




呼吸器学会は電子タバコの使用を推奨していない。

35★★★★



再喫煙の多くは、禁煙開始後 3 ヶ月以降に発生する。

36★★★★



肺癌に対する放射線治療中に放射線性肺炎を発症した場合、すぐに副腎皮質ステロイドによる治療を開始する。