

8

全身疾患

重要度	設問
1★★★★ ☑☑☑	特発性肺線維症(idiopathic pulmonary fibrosis: IPF) の診断後、約半数で膠原病の合併が明らかとなる。
2★★★★ ☑☑☑	間質性肺炎に胸水を合併した場合、膠原病の合併を考慮する。

関節リウマチに伴う肺病変 3～8

3★★★★ ☑☑☑	濾胞性細気管支炎を呈することがある。
4★★★★ ☑☑☑	閉塞性細気管支炎を呈することがある。
5★★★★ ☑☑☑	非特異性間質性肺炎(non-specific interstitial pneumonia: NSIP) の頻度が高い。
6★★★★ ☑☑☑	メトトレキサート(methotrexate: MTX) を使用中の患者にリンパ腫が合併することはない。

7~8 ★★★★	関節リウマチを患う60歳女性。MTXを10年使用して関節症状は落ち着いている。血液検査では抗CCP抗体やCRPの上昇はみられない。1年前より徐々に呼吸困難が出現し、CTでは両側肺野に粒状影新出した。肺組織の病理学的検査ではリンパ球浸潤とリンパ濾胞がみられた。本例に対する対応について正しいものはどれか。
7 ☑☑☑	MTXを中止する。
8 ☑☑☑	ステロイドの使用を検討する。