

強皮症に伴う肺病変


9 ~ 10

9 ★★★



限局型、全身型ともに間質性肺炎の頻度は低い。

10 ★★★




長期的な予後は肺高血圧症の合併により悪化する。

多発筋炎・皮膚筋炎に伴う肺病変


11 ~ 18

11 ★★★



clinically amyopathic dermatomyositis における肺の病理学的検査では、びまん性肺胞障害がみられる。

12 ★★★




悪性腫瘍の合併を考慮する必要はない。

13~16

★★★


50 歳男性。2 週間前から呼吸困難が出現し、近医で胸部 CT を撮影したところ、急速進行性間質性肺炎を疑う所見がみられた。身体所見では肘発赤、近位指節間関節の腫脹を伴っていた。下記のうち行うべき検査はどれか。

13




抗 MDA-5 抗体

14




血清アンジオテンシン転換酵素

15



血清可溶性インターロイキン 2 受容体

16




抗 SS-A 抗体

17~18

★★★


45 歳女性。手指の先端指腹側面の角質化に色素沈着や紅斑を伴う手をしており、胸部 CT で NSIP パターンの間質性肺炎がみられた。この疾患に対して治療に先立ち行う検査について、正しいものはどれか。

17



抗 ARS 抗体

18



HBs 抗原、HBs 抗体

