

31~33 ★★★	50 歳女性。胸部 CT で両側広範囲にすりガラス陰影を認め、血液検査でヘモグロビンの低下と MPO-ANCA 陽性がみられた。下記の設問の正誤を答えよ。
31 ☑☑☑	尿検査を追加する。
32 ☑☑☑	気管支肺胞洗浄液では鉄貪食マクロファージがみられる。
33 ☑☑☑	ヘモグロビン補正を行うと、呼吸機能検査の拡散能は低下する。
34~37 ★★★	強皮症関連間質性肺炎により、経年的に努力性肺活量の低下がみられている 52 歳女性。下記の設問の正誤を答えよ。
34 ☑☑☑	副腎皮質ステロイドパルス療法を検討する。
35 ☑☑☑	免疫抑制剤には抗線維化効果が期待できる。
36 ☑☑☑	抗線維化薬の導入を検討する。
37 ☑☑☑	リコンビナントトロンボモジュリンを検討する。

IgG4 関連疾患に伴う肺病変 38 ~ 44

- 38**★★★
☑☑☑ 画像所見では縦隔リンパ節腫大、気管支壁 / 気管支血管束の肥厚、小葉間隔壁の肥厚がみられる。
- 39**★★★
☑☑☑ 血清 IgG4 高値であれば診断できる。
- 40**★★★
☑☑☑ 治療には副腎皮質ステロイド薬を用いる。