

41~44

★★★★

胸部 CT で両側びまん性に小葉間隔壁の肥厚を伴い、縦隔リンパ節腫大を認めている 65 歳男性。自己免疫性膵炎の既往がある。確定診断のために外科的肺生検が行われた。病理医に依頼すべき免疫染色はどれか。

41

☑☑☑

CD4

42

☑☑☑

CD8

43

☑☑☑

IgG4

44

☑☑☑

PD-L1

サルコイドーシス

45 ~ 59

45★★★★

☑☑☑

霧視、羞明、飛蚊症を呈することがある。

46★★★★

☑☑☑

健診の胸部 X 線で発見されることは稀である。

47★★★★

☑☑☑

皮疹や結節性紅斑を伴うことがある。

48★★★★

☑☑☑

縦隔リンパ節腫脹は稀である。

49★★★★

☑☑☑

肺野病変は小葉中心性粒状影を呈する。

50★★★★

☑☑☑

血中可溶性インターロイキン 2 受容体は正常値である。

51★★★★

☑☑☑

血清アンジオテンシン転換酵素が高値となる。

52★★★★

☑☑☑

インターフェロン- γ 遊離試験が陽性となる。

53★★★★

☑☑☑

PET CT で肉芽腫性病変に ^{18}F -FDG (フルオロデオキシグルコース) が集積する。