

アミロイドーシス 81 ~ 86

- 81 ★★★
☑☑☑ アミロイドーシスの胸部病変には、気管・気管支型、結節性肺実質型、びまん性肺胞隔壁型、胸膜病変型がある。
- 82 ★★★
☑☑☑ 気管・気管支型の典型的な初期症状は胸痛である。
- 83 ★★★
☑☑☑ 結節性肺実質型の典型的な初期症状は血痰である。
- 84 ★★★
☑☑☑ びまん性肺胞隔壁型では、胸部 CT で線状影・網状影・粒状影が混在する。
- 85 ★★★
☑☑☑ 胸膜病変型では胸膜肥厚のみがみられ、胸水が貯留することはない。
- 86 ★★★
☑☑☑ 確定診断には、生検によりアミロイドを病理学的に証明することが必要である。

悪性リンパ腫に伴う肺疾患 87 ~ 96

- 87 ★★★
☑☑☑ mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) リンパ腫を主体とする成熟 B 細胞腫瘍が多数を占める。
- 88 ★★★
☑☑☑ 肺における MALT リンパ腫は 20~30 歳代に好発する。
- 89 ★★★
☑☑☑ MALT リンパ腫では t(11;18)(q21;q21) 転座の頻度が多い。
- 90 ★★★
☑☑☑ びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫 (diffuse large B-cell lymphoma: DLBCL) は胸部原発のリンパ腫で最も多い。
- 91 ★★★
☑☑☑ DLBCL は MALT リンパ腫と比較して進行が緩徐であることが多い。
- 92 ★★★
☑☑☑ DLBCL の治療は R-CHOP による多剤併用療法が中心である。
- 93 ★★★
☑☑☑ メトトレキサート使用中にリンパ増殖性疾患を合併することがある。
- 94 ★★★
☑☑☑ メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患は多発の結節影・腫瘤影、浸潤影を呈することが多い。