

じん肺の画像 10 ~ 13

10★★★★
☒☒☒ 珪肺の粒状影、結節影は上肺野に生じやすい。

11★★★★
☒☒☒ 農夫肺ではリンパ節の卵殻状石灰化をきたす。

12★★★★
☒☒☒ 胸膜プラークは肺尖に生じやすい。

13★★★★
☒☒☒ 石綿肺の網状影は上肺野優位に生じる。

石綿関連肺疾患 14 ~ 23

14★★★★
☒☒☒ 胸膜プラークは石綿の高濃度曝露で生じる。

15★★★★
☒☒☒ 胸膜プラークは癌化しない。

16★★★★
☒☒☒ びまん性胸膜肥厚は、広範囲に胸膜肥厚を呈し、拘束性換気障害をきたす。

17★★★★
☒☒☒ びまん性胸膜肥厚は、多くが良性石綿胸水に続発する。

18★★★★
☒☒☒ 石綿肺は曝露から40年以上経過してから発症する。

19★★★★
☒☒☒ 石綿肺は曝露中止後も徐々に線維化が進行する。

20★★★★
☒☒☒ 石綿肺は低濃度曝露でも生じる。

21★★★★
☒☒☒ 中皮腫は高濃度曝露がないと生じない。

22★★★★
☒☒☒ 国内在住環境下では中皮腫の原因は石綿であり、中皮腫の罹患は即、石綿曝露によるものと診断される。

23★★★★
☒☒☒ 中皮腫、石綿肺癌は減少傾向である。

