

B

急性気管支炎
acute bronchitis

到達目標

- 急性気管支炎の原因微生物について列挙できる
- 急性気管支炎の症候が説明できる
- 急性気管支炎に対する適切な治療を行うことができる

病因・病態

急性気管支炎は気管支粘膜における急性炎症であり、原因微生物はライノウイルス、コロナウイルス、インフルエンザウイルス、パラインフルエンザウイルス、アデノウイルス、RSウイルス、ヒトメタニューモウイルス、新型コロナウイルスなどのウイルスが約

90%と大部分を占める¹⁻³⁾。その他、一部では百日咳菌や肺炎マイコプラズマ（以下、マイコプラズマ）、肺炎クラミジアも原因菌となる¹⁻³⁾。基礎疾患のない成人において、その他の細菌感染が急性気管支炎の直接原因となるかどうかは明確にはされていない。基礎に慢性呼吸器病変がある場合や全身的に免疫の抵抗力の低下がある患者などでは、ウイルス感染に続いて肺炎球菌やインフルエンザ菌などによる二次性の細菌感染をきたすことがある。

症候・身体所見

急性気管支炎の臨床症状は咳嗽が特徴であり、通常は5日間以上続き、多くは1～3週間持続する^{1,2)}。略




図1 百日咳診断のフローチャート

[小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会（作成）：小児呼吸器感染症診療ガイドライン 2022，協和企画，p100，2022 より許諾を得て一部改変し転載]