

治療と予後

治療の第一歩は粉じん曝露の回避である。防護マスクの使用のほか、職場の配置転換や変更など、産業医学的な配慮が必要なこともある。薬物療法としては副腎皮質ステロイド薬や免疫抑制薬が用いられるが、効果については確立してない。予後は症例によりさまざまで、難治性気胸を繰り返した症例や呼吸不全から肺性心に至った症例、肺癌を合併した症例など、決して予後は良好ではない。

Advanced

■超硬合金肺と元素分析

超硬合金の主な構成成分であるタングステンとコバルトは通常肺組織で検出される元素ではないことから、生体肺組織の元素分析が有用である^{A)}。外科的肺生検や経気管支肺生検検体でも元素分析は可能であり、超硬合金の使用が不明な場合やほかの間質性肺炎の鑑別が必要な際には検討される。

A) Takada T, et al : Respir Invest 52 : 1, 2014

文 献

- 1) Guha N, et al : Lancet Oncol 18 : 581, 2017
- 2) Buerke U, et al : Am J Ind Med 41 : 259, 2002
- 3) 吉井千春ほか : J Aerosol Res 20 : 238, 2005
- 4) 村田喜代史ほか : 胸部の CT, 第4版, メディカル・サイエンス・インターナショナル, p636, 2018
- 5) Yoshii C, et al : Intern Med 41 : 1111, 2002
- 6) Tanaka J, et al : BMJ Open 4 : e004407, 2014
- 7) Coates EO, et al : Ann Intern Med 75 : 709, 1971
- 8) Abraham JL : Chest 91 : 312, 1987
- 9) Ohori NP, et al : Am J Surg Pathol 13 : 581, 1989