

表 2a 肺腺癌分類 WHO 4 版 2015

4 th Edition
Preinvasive lesions 前浸潤性病変
Atypical adenomatous hyperplasia 異型腺腫様過形成
Adenocarcinoma in situ 上皮内腺癌
Adenocarcinoma 腺癌
Lepidic adenocarcinoma 置換型腺癌
Acinar adenocarcinoma 腺房型腺癌
Papillary adenocarcinoma 乳頭型腺癌
Micropapillary adenocarcinoma 微小乳頭型腺癌
Solid adenocarcinoma 充実型腺癌
Invasive mucinous adenocarcinoma 浸潤性粘液性腺癌
Colloid adenocarcinoma コロイド腺癌
Fetal adenocarcinoma 胎児型腺癌
Enteric adenocarcinoma 腸型腺癌
Minimally invasive adenocarcinoma 微小浸潤性腺癌

表 2b 肺腺癌分類 WHO 5 版 2021

5 th Edition
Precursor glandular lesions 腺系前浸潤性病変
Atypical adenomatous hyperplasia 異型腺腫様過形成
Adenocarcinoma in situ 上皮内腺癌
Adenocarcinomas 腺癌
Minimally invasive adenocarcinoma 微小浸潤性腺癌
Invasive non-mucinous adenocarcinoma 浸潤性非粘液性腺癌
Lepidic adenocarcinoma 置換型腺癌
Acinar adenocarcinoma 腺房型腺癌
Papillary adenocarcinoma 乳頭型腺癌
Micropapillary adenocarcinoma 微小乳頭型腺癌
Solid adenocarcinoma 充実型腺癌
Invasive mucinous adenocarcinoma 浸潤性粘液性腺癌
Other adenocarcinoma その他の腺癌
Colloid adenocarcinoma コロイド腺癌
Fetal adenocarcinoma 胎児型腺癌
Enteric-type adenocarcinoma 腸型腺癌

表 3 免疫染色および遺伝子検査による判断*

	肺腺癌	大腸癌	乳癌	甲状腺癌	腎癌
CK7	+	-	+	+	-
CK20	-	+	-	-	-
TTF-1	+	-	-	+	-
Napsin A	+	-	-	-	+
CDX2	-	+	-	-	-
GCDPF-15	-	-	+	-	-
Thyroglobulin	-	-	-	+	-
PAX8	-	-	-	+	+
EGFR mutation	+	-	-	-	-
ALK fusion	+	-	-	-	-

*あくまで、大まかな傾向であることに注意。転移か否かは免疫組織染色のみでは決めることができない場合も多い。また胃癌、肝癌、胆道癌などの転移では免疫組織染色での鑑別は難しい。

[日本肺癌学会(編): 肺癌診療ガイドライン 2017 年版, 1. 肺癌の診断

URL: https://www.haigan.gr.jp/guideline/2017/1/1/170101030100.html#s_1_1_3-4]

本表は日本肺癌学会が作成したものであり、本表の内容に関するご質問・お問い合わせ等は、日本肺癌学会までご連絡ください。本書は、日本肺癌学会および発行元である金原出版株式会社からの許諾を得て、本表の内容を改変することなく転載し、使用しています。

は最も予後良好でタイプ B, C, D の順で予後不良である。免疫組織染色は補助診断として頻用されている。腺癌では CK7, TTF-1, napsin A が陽性になることが多い。免疫染色は原発性肺癌と転移性肺癌の鑑別に有用なことがある(表 3)⁸⁾。

コンパニオン診断と遺伝子パネル検査(クリニカルシーケンス)

a コンパニオン診断

特定の分子標的治療薬を使用する際に該当する分子異常を同定する検査をコンパニオン診断(CDx)と呼び保険償還される。従来は PCR 法, IHC 法, FISH 法などの単一遺伝子検査を組み合わせで行っていたが, NGS 法を用いたマルチ CDx として「オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム」, 「FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル」, 「肺がんコンパクトパネル CDx マルチコンパニオン診断システム」, PCR 法を用いた「Amoy CDx 肺癌マルチ遺伝子 PCR パネル」が保険収載され、同時に複数の遺伝子検査を実施できるようになった。