

Eclats de vers : Matemat : Polygones

chimay

December 30, 2025

[Index mathématique](#)

[Retour à l'accueil](#)

Table des matières

1	Angles d'un polygone	1
2	Hexagone régulier	5
3	Pentagone régulier	16
4	Octogone régulier	27

1 Angles d'un polygone

1.1	Somme des angles	1
1.2	Angle d'un polygone régulier	4

1.1 Somme des angles

1.1.1	Par une décomposition en triangles	1
1.1.2	Par un parcours autour du polygone	2

1.1.1 Par une décomposition en triangles

On obtient la somme des angles d'un polygone générique à n côtés en le décomposant en triangles. Il y a toutefois quelques précautions à prendre :

- les triangles doivent former une mosaïque qui recouvrent intégralement le polygone
 - les triangles ne peuvent donc pas se chevaucher
- on ne peut pas faire apparaître de nouveaux sommets sans ajouter de nouveaux angles et obtenir un résultat incorrect
 - on ne peut donc utiliser que les sommets du polygone
 - * les côtés des triangles sont donc soit des côtés du polygones, soit des diagonales

* les côtés des triangles ne peuvent pas se croiser

Le schéma ci-dessous donne un exemple de partition d'un polygone en triangles :




Figure 1: polygone à n côtés divisé en triangles

On voit que le polygone compte six côtés (c'est un hexagone) et peut se diviser en quatre triangles. On remarque aussi que la somme des angles de tous les triangles est égal à la somme des angles du polygone.

En général, un polygone \mathcal{P}_n à n côtés peut se diviser en $n - 2$ triangles. Comme la somme des angles de chaque triangle vaut $\pi = 180^\circ$, la somme des angles de \mathcal{P}_n vaut :

$$(n - 2) \cdot \pi = (n - 2) \cdot 180^\circ$$


On a en particulier le tableau suivant :

Polygone	Nombre de côtés	Somme des angles
quadrilatère	4	$2 \cdot 180^\circ = 360^\circ$
pentagone	5	$3 \cdot 180^\circ = 540^\circ$
hexagone	6	$4 \cdot 180^\circ = 720^\circ$
octogone	8	$6 \cdot 180^\circ = 1080^\circ$
décagone	10	$8 \cdot 180^\circ = 1440^\circ$
dodécagone	12	$10 \cdot 180^\circ = 1800^\circ$

1.1.2 Par un parcours autour du polygone

Ce raisonnement est inspiré de cette vidéo de Micmath.

Imaginons un personnage fictif qui parcourt un tour complet autour du polygone suivant :



Ce parcours se fait dans le sens anti-horlogique, en partant du point P , avec une direction initiale donnée par le vecteur \vec{u} . Notre personnage tourne à chaque sommet d'un angle α_i . l'angle total de sa rotation vaut donc :

$$S = \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

où n est le nombre de côtés. Mais comme il effectue un tour complet, on a aussi :

$$S = 2 \pi$$

On en déduit que :

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i = 2 \pi$$

À chaque sommet i , les angles α_i et γ_i forment ensemble un angle plat :

$$\alpha_i + \gamma_i = \pi$$

On a donc :

$$\alpha_i = \pi - \gamma_i$$

La relation sur la somme des angles devient :

$$\sum_{i=1}^n (\pi - \gamma_i) = 2 \pi$$

ou encore :

$$\sum_{i=1}^n \pi - \sum_{i=1}^n \gamma_i = 2 \pi$$

La constante π ne dépendant pas de i , on a simplement :

$$n \pi - \sum_{i=1}^n \gamma_i = 2 \pi$$

Isolons la somme des angles internes du polygone :

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i = n \pi - 2 \pi$$

Mettons en évidence π :

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i = (n - 2) \pi$$

La somme dans le membre de gauche n'est rien d'autre que la somme des angles internes du polygone. Nous avons donc montré que cette somme vaut :

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i = (n - 2) \cdot \pi = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

1.2 Angle d'un polygone régulier

Dans le cas d'un polygone régulier, tous les angles sont égaux. Notons α_n un angle quelconque d'un polygone à n côtés. La somme des angles vaut :

$$n \alpha_n = (n - 2) \pi$$

On a donc :

$$\alpha_n = \frac{(n - 2) \pi}{n} = \frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}$$

On a en particulier le tableau suivant :

Polygone régulier	Nombre de côtés	Somme des angles	Angle
quadrilatère	4	360°	$360^\circ / 4 = 90^\circ$
pentagone	5	540°	$540^\circ / 5 = 108^\circ$
hexagone	6	720°	$720^\circ / 6 = 120^\circ$
octogone	8	1080°	$1080^\circ / 8 = 135^\circ$
décagone	10	1440°	$1440^\circ / 10 = 144^\circ$
dodécagone	12	1800°	$1800^\circ / 12 = 150^\circ$

On remarque aussi que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n - 2) \pi}{n} = \pi$$


Lorsque le nombre de côtés devient très grand, l'angle α_n converge vers $\pi = 180^\circ$.

2 Hexagone régulier

2.1	Angles au centre	5
2.2	Diagonales	7
2.3	Hexagramme	10
2.4	Nombre d'or	13

2.1 Angles au centre

Le schéma ci-dessous représente un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon r :



On constate que les six angles au centre d'amplitude α forment un tour complet :

$$6 \alpha = 2 \pi = 360^\circ$$

On a donc :

$$\alpha = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$$

Examinons le triangle OAB . Les longueurs des deux côtés reliés au centre O sont de longueurs égales au rayon r . Il s'agit donc d'un triangle isocèle et les angles correspondants sont par symétrie de même amplitude :

$$\beta = \gamma$$

La somme des angles du triangle OAB vaut 180° :

$$\alpha + \beta + \gamma = 60^\circ + 2 \beta = 180^\circ$$

On en déduit que :

$$\beta = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$$

Le triangle OAB a donc ses trois angles de même amplitude :

$$\alpha = \beta = \gamma = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$


Il s'agit donc d'un triangle équilatéral dont les longueurs des côtés valent :

$$c = r$$

Ce résultat montre aussi que les angles internes d'un hexagone valent :

$$\beta + \gamma = 60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$$

Le schéma devient donc :




Ce constat donne une méthode pour tracer aisément un hexagone régulier :

- tracer le cercle de centre O
- laisser le compas ouvert au même rayon r
- reporter le rayon du compas sur le cercle jusqu'à obtenir les six sommets de l'hexagone

2.2 Diagonales

Le schéma ci-dessous représente un hexagone régulier muni de toutes ses diagonales, les diamètres du cercle et les deux grands triangles formant un hexagramme :



Le cercle est de rayon r . On définit les distances :

$$a = |EG|$$

$$b = |GC|$$

$$c = |OG|$$

$$d = |GD|$$

Par symétrie, on a :

$$a = b$$

$$\delta = \epsilon$$

$$\alpha = \beta$$

$$\lambda = \mu$$

Intéressons-nous à présent au triangle OGE . On constate que δ et ϵ forment ensemble un angle plat de 180° :

$$\delta + \epsilon = 180^\circ$$

Comme ces deux angles sont égaux, on a :

$$2 \delta = 180^\circ$$

c'est-à-dire :

$$\delta = 90^\circ$$

Le triangle OGE est donc un triangle rectangle dont l'hypothénuse vaut :

$$|OE| = r$$

2.2.1 Angles

Les angles non droits du triangle rectangle OGE étant complémentaires, on a :

$$\alpha = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

Comme l'angle $\alpha + \lambda$ est l'un des angles du triangle équilatéral OED , on a :

$$\alpha + \lambda = 60^\circ$$

c'est-à-dire :

$$\lambda = 60^\circ - \alpha = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$

et :

$$\mu = \lambda = 30^\circ$$

On a donc finalement :

$$\alpha = \beta = \lambda = \mu = \frac{\pi}{6} = 30^\circ$$

2.2.2 Longueurs

Le triangle OGE étant un triangle rectangle, on a :

$$a = r \sin 60^\circ = r \frac{\sqrt{3}}{2}$$

La longueur L du côté $[EC]$ du triangle ACE vaut donc :

$$L = |EC| = a + b = 2 a$$

c'est-à-dire :

$$L = r \sqrt{3}$$

La longueur du plus petit côté du triangle OGE vaut :

$$c = r \cos 60^\circ = \frac{r}{2}$$

Comme :

$$c + d = |OD| = r$$

on a aussi :

$$d = r - c = r - \frac{r}{2} = \frac{r}{2}$$

Le segment $[EC]$ divise le rayon $[OD]$ en deux.

2.2.3 Conclusion

Par symétrie, on peut appliquer le même raisonnement aux autres côtés du triangle ACE , et ainsi montrer que le triangle ACE est un triangle équilatéral de côté $L = r \sqrt{3}$.

Il en va de même pour le triangle DFB . Les deux grands triangles formant l'hexagramme, ACE et DFB , sont donc équilatéraux.

Par symétrie et invariance sous rotation d'un sixième de tour (60°), il est clair que le triangle équilatéral ACE contient six triangles isométriques à OGE (en incluant OGE lui-même). Ces triangles possèdent donc les mêmes angles et les mêmes longueurs de côtés.


Soit T un des deux triangles équilatéraux ACE ou DFB formant l'hexagramme. Nous avons montré que :

- les rayons du cercle divisent les angles de T en deux angles égaux de 30°
- les angles situés entre les pointes de T et les côtés de l'hexagone sont également de 30°
- les côtés de T divisent les rayons du cercle en deux parties égales de longueur $r/2$
- réciproquement, les rayons du cercle divisent les côtés de T en deux parties égales de longueur $r \sqrt{3}/2$

Le schéma devient :



10



Nous avons tenu compte de la symétrie dans la notation des longueurs et des angles.

Le cercle est de rayon r . On définit les distances :

$$a = |HD|$$

$$c = |HG|$$

2.3.1 Triangles compris entre l'hexagramme et les côtés de l'hexagone

Examinons à présent le triangle FJE . Nous avons vu précédemment que les angles compris entre les triangles de l'hexagramme (ACE et DFB) et les côtés de l'hexagone valent 30° . On a donc :

$$\lambda = 30^\circ$$

Le troisième angle θ vaut donc :

$$\theta = 180^\circ - 2 \cdot 30^\circ = 120^\circ$$

Les cinq autres triangles compris entre les côtés de l'hexagone et l'hexagramme sont par symétrie isométriques à FJE .

2.3.2 Pointes de l'hexagramme

Examinons à présent les triangles formés aux pointes de l'hexagramme.

Le triangle DFB étant équilatéral, ses angles valent 60° et en particulier :

$$\gamma = 60^\circ$$

La somme des angles dans le triangle HID nous donne :

$$2\alpha + \gamma = 2\alpha + 60^\circ = 180^\circ$$

c'est-à-dire :

$$\alpha = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$$

Le triangle HID est donc aussi un triangle équilatéral et :

$$a = 2c$$

La longueur du côté $[EC]$ peut s'écrire :

$$2a + 2c = 2a + a = 3a$$

Or, $[EC]$ est un des côtés du triangle équilatéral ACE et est donc de longueur $r\sqrt{3}$:

$$3a = r\sqrt{3}$$

ce qui nous donne la valeur de a :

$$a = r \frac{\sqrt{3}}{3}$$

La longueur du troisième côté du triangle HID vaut :

$$|HI| = 2c = a = r \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Les côtés du triangle DFB divisent en trois parties égales le côté $[EC]$ du triangle ACE .


2.3.3 Conclusion

Les triangles compris entre les côtés de l'hexagone et l'hexagramme ont des angles aigus de 30° et un angle obtus de 120° .

Les pointes de l'hexagramme sont des triangles équilatéraux de côté $r\sqrt{3}/3$, c'est-à-dire le tiers du côté des triangles formant l'hexagramme.


Soit T_1 et T_2 les deux triangles formant l'hexagramme. Les côtés de T_1 divisent en trois parties égales les côtés de T_2 , et vice versa.

Le schéma devient :



2.4 Nombre d'or

Le schéma ci-dessous représente un hexagone régulier muni de ses diagonales :



Nous avons tenu compte de la symétrie dans la notation des longueurs et des angles.

Le cercle est de rayon r . On définit les distances :

$$a = |OI|$$

$$b = |GI|$$

$$c = |OG|$$

$$d = |IJ|$$

$$e = |GH|$$

$$f = |GJ|$$

Nous avons vu précédemment que les côtés des grands triangles équilatéraux formant l'hexagramme coupent le rayon en deux parties égales. On a donc :

$$c = \frac{r}{2}$$

2.4.1 Triangles rectangles

Les deux angles δ forment ensemble un angle plat :

$$2 \delta = 180^\circ$$

d'où :

$$\delta = 90^\circ$$

Les triangles GIO , IHO et IJO sont donc des triangles rectangles.

Triangle IHO Dans le triangle rectangle IHO , on a par définition du cosinus :

$$a = c \cos 60^\circ = \frac{r}{2} \cos 60^\circ$$

Comme le cosinus de 60° vaut $1/2$, cette équation devient :

$$a = \frac{r}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{r}{4}$$

Le sinus nous donne :

$$b = c \sin 60^\circ = \frac{r}{2} \sin 60^\circ$$

Comme le cosinus de 60° vaut $\sqrt{3}/2$, cette équation devient :

$$b = \frac{r}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{r \sqrt{3}}{4}$$

Triangle IJO Dans le triangle IJO , le théorème de Pythagore s'écrit :

$$r^2 = a^2 + d^2$$

Comme $a = r/4$, cette relation devient :

$$r^2 = \frac{r^2}{16} + d^2$$

Isolons d^2 :

$$d^2 = r^2 - \frac{r^2}{16}$$

Mettons les membres de droite au même dénominateur :

$$d^2 = \frac{16 r^2 - r^2}{16} = \frac{15 r^2}{16}$$

Il ne nous reste plus qu'à prendre la racine carrée :

$$d = \frac{r \sqrt{15}}{4}$$

2.4.2 Sommes

On a :

$$f = b + d = \frac{r \sqrt{3}}{4} + \frac{r \sqrt{15}}{4}$$

Remarquons que :

$$\sqrt{15} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{5}$$

L'expression de f devient :

$$f = \frac{r \sqrt{3}}{4} + \frac{r \sqrt{3} \sqrt{5}}{4}$$

Mettons en évidence au membre de droite :

$$f = \frac{r \sqrt{3}}{4} (1 + \sqrt{5})$$

Le terme entre parenthèses vaut deux fois le nombre d'or ϕ :

$$f = \frac{r \sqrt{3}}{4} \cdot 2 \phi$$

On a donc finalement :

$$f = \frac{r \sqrt{3}}{2} \phi$$

D'un autre côté, on a :

$$e = 2 b = 2 \cdot \frac{r \sqrt{3}}{4} = \frac{r \sqrt{3}}{2}$$

Le rapport des longueurs :

$$\frac{f}{e} = \frac{\phi r \sqrt{3}/2}{r \sqrt{3}/2}$$

nous donne donc le nombre d'or :


$$\frac{f}{e} = \phi$$

3 Pentagone régulier

3.1	Angles au centre	16
3.2	Diagonales	17
3.3	Pentagramme	18
3.4	Invariance sous rotation	20
3.5	Nombre d'or	22
3.6	Rapport entre le côté et le rayon	24

3.1 Angles au centre

Le schéma ci-dessous représente un pentagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon r :



On constate que les cinq angles au centre d'amplitude α forment un tour complet :

$$5 \alpha = 2 \pi = 360^\circ$$

On a donc :

$$\alpha = \frac{2\pi}{5} = 72^\circ$$

Examinons le triangle OAB . Les longueurs des deux côtés reliés au centre O sont de longueurs égales au rayon r . Il s'agit donc d'un triangle isocèle et les angles correspondants sont par symétrie de même amplitude :

$$\beta = \gamma$$

La somme des angles du triangle OAB vaut 180° :

$$\alpha + \beta + \gamma = 72^\circ + 2\beta = 180^\circ$$


On en déduit que :

$$\beta = \frac{180^\circ - 72^\circ}{2} = 54^\circ$$

Ce résultat montre aussi que les angles internes d'un pentagone valent :


$$\beta + \gamma = 54^\circ + 54^\circ = 108^\circ$$

Le schéma devient donc :



3.2 Diagonales

Le schéma ci-dessous représente un pentagone muni de toutes ses diagonales formant un pentagramme, ainsi que les rayons du cercle circonscrit :



Nous avons tenu compte de la symétrie dans la notation des angles.
Examinons le triangle ABE . La somme des angles nous donne :

$$2 \alpha + 108^\circ = 180^\circ$$


On en déduit la valeur des deux autres angles :

$$\alpha = \frac{180^\circ - 108^\circ}{2} = 36^\circ$$

L'angle compris entre un côté du pentagone et la plus proche de ses diagonales vaut 36° .

3.3 Pentagramme

Le schéma ci-dessous représente un pentagone muni de toutes ses diagonales formant un pentagramme, ainsi que les rayons du cercle circonscrit :



Nous avons tenu compte de la symétrie dans la notation des angles.

L'angle α forme, avec deux angles de 36° , un angle interne du pentagone.

On a donc :

$$\alpha + 2 \cdot 36^\circ = 108^\circ$$

c'est-à-dire :

$$\alpha = 108^\circ - 2 \cdot 36^\circ = 36^\circ$$

La somme des angles du triangle AFG nous donne :

$$\alpha + 2 \gamma = 36^\circ + 2 \gamma = 180^\circ$$

c'est-à-dire :

$$\gamma = \frac{180^\circ - 36^\circ}{2} = 72^\circ$$

Examinons à présent le triangle ABF . On obtient directement la valeur de l'angle θ par :

$$\theta + 36^\circ + 36^\circ = 180^\circ$$

qui nous donne :


$$\theta = 180^\circ - 36^\circ - 36^\circ = 108^\circ$$

3.3.1 Conclusion

Les petits triangles formant les pointes du pentagramme ont un angle au sommet de 36° et deux autres angles de 72° .


Les triangles compris entre les côtés du pentagone et le pentagramme ont un angle obtus de 108° et deux angles aigus de 36° .

Le schéma devient :



3.4 Invariance sous rotation

Le schéma ci-dessous représente un pentagone muni de toutes ses diagonales formant un pentagramme, ainsi que les rayons du cercle circonscrit :



Nous avons déjà tenu compte de la symétrie dans la notation des longueurs.
On définit les distances :

$$a = |EG| = |FB|$$

$$b = |GH| = |HF|$$

$$c = |AF| = |IC|$$

$$d = |FJ| = |JI|$$

Le pentagone régulier est invariant lorsqu'on le fait tourner d'un cinquième de tour, c'est-à-dire de 72° . Les longueurs, les proportions et les angles entre ses côtés et ses diagonales ne varient donc pas non plus. En particulier, si on fait tourner le triangle AGE de 72° dans le sens horlogique, on obtient le triangle BFA , qui possède des propriétés identiques. Leurs côtés correspondants sont donc égaux et :

$$a = c$$

En utilisant le même raisonnement, si on fait tourner le triangle AFG de 72° dans le sens horlogique, on obtient le triangle BIF , qui possède des propriétés identiques. Leurs côtés correspondants sont donc égaux et :

$$2b = 2d$$

c'est-à-dire :

$$b = d$$

On a aussi comme conséquences immédiates :


$$|AF| = c = a = |FB|$$

et :

$$|EF| = a + 2b = c + 2d = |FC|$$

3.5 Nombre d'or

Le schéma ci-dessous représente un pentagone muni de toutes ses diagonales formant un pentagramme, ainsi que les rayons du cercle circonscrit :



Nous avons tenu compte de la symétrie et de l'invariance sous rotation d'un cinquième de tour dans la notation des longueurs.

Le cercle est de rayon r . La longueur du côté du pentagone se note :

$$l = |AB| = |BC| = |CD| = |DE| = |EA|$$

On définit aussi les distances :

$$a = |EF| = |FC|$$

$$c = |FB| = |FA|$$

3.5.1 Triangle isocèle

Dans le triangle AFE , on a :

$$\alpha + 72^\circ + 36^\circ = 180^\circ$$

d'où :

$$\alpha = 72^\circ$$

Les deux angles aigus du triangle AFE sont donc égaux. Par symétrie, il s'agit donc d'un triangle isocèle et :

$$a = l$$

3.5.2 Triangles semblables

On remarque que les triangles ABC et ABF ont des angles correspondants de même amplitude : ce sont donc des triangles semblables. Leurs rapports de longueurs sont donc identiques. On a en particulier :

$$\frac{l}{c} = \frac{a+c}{l}$$

Comme $a = l$, cette relation devient :

$$\frac{l}{c} = \frac{l+c}{l} = \frac{l}{l} + \frac{c}{l}$$

ou :

$$\frac{l}{c} = 1 + \frac{c}{l}$$

Posons :

$$\phi = \frac{l}{c}$$

La relation entre les longueurs devient :

$$\phi = 1 + \frac{1}{\phi}$$

Multiplions par ϕ . On obtient :

$$\phi^2 = \phi + 1$$

ou encore :

$$\phi^2 - \phi - 1 = 0$$

Nous avons vu dans le chapitre sur les proportions métalliques, que la solution positive de cette équation définit le nombre d'or :

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

La longueur de la diagonale du pentagone vaut :

$$d = a + c$$

On a donc :

$$\frac{d}{l} = \frac{a + c}{l} = \frac{l}{c} = \phi$$

Le rapport entre la longueur de la diagonale d'un pentagone et la longueur de son côté est égal au nombre d'or.

3.5.3 Cosinus de 36°

Dans le triangle ABF , la loi des cosinus nous donne une expression de la longueur c :

$$c^2 = l^2 + c^2 - 2 l c \cos 36^\circ$$

Divisons par c^2 :

$$1 = \frac{l^2}{c^2} + 1 - 2 \frac{l}{c} \cos 36^\circ$$

Comme $l/c = \phi$, cette équation devient :

$$1 = \phi^2 + 1 - 2 \phi \cos 36^\circ$$

Isolons le cosinus :

$$\cos 36^\circ = \frac{\phi^2 + 1 - 1}{2 \phi} = \frac{\phi^2}{2 \phi}$$

c'est-à-dire :

$$\cos 36^\circ = \frac{\phi}{2}$$


Le cosinus de 36° vaut la moitié du nombre d'or.

Sinus de 54° Il en va de même pour le sinus de l'angle complémentaire, à savoir 54° :

$$\sin 54^\circ = \frac{\phi}{2}$$

3.6 Rapport entre le côté et le rayon

Le schéma ci-dessous représente un pentagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon r :



La longueur du côté du pentagone se note :

$$l = |AB| = |BC| = |CD| = |DE| = |EA|$$

On définit aussi les distances :

$$a = |AF|$$

$$b = |FB|$$

$$c = |OF|$$

3.6.1 Symétrie

Le point F est l'intersection entre le côté $[AE]$ et le prolongement du rayon $[OC]$. Les points F , O et C sont donc alignés. Par conséquent, l'angle α forme, avec deux angles de 72° , un angle plat :

$$\alpha + 2 \cdot 72^\circ = 180^\circ$$

Isolons α :

$$\alpha = 180^\circ - 2 \cdot 72^\circ = 180^\circ - 144^\circ$$

Cet angle vaut donc :

$$\alpha = 36^\circ$$

On peut tenir le même raisonnement pour l'angle γ :

$$\gamma = 36^\circ$$

On a donc :

$$\alpha = \gamma$$

Par symétrie, on a aussi :

$$a = b$$

$$\delta = \epsilon$$

Comme :

$$a + b = 2 \quad a = l$$

on en déduit que :

$$a = \frac{l}{2}$$

Les angles δ et ϵ mis ensemble forment également un angle plat :

$$2 \delta = 180^\circ$$

c'est-à-dire :

$$\delta = 90^\circ$$

Le triangle AOF est donc un triangle rectangle.

3.6.2 Pythagore

Appliquons le théorème de Pythagore au triangle rectangle AOF :

$$r^2 = a^2 + c^2$$

Comme $a = l/2$, cette équation peut se réécrire :

$$r^2 = \frac{l^2}{4} + c^2$$

La longueur du côté $[OF]$ peut s'exprimer en fonction du cosinus de 36° :

$$c = r \cos 36^\circ$$

La relation de Pythagore devient alors :

$$r^2 = \frac{l^2}{4} + r^2 (\cos 36^\circ)^2$$

On peut remplacer le cosinus de 36° par la moitié du nombre d'or :

$$r^2 = \frac{l^2}{4} + r^2 \left(\frac{\phi}{2} \right)^2 = \frac{l^2}{4} + \frac{r^2 \phi^2}{4}$$

Isolons l^2 :

$$l^2 = 4 r^2 - r^2 \phi^2$$

et divisons par r^2 :

$$\frac{l^2}{r^2} = 4 - \phi^2$$

Comme $\phi^2 = \phi + 1$, cette équation devient :

$$\frac{l^2}{r^2} = 4 - \phi - 1 = 3 - \phi$$

Il ne nous reste qu'à prendre la racine carrée :

$$\frac{l}{r} = \sqrt{3 - \phi}$$


pour obtenir la valeur du rapport entre le côté d'un pentagone régulier et le rayon de son cercle circonscrit.

4 Octogone régulier

4.1	Angles au centre	27
4.2	Diagonales	29
4.3	Nombre d'argent	31

4.1 Angles au centre

Le schéma ci-dessous représente un octogone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon r :



On constate que les huit angles au centre d'amplitude α forment un tour complet :

$$8 \alpha = 2 \pi = 360^\circ$$

On a donc :

$$\alpha = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$$

Examinons le triangle OAB . Les longueurs des deux côtés reliés au centre O sont de longueurs égales au rayon r . Il s'agit donc d'un triangle isocèle et les angles correspondants sont par symétrie de même amplitude :

$$\beta = \gamma$$

La somme des angles du triangle OAB vaut 180° :

$$\alpha + \beta + \gamma = 45^\circ + 2 \beta = 180^\circ$$


On en déduit que :

$$\beta = \frac{180^\circ - 45^\circ}{2} = 67,5^\circ$$

Ce résultat montre aussi que les angles internes d'un octogone valent :


$$\beta + \gamma = 67,5^\circ + 67,5^\circ = 135^\circ$$

Le schéma devient :



4.2 Diagonales

Le schéma ci-dessous représente un octogone régulier muni de certaines de ses diagonales, ainsi que les diamètres du cercle :



Nous avons tenu compte de la symétrie dans la notation des angles. Dans le quadrilatère $IJKL$, la somme des angles vaut 360° :

$$4 \delta = 360^\circ$$

ce qui nous donne la valeur de δ :

$$\delta = 90^\circ$$

Comme δ et ϵ forment ensemble un angle plat, on a :

$$\delta + \epsilon = 90^\circ + \epsilon = 180^\circ$$

et :

$$\epsilon = 90^\circ$$

La somme des angles dans le quadrilatère $JEDK$ nous donne :

$$2 \epsilon + 2 \tau = 2 \cdot 90^\circ + 2 \tau = 360^\circ$$

d'où :

$$\tau = \frac{360^\circ - 2 \cdot 90^\circ}{2} = 90^\circ$$

Comme ϵ et χ forment ensemble un angle plat, on a :

$$\epsilon + \chi = 90^\circ + \chi = 180^\circ$$

et :

$$\chi = 90^\circ$$

La somme des angles dans le triangle HLG nous donne :

$$2\alpha + \chi = 2\alpha + 90^\circ = 180^\circ$$

c'est-à-dire :

$$\alpha = \frac{180^\circ - 90^\circ}{2} = 45^\circ$$

Les angles α et γ forment, avec un angle de 67.5° , un des angles internes de l'octogone qui vaut 135° . On a donc :

$$\alpha + \gamma + 67.5^\circ = 45^\circ + \gamma + 67.5^\circ = 135^\circ$$

c'est-à-dire :


$$\gamma = 135^\circ - 45^\circ - 67.5^\circ = 22.5^\circ$$

4.2.1 Conclusion

Les diagonales d'un octogone régulier forment


- des quadrilatères dont les angles sont droits
- des petits triangles rectangles dont les angles aigus valent 45°
- des angles de 22.5° entre les rayons du cercle circonscrit et les diagonales construites en sautant deux sommets de l'octogone

Le schéma devient :



4.3 Nombre d'argent

Le schéma ci-dessous représente un octogone régulier muni de certaines de ses diagonales, ainsi que les diamètres du cercle :



Nous avons tenu compte de la symétrie, de l'invariance sous rotation et des angles droits dans la notation des longueurs et des angles.

Le cercle est de rayon r . La longueur du côté de l'octogone se note :

$$l = |AB| = |BC| = \dots$$

En tenant compte des multiples quadrilatères qui sont des rectangles, on obtient :

$$l = |LI| = |KJ| = \dots$$

On définit aussi la distance :

$$a = |GL| = |FK| = \dots$$

4.3.1 Pythagore

Appliquons le théorème de Pythagore au triangle rectangle HLG :

$$l^2 = a^2 + a^2 = 2 a^2$$

Isolons a^2 :

$$a^2 = \frac{l^2}{2}$$

et prenons la racine carrée :

$$a = \frac{l}{\sqrt{2}}$$

En multipliant le numérateur de le dénominateur de la fraction par $\sqrt{2}$, il vient :

$$a = \frac{l \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}$$

et finalement :

$$a = \frac{l \sqrt{2}}{2}$$

4.3.2 Longueur maximale de l'octogone

La longueur L du segment $[FC]$, qui représente aussi la longueur maximale de l'octogone, vaut :

$$L = a + l + a = \frac{l \sqrt{2}}{2} + l + \frac{l \sqrt{2}}{2}$$

ou encore :

$$L = l + 2 \cdot \frac{l \sqrt{2}}{2} = l + l \sqrt{2}$$

et finalement :

$$L = l (1 + \sqrt{2})$$

Si on compare avec le nombre d'argent :

$$\psi = 1 + \sqrt{2}$$

on voit que :

$$\frac{L}{l} = \psi$$

Le rapport entre la longueur maximale d'un octogone et la longueur de son côté est égal au nombre argent.

4.3.3 Tangente de 67.5°

Le triangle BCF est un triangle rectangle. On a donc par définition :

$$\tan 67.5^\circ = \frac{L}{l} = \frac{l(1 + \sqrt{2})}{l}$$

et finalement :

$$\tan 67.5^\circ = 1 + \sqrt{2}$$

Autrement dit, cette tangente est égale au nombre d'argent :

$$\tan 67.5^\circ = \psi$$

Tangente de 22.5° On a :

$$\tan 22.5^\circ = \frac{1}{\tan 67.5^\circ} = \frac{1}{\psi}$$

Par définition du nombre d'argent, on a $1/\psi = \psi - 2$ et :

$$\tan 22.5^\circ = \psi - 2$$