13-¿Cómo se deduce la ecuación general de una circunferencia a partir de su ecuación ordinaria?
-Desarrollando la ecuación ordinaria y ordenando sus términos.

14-¿Qué información se puede obtener al comparar las ecuaciones de dos circunferencias?
-Sus centros, radios y posiciones relativas.

15-¿Qué sucede con la ecuación de una circunferencia si el radio es igual a cero?
-Se reduce a un solo punto.

16-¿Qué condición debe cumplir una ecuación cuadrática?
-Los términos x^2 e y^2 deben tener iguales coeficientes y no existir término xy.

17-¿Cómo se determina el centro y el radio a partir de una ecuación general?
-Completando cuadrados.

18-¿Qué representa el radio negativo en una ecuación de circunferencia?
-No representa una circunferencia real, porque el radio no puede ser negativo.

19-¿Por qué el radio de una circunferencia siempre debe ser un número positivo?
-Porque representa una distancia.

20-¿Qué ocurre con una circunferencia cuyo centro coincide con el origen del plano?

-La ecuación es $x^2 + y^2 = r^2$

21-¿Qué se entiende por tangente a una circunferencia?
-Es una recta que toca la circunferencia en un solo punto.

22-¿Qué condición debe cumplir una recta para ser tangente a una circunferencia?
-Es perpendicular al radio en el punto de contacto.

23-¿Qué diferencia hay entre una secante y una tangente?
-La secante corta en dos puntos y la tangente toca en uno.

24-¿Qué ocurre si la distancia entre los centros de dos circunferencias es mayor que la suma de sus radios?
-Las circunferencias no se intersectan.

Gráfica 6

Gráfica 7

Gráfica 8

Gráfica 9

Gráfica 10

Gráfica 11

Gráfica 18

Gráfica 19

Gráfica 20

Gráfica 21

Gráfica 22

Gráfica 23

Gráfica 24