Practico 5

Ejercicio 1.-
Calcular la presion que ejerce una fuerza de 50 N sobre una superficie de 4 cm^2.

Datos:
$F = 50\ N$
$A = 4\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{4}{10000} = 0{,}0004\ m^2$$

$$P = \frac{50\ N}{0{,}0004\ m^2}$$

$$P = 125\,000\ Pa\ //$$

Ejercicio 2.-
Calcular el area que soporta una presion de $450\ \frac{N}{cm^2}$, creada por una fuerza de 900 N.

Datos:
$P = 450\ \frac{N}{cm^2}$

$F = 900\ N$
$A = ?$

$$P = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{P}$$

$$A = \frac{900\ N}{450\ \frac{N}{cm^2}} = 2\ cm^2$$

$$A = \frac{2}{10000} = 0{,}0002\ m^2$$

$$A = 2 \times 10^{-4}\ m^2\ //$$

Ejercicio 3.-
Calcular la presion en pascal que genera una fuerza de 800 N sobre una superficie de 85 cm^2.

Datos:
$F = 800\ N$
$A = 85\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{85}{10000} = 0{,}0085\ m^2$$

$$P = \frac{800\ N}{0{,}0085\ m^2}$$

$$P \approx 94\,117{,}65\ Pa\ //$$

Ejercicio 6.-

¿Cuál es la presión que ejerce una mujer de 56 kg sobre uno de sus zapatos, cuya superficie es de 30 cm^2?

Datos:

$m = 56\ kg$

$A = 30\ cm^2$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 56 \cdot 9{,}8 = 548{,}8\ N$

$A = \frac{30}{10000} = 0{,}003\ m^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{548{,}8}{0{,}003}$

$P = 182\,933{,}33\ Pa$ //

Ejercicio 7.-

Un pez se encuentra en un acuario a 10 cm por debajo de la superficie y luego se mueve hasta el fondo. Calcular la diferencia de presión que soporta si la altura del agua es de 98 cm.

Datos:

$h_1 = 10\ cm = 0{,}10\ m$

$h_2 = 48\ cm = 0{,}98\ m$

$\rho = 1000\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$\Delta P = ?$

$\Delta P = \rho \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$

$\Delta h = 0{,}98 - 0{,}10 = 0{,}38\ m$

$\Delta P = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}38$

$\Delta P = 3\,724\ Pa$ //

Ejercicio 8.-

¿A qué profundidad se encuentra un buzo en el mar si soporta una presión de $9{,}8 \times 10^4$ Pa? La densidad del agua marina es de $1{,}035\ \frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$P = 9{,}8 \times 10^4\ Pa$

$\rho = 1{,}035\ \frac{g}{cm^3}$

$\rho = 1035\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$h = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h \rightarrow h = \frac{P}{\rho \cdot g}$

$h = \frac{9{,}8 \times 10^4}{1035 \cdot 9{,}8}$

$h = \frac{98000}{10143}$

$h \approx 9{,}66\ m$ //

Ejercicio 12.-

En una estación de servicio se utiliza una prensa hidraulica para levantar un automovil de 640 kg. El area del piston grande es de $320\pi\ cm^2$ y el area del piston pequeño es 20 veces menor.

¿Que fuerza debe aplicarse sobre el piston pequeño?

Datos:

$m = 640\ kg$

$A_2 = 320\pi\ cm^2$

$A_1 = \frac{A_2}{20}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$F_1 = ?$

$F_2 = m \cdot g = 640 \cdot 9{,}8 = 6272\ N$

$A_1 = \frac{320\pi}{20} = 16\pi\ cm^2$

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_1 = \frac{F_2 \cdot A_1}{A_2}$

$F_1 = \frac{6272 \cdot 16\pi}{320\pi}$

$F_1 = 313{,}6\ N$ //

Ejercicio 13.-

Sobre el embolo de un piston pequeño se ejerce una presion de 49 000 Pa. ¿Que radio debe tener el piston grande para que soporte un peso de 6 160 N?

Datos:

$P = 49000\ Pa$

$F = 6160\ N$

$r = ?$

$A = \frac{F}{P} = \frac{6160}{49000}$

$A = 0{,}125714\ m^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{0{,}125714}{\pi}}$

$r \approx 0{,}20\ m$ //

Ejercicio 14.-

En una prensa hidraulica, el area del piston pequeño es de $6\pi\ cm^2$. El piston grande tiene un area 8 veces mayor y sube 12 cm.

Calcula el volumen de liquido desplazado en el piston grande.

Datos:

$A_1 = 6\pi\ cm^2$

$A_2 = 8 \cdot A_1$

$h = 12\ cm$

$V = ?$

$A_2 = 8 \cdot 6\pi = 48\pi\ cm^2$

$V = A_2 \cdot h = 48\pi \cdot 12$

$V = 576\pi\ cm^3$

$V = 576 \cdot 3{,}1416$

$V = 576\pi\ cm^3 \approx 1\,809{,}56\ cm^3$ //

Ejercicio 17.-

Un gas está conectado a un manometro de mercurio que marca una diferencia inicial de 18 cm. La presion atmosferica local es de 510 mmHg. Si, a temperatura constante, el volumen del gas se reduce a la mitad, calcula la nueva presion manometrica.

Datos:

$h = 18\ cm = 180\ mmHg$

$P_{atm} = 510\ mmHg$

$V_2 = \frac{V_1}{2}$

$P_{m2} = ?$

$P_1 = P_{atm} + P_{m1} = 510 + 180$

$P_1 = 690\ mmHg$

Boyle: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$

$P_2 = 690 \cdot 2 = 1380\ mmHg$

$P_{m2} = P_2 - P_{atm} = 1380 - 510$

$P_{m2} = 870\ mmHg$ //