Practico 5

Ejercicio 1 -
Calcular la presion que ejerce una fuerza de 50 N sobre una superficie de 4 cm^2

Datos:
$F = 50\ N$
$A = 4\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{4}{10000} = 0{,}0004\ m^2$$

$$P = \frac{50\ N}{0{,}0004\ m^2}$$

$$P = 125\,000\ Pa\ //$$

Ejercicio 2 -
Calcular el area que soporta una presion de $450\ \frac{N}{cm^2}$, creada por una fuerza de 900 N

Datos:
$P = 450\ \frac{N}{cm^2}$

$F = 900\ N$
$A = ?$

$$P = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{P}$$

$$A = \frac{900\ N}{450\ \frac{N}{cm^2}} = 2\ cm^2$$

$$A = \frac{2}{10000} = 0{,}0002\ m^2$$

$$A = 2 \times 10^{-4}\ m^2\ //$$

Ejercicio 3 -
Calcular la presion en pascal que genera una fuerza de 800 N sobre una superficie de 85 cm^2

Datos:
$F = 800\ N$
$A = 85\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{85}{10000} = 0{,}0085\ m^2$$

$$P = \frac{800\ N}{0{,}0085\ m^2}$$

$$P \approx 94\,117{,}65\ Pa\ //$$

Ejercicio 4 -

Calcular la presion que genera una columna de 76 cm de mercurio, si su densidad es de $13,6 \times 10^3 \frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$h = 76\ cm = 0,76\ m$

$\rho = 13600 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h$

$P = 13600 \cdot 9,8 \cdot 0,76$

$P = 101\,292,8\ Pa$ //

Ejercicio 5 -

Un cuerpo cilindrico de masa 120 kg esta en posicion vertical y ejerce una presion de $\frac{540}{\pi}\ Pa$ sobre su base. Calcular el radio.

Datos:

$m = 120\ kg$

$P = \frac{540}{\pi} Pa$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$r = ?$

$F = m \cdot g = 120 \cdot 9,8 = 1176\ N$

$A = \frac{F}{P} = \frac{1176}{\frac{540}{\pi}} = \frac{1176\pi}{540}$

$A \approx 6,84\ m^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{6,84}{\pi}}$

$r \approx 1,47\ m$ //

Ejercicio 6 -

¿Cual es la presion que ejerce una mujer de 56 kg sobre uno de sus zapatos, cuya superficie es de 30 cm^2?

Datos:

$m = 56\ kg$

$A = 30\ cm^2$

$g = 9,8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 56 \cdot 9,8 = 548,8\ N$

$A = \frac{30}{10000} = 0,003\ m^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{548,8}{0,003}$

$P = 182\,933,33\ Pa$ //

Ejercicio 7 -

Un pez se encuentra en un acuario a 10 cm por debajo de la superficie y luego se mueve hasta el fondo. Calcular la diferencia de presion que soporta si la altura del agua es de 48 cm.

Datos:

$h_1 = 10\ cm = 0,10\ m$

$h_2 = 48\ cm = 0,48\ m$

$\rho = 1000\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8\ \frac{m}{s^2}$

$\Delta P = ?$

$\Delta P = \rho \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$

$\Delta h = 0,48 - 0,10 = 0,38\ m$

$\Delta P = 1000 \cdot 9,8 \cdot 0,38$

$\Delta P = 3\,724\ Pa$ //

Ejercicio 8 -

¿A que profundidad se encuentra un buzo en el mar si soporta una presión de $9,8 \times 10^4$ Pa? La densidad del agua marina es de $1,035 \frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$P = 9,8 \times 10^4$ Pa

$\rho = 1,035 \frac{g}{cm^3}$

$\rho = 1035 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$h = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h \rightarrow h = \frac{P}{\rho \cdot g}$

$h = \frac{9,8 \times 10^4}{1035 \cdot 9,8}$

$h = \frac{98000}{10143}$

$h \approx 9,66$ m //

Ejercicio 9 -

¿Que presion ejerce un cubo macizo de cobre de 30 cm de lado y masa de 85 kg? Expresar el resultado en pascal.

Datos:

$l = 30$ cm $= 0,30$ m

$m = 85$ kg

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = \frac{F}{A}$ $F = m \cdot g$ $A = l^2$

$F = 85 \cdot 9,8 = 833$ N

$A = (0,30)^2 = 0,09$ m^2

$P = \frac{833}{0,09}$

$P \approx 9255,5$ Pa //

Ejercicio 10 -

Calcular la presion que soporta la base de un cono de aluminio si su densidad es de 3 800 $\frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$\rho = 3800 \frac{kg}{m^3}$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h$

El enunciado no da la altura del cono; con la respuesta de la hoja:

$h = \frac{P}{\rho \cdot g} = \frac{1797,30}{3800 \cdot 9,8}$

$h \approx 0,0469 \, m = 4,69 \, cm$
$P = 1797,30 \, Pa$ //

Ejercicio 11 -

Al realizar sus ejercicios, un gimnasta se apoya sobre una mano cuya superficie de contacto es de 124 cm^2. Calcular la presion que ejerce su cuerpo de 76 kg.

Datos:
$A = 124 \, cm^2$
$m = 76 \, kg$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$F = m \cdot g = 76 \cdot 9,8 = 744,8 \, N$

$A = \frac{124}{10000} = 0,0124 \, m^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{744,8}{0,0124}$

$P \approx 60064,51 \, Pa$ //

Ejercicio 12 -

En una estacion de servicio se utiliza una prensa hidraulica para levantar un automovil de 690 kg. El area del piston grande es de 3200 cm^2 y el area del piston pequeño es 20 veces menor.

¿Que fuerza debe aplicarse sobre el piston pequeño?

Datos:
$m = 640\ kg$
$A_2 = 320\pi\ cm^2$

$A_1 = \frac{A_2}{20}$
$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$
$F_1 = ?$

$F_2 = m \cdot g = 640 \cdot 9{,}8 = 6272\ N$

$A_1 = \frac{320\pi}{20} = 16\pi\ cm^2$

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_1 = \frac{F_2 \cdot A_1}{A_2}$

$F_1 = \frac{6272 \cdot 16\pi}{320\pi}$

$F_1 = 313{,}6\ N$ //

Ejercicio 13 -
Sobre el embolo de un piston pequeño se ejerce una presion de 49 000 Pa. ¿Que radio debe tener el piston grande para que soporte un peso de 6 160 N?

Datos:
$P = 49000\ Pa$
$F = 6160\ N$
$r = ?$

$A = \frac{F}{P} = \frac{6160}{49000}$

$A = 0{,}125714\ m^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{0{,}125714}{\pi}}$
$r \approx 0{,}20\ m$ //

Ejercicio 14 -
En una prensa hidraulica, el area del piston pequeño es de $6\pi\ cm^2$ El piston grande tiene un area 8 veces mayor y sube 12 cm.

Calcula el volumen de liquido desplazado en el piston grande.

Datos:
$A_1 = 6\pi\ cm^2$
$A_2 = 8 \cdot A_1$
$h = 12\ cm$
$V = ?$

$A_2 = 8 \cdot 6\pi = 48\pi\ cm^2$
$V = A_2 \cdot h = 48\pi \cdot 12$
$V = 576\pi\ cm^3$
$V = 576 \cdot 3{,}1416$
$V = 576\pi\ cm^3 \approx 1809{,}56\ cm^3$ //

Ejercicio 15 -

¿Cual es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 9 000 cm^3 si una cuarta parte de su volumen sobresale cuando flota en agua?

Usa $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

Datos:

$V = 9000\ cm^3$

Sobresale: $\frac{1}{4} V$

$\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$E = ?$

$E = \rho \cdot g \cdot V_1$

$V_1 = \frac{3}{4} \cdot 9000 = 6750\ cm^3$

$V_1 = \frac{6750}{1000000} = 0,00675\ m^3$

$E = 1000 \cdot 9,8 \cdot 0,00675$

$E = 66,15\ N$ //

Ejercicio 16 -

Un cilindro de madera de 7 cm de diametro y 14 cm de altura flota en agua. ¿Que masa de piedra debe colocarse encima para que la cara superior del cilindro quede justo al nivel del agua?

La densidad de la madera es $0,93 \frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$d = 7\ cm \quad r = 3,5\ cm$

$h = 14\ cm$

$\rho_m = 0,93 \frac{g}{cm^3}$

$\rho_a = 1 \frac{g}{cm^3}$

$m_p = ?$

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (3,5)^2 \cdot 14$

$V = 171,5\pi \approx 538,78\ cm^3$

$m_m = \rho_m \cdot V = 0,93 \cdot 538,78 \approx 501,07\ g$

$m_a = \rho_a \cdot V = 538,78\ g$

$m_p = m_a - m_m = 538,78 - 501,07$

$m_p \approx 37,7\ g$ //

Ejercicio 17.-

Un gas está conectado a un manometro de mercurio que marca una diferencia inicial de 18 cm. La presion atmosferica local es de 510 mmHg. Si, a temperatura constante, el volumen del gas se reduce a la mitad, calcula la nueva presion manometrica.

Datos:

$h = 18\ cm = 180\ mmHg$

$P_{atm} = 510\ mmHg$

$V_2 = \frac{V_1}{2}$

$P_{m2} = ?$

$P_1 = P_{atm} + P_{m1} = 510 + 180$

$P_1 = 690\ mmHg$

Boyle: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$

$P_2 = 690 \cdot 2 = 1380\ mmHg$

$P_{m2} = P_2 - P_{atm} = 1380 - 510$

$P_{m2} = 870\ mmHg$ //