Practico de Química

Ley de los gases ideales

Ejercicio 1 -

Se encierran 20 g de oxígeno (O_2) en un recipiente de 18 litros a una temperatura de 68 °F. ¿Cual es la presión que soporta el recipiente? Expresa el resultado en pascales. M = 32 g/mol

Datos:
$m = 20\ g$
$M = 32\ g/mol$
$V = 18\ L = 0{,}018\ m^3$
$t = 68\ °F$
$R = 8{,}314\ J/[mol \cdot K]$
$P = ?$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{32} = 0{,}625\ mol$$

$$t = (68 - 32) \cdot \frac{5}{9} = 20\ °C$$
$$T = 20 + 273{,}15 = 293{,}15\ K$$

$$P = \frac{0{,}625 \cdot 8{,}314 \cdot 293{,}15}{0{,}018}$$

$$P \approx 84\,631\ Pa\ //$$

Ejercicio 2 -

Se introducen 20 g de nitrógeno (N_2) en un recipiente de 12 litros a una temperatura de 95 °F. ¿Cual es la presión del gas? Expresa el resultado en pascales. M = 28 g/mol

Datos
$m = 20\ g$
$M = 28\ g/mol$
$V = 12\ L = 0{,}012\ m^3$
$t = 95\ °F$
$R = 8{,}314\ J/(mol \cdot K)$
$P = ?$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$$
$$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{28} = 0{,}7143\ mol$$
$$t = (95 - 32) \cdot \frac{5}{9} = 35\ °C$$
$$T = 35 + 273{,}15 = 308{,}15\ K$$

$$P = \frac{0{,}7143 \cdot 8{,}314 \cdot 308{,}15}{0{,}012}$$

$$P \approx 152\,506\ Pa\ //$$

Ejercicio 5 -

Se almacenan 20 g de dioxido de carbono (CO_2) en un recipiente de 20 litros a una temperatura de 104 °F. ¿Cual es la presion que ejerce el gas? Expresa el resultado en pascales.

Datos:
$m = 20\ g$
$M = 44\ g/mol$
$V = 20\ L = 0{,}020\ m^3$
$t = 104\ °F$
$R = 8{,}314\ J/(mol \cdot K)$
$P = ?$

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$

$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{44} = 0{,}4545\ mol$

$t = (104 - 32) \cdot \frac{5}{9} = 40\ °C$

$T = 40 + 273{,}15 = 313{,}15\ K$

$$P = \frac{0{,}4545 \cdot 8{,}314 \cdot 313{,}15}{0{,}020}$$

$P \approx 59\,174\ Pa$ //

Ejercicio 6 -

Un recipiente esferico contiene 0,30 moles de oxigeno (O_2) a 25 °C y 760 mmHg de presion. Calcula la densidad y el radio del recipiente, sabiendo que la masa del gas es de 5 libras. $M = 32\ g/mol$

Datos:
$n = 0{,}30\ mol$
$M = 32\ g/mol$
$t = 25\ °C = 298{,}15\ K$
$P = 760\ mmHg = 1\ atm$
$m = 5\ lb$
$R = 0{,}08206\ atm \cdot L/(mol \cdot K)$
$\rho = ?$
$r = ?$

Comprobacion $m = n \cdot M = 0{,}30 \cdot 32 = 9{,}6\ g$

$5\ lb = 2268\ g \neq 9{,}6\ g$ los datos no coinciden

$\rho = \frac{P \cdot M}{R \cdot T} = \frac{1 \cdot 32}{0{,}08206 \cdot 298{,}15}$

$\rho \approx 1{,}308\ g/L$ //

A) Con los moles $V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P} = 7{,}30\ L$

$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 7340}{4\pi}}$

A) $r \approx 12{,}06\ cm$ //

B) Con las libras: $n = \frac{2268}{32} = 70{,}87\ mol$

$V = 1734\ L \rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 1\,734\,000}{4\pi}}$

B) $r \approx 74{,}53\ cm$ //

Ejercicio 8 -

Un recipiente esferico contiene 0,25 moles de dioxido de carbono (CO_2) a 35 °C y 720 mmHg de presion. Calcula la densidad y el radio del recipiente, sabiendo que la masa del gas es de 4,5 libras. M = 44 g/mol

Datos:
n = 0,25 mol
M = 44 g/mol
t = 35 °C = 308,15 K
p = 720 mmHg = 0,9474 atm
m = 4,5 lb
R = 0,08206 atm·l/(mol·K)
ρ = ?
r = ?

Comprobacion $m = n \cdot M = 0,25 \cdot 44 = 11$ g
4,5 lb = 2041,2 g ≠ 11 g los datos no coinciden

$$\rho = \frac{p \cdot M}{R \cdot T} = \frac{0,9474 \cdot 44}{0,08206 \cdot 308,15}$$

$\rho \approx 1,649$ g/l //

A) Con los moles. $V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = 6,67$ l

$$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 6670}{4\pi}}$$

A) $r \approx 11,68$ cm //

B) Con las libras. $n = \frac{2041,2}{44} = 46,39$ mol
V = 1238 l → $r = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 1238000}{4\pi}}$
B) $r \approx 66,81$ cm //

Ejercicio 9 -

El carbonato de calcio ($CaCO_3$) reacciona con acido clorhidrico (HCl), produciendo dioxido de carbono. Analiza la ecuacion de reaccion y calcula el volumen de CO_2 que se produce a 35 °C y 780 mmHg, por la reaccion de 50 gramos de $CaCO_3$.

$CaCO_3 + 2\,HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

Datos:
m = 50 g de $CaCO_3$
M = 100 g/mol
t = 35 °C = 308,15 K
p = 780 mmHg
R = 0,08206 atm·l/(mol·K)
V = ?

$M(CaCO_3) = 40 + 12 + 3 \cdot 16 = 100$ g/mol
1 mol de $CaCO_3$ da 1 mol de CO_2
$n = \frac{m}{M} = \frac{50}{100} = 0,5$ mol de CO_2

$p = \frac{780}{760} = 1,0263$ atm

$$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = \frac{0,5 \cdot 0,08206 \cdot 308,15}{1,0263}$$

$V \approx 12,32$ l de CO_2 //