





A.
A1
Nuclei per library
A2
ATAC raw reads / nucleus
A3
ATAC duplicate rate / nucleus
A4
HQ fragments / nucleus
A5
TSS-fragment fraction / nucleus
A6
FRIP — ArchR union / nucleus
A7
AMULET doublet rate (%)
03-1A
03-1B
03-2
04
05-duck
05
06
07
08
PA3
PA4A
PA4B
B.
B1
Early LPM
Cardiopharyngeal LPM
PRRX1+/FOXF1-low mes.
Venous-pole spl.
Contamination
BARX1+
Dorsal-biased LPM
Skeletogenic LPM
Mesothelium
Ventral spl.
Syringeal
Dorsal sub-epi.
HH13
HH17/16
HH21
HH25
union peaks detected (×10³)
B2
nuclei in group
stage
B3
median 8.2
peaks
log₁₀ ArchR peak score
B4
% of peaks
17.5%
50k
16.1%
46k
35.9%
102k
30.4%
86k
Promoter
Exonic
Intronic
Distal


C.
Inference pool
Early LPM
Cardiopharyngeal LPM
BARX1+
Inference pool
Ventral spl.
Syringeal chondro.
Skeletogenic (excluded)
Skeletogenic LPM
Dorsal control
Dorsal-biased LPM
Dorsal sub-epi.
median per-embryo log2(L / R), total PITX2 RNA
HH13
HH17/16
HH21
HH25
developmental stage


D.
Ventral (inference pool)
Dorsal (bilateral control)
nuclei / half
fragments / half (M)
Left
Right


E.
Left
Right
depth-matched log2(mean CPM, L / R)
(every stage at n = 8 L / 6 R)
PITX2c promoter
+5.4 kb distal
PITX2a promoter
PITX2b promoter
R-desert peak


F.
Left
Right
genes in intersection
Ventral spl.
Syringeal
Skeletogenic LPM
Dorsal sub-epi.