华师大二附中
校园植物志

目录

草本植物 3

木本植物 39

藤本植物 110

草本植物

凹叶景天

景天科 景天属
Sedum emarginatum

叶：对生，匙状，叶端圆，有微小的凹缺口
花：长狭的黄色花瓣，花中央有三角状的青色突起，花期 5-6 月
生长情况：多年生草本



芭蕉

芭蕉科 芭蕉属
Musa basjoo

叶：叶片大，长圆形，鲜绿色有光泽
花：小，黄色，顶端分裂有小尖头
果：即芭蕉
生长情况：多年生草本植物
校园分布：南北教学楼中间靠墙，信息楼北面



白车轴草

豆科 车轴草科
Trifolium repens

叶：掌状三出复叶，叶片近圆形，表面有一圈白色花纹
花：白色的球状花，花果期 5-10 月
其他：茎吃起来酸酸的
生长情况：多年生草本
相似种：酢浆草；白车轴草中间有花纹，而酢浆没有

扁竹兰

鸢尾科 鸢尾属
Iris confusa

叶：深绿色的宽剑形叶片，排列成扇状
花：花瓣浅蓝色或白色，中间有紫色和黄色的斑点花纹，边缘卷、絮状，花期 4 月。
果：蒴果椭圆形，果期 5-7 月表面有网状的脉纹及 6 条明显的肋；种子黑褐色
生长情况：多年生草本



刺果毛茛

毛茛科 毛茛属

Ranunculus muricatus

叶：叶片近圆形， 三裂，边缘有钝齿
花：黄色五瓣小花
果：长在花瓣中间，近圆形，表面棱状突起的青色小果（像长满了刺）
生长情况：一年生草本



酢浆

酢浆草科 酢浆草属

Oxalis corniculata

叶：叶片 3，倒心形
花：花瓣 5，长圆状倒卵形，黄色
果：长圆形，五棱。 种子长卵形，褐色或红棕色
生长情况：草本
相似类：红花酢浆草（铜锤草），酢浆草开黄花，叶片相对较小



红花酢浆草

酢浆草科 酢浆草属
Oxalis corymbosa

叶：叶片 3，倒心形
花：花瓣 5，倒心形，淡紫色至紫红色
生长情况：多年生直立草本
相似类：酢浆草，酢浆草开黄花，叶片相对较小

臭荠

十字花科 臭荠属
Coronopus didymus

叶：叶片羽状，窄长
花：花瓣白色，长圆形
果：一串串青色的小果子
生长情况：贴近地面，全身有臭味，一年或二年生草本

打碗花

旋花科 打碗花属
Calystegia hederacea

叶: 叶片近长三角形或箭形，三裂
花：淡紫色或淡红色花，钟状
果：圆形果子成熟后褐色，开裂，里面种子黑色
生长情况：一年生草本，攀爬附着于其他植物

佛座 / 宝盖草

唇形科 野芝麻属
Lamium amplexicaule

叶: 叶子圆形，边缘有圆齿，有毛
花: 花长在两层叶子的中间，5-10 株小花围成一圈，像莲花座。花朵唇形，紫红色。
花期 3-5 月
生长情况：一年生或二年生植物

附地菜

紫草科 附地菜属
Trigonotis peduncularis

叶：叶片长圆形，有毛。贴近地面的叶子叶端圆钝，茎上部的叶子叶端较尖
花：花朵小，五瓣，花瓣淡蓝色。早春开花，花期长
生长情况：一年生或二年生草本



繁缕

石竹科 繁缕属
Stellaria media

叶：叶子长椭圆形，叶端尖
花：花瓣五瓣，白色，长椭圆形，花期 6-7 月
生长情况：一年生或二年生草本

黄鹌菜

菊科 黄鹌菜属

Youngia japonica

叶：叶子箭形，边缘有锯齿，叶端大，往后端叶片变小
花：黄色的舌状小花，花瓣细长而多，花果期 4-10 月
生长情况：一年生草本，叶子形状极其多变

荠

十字花科荠属

Capsella bursa-pastoris

茎：直立
叶：基生叶丛生呈莲座状，羽状分裂
花：总状花序顶生，花瓣白色，卵形
果：果倒三角形或倒心状三角形，扁平
生长情况：一年或二年生草本，茎叶可作蔬菜食用

卷耳

石竹科 卷耳属
Cerastium arvense

叶：叶片长圆状披针形，顶端急尖，全身有疏长柔毛
花：花瓣 5，倒卵形，白色，顶端 2 裂，花期 5-8 月
果：蒴果长圆形。种子肾形，褐色，略扁。果期 7-9 月
生长情况：多年生疏丛草本

荔枝草

唇形科 鼠尾草属
Salvia plebeia

叶：叶子椭圆形，有毛，边缘有圆齿，底部叶端圆钝，茎上部叶端尖。叶表面形似荔枝皮，故得名
花：一串串蓝紫色小花，花期 5 月
生长情况：一年生或二年生直立草本

喜旱莲子草

苋科 莲子草属

Alternanthera philoxeroides

叶：对生，长圆形，叶端尖，叶片有点像瓜子

花：白色球形小花，花期 5-10 月

生长情况：多年生草本，匍匐生长。小树林池塘边上的莲子草，用手掐断茎，可以看见它的茎是空心的，校园其余地方的茎多为实心。

龙葵

茄科 茄属

Solanum nigrum

叶：叶卵形，叶端尖，边缘有不规则的波状粗齿

花：五角形的白色小花，花药黄色

果： 果子球形，成熟时为黑色

生长情况：一年生直立草本

葎草

桑科 葎草属
Humulus scandens

叶：五角形，5-7 裂，像手掌，粗糙有毛，边缘有齿
花：雄花小，黄绿色，圆锥花序；雌花序球果状，外面的苞片三角形且有白色绒毛
果：果子紫红色，形状奇特，有毛
生长情况：缠绕草本，茎、枝、叶柄均具倒钩刺

马兰

俗称马兰头（误名：鸡儿肠）
菊科 马兰属
Kalimeris indica indica

叶：叶披针形，边缘有齿，有毛
花：舌状白色花，像菊花，花期 5-9 月
生长情况：多年生草本，幼叶经常当作蔬菜食用，与豆腐干凉拌

马蹄金

旋花科 马蹄金属
Dichondra repens

叶：叶小，近圆形但微缺一个小口，形似马蹄
花: 淡黄色钟状小花, 五瓣, 花期
生长情况：多年生匍匐小草本





麦冬

百合科 沿阶草属
Ophiopogon japonicas

叶：细长条禾叶状，丛生
花：一簇簇淡紫色小花，花期 5-8 月，
果: 一串串深蓝色的小球果，果期 8-9 月
生长情况：一蓬蓬地长在路边或树底下，块状根可入药





南苜蓿

（俗名草头）
豆科 苜蓿属
Medicago polymorpha

叶：羽状三出复叶，叶片心形
花：伞状花序，黄色花朵
果：青色果子圆盘状螺旋，有刺
生长情况：一、二年生草本，叶子可作蔬菜食用
相似种：易与酢浆搞混，两者都开黄花，但是苜蓿的三出复叶中有两片是对生，而酢浆是三片叶子均匀排列组成圆形。

波斯婆婆纳 / 阿拉伯婆婆纳

玄参科 婆婆纳属
Veronica persica

叶：叶片近圆形，边缘有钝齿，有微小柔毛
花：蓝紫色小花，四片圆形花瓣中有一片颜色稍淡，花期 3-5 月
生长情况：越年生或一年生

蛇莓

蔷薇科 蛇莓属
Duchesnea indica

叶：三出复叶，叶片倒卵形，边缘有锯齿
花：黄色小花，花瓣倒卵形，五瓣
果：红色球形，表面有小突起，有点像草莓
生长情况：多年生草本，果子有毒。吃一两颗没问题，多吃了要送医院

石血

（络石的变种）
夹竹桃科 络石属
Trachelospermum jasminoides heterophyllum

叶：对生，长椭圆形，叶端尖，淡青色的粗叶脉在墨绿色的叶面上显得特别清晰
花：蝶状白色花朵，五瓣，像小风车，花蕊为黄色，花期 7-8 月
生长情况：常绿木质藤本，喜阴，学校竹林内有较多



碎米荠

十字花科 碎米荠属
Cardamine hirsuta

叶：顶生小叶长圆形，顶端三齿裂。侧生小叶对生，形较顶生小。
花：小，白色
果：针形，绿色
生长情况：一年生小草本

弹刀子菜

玄参科 通泉草属
Mazus stachydifolius

叶：茎生叶对生，上部的常互生，叶片长椭圆形，边缘有不规则锯齿
花：蓝紫色小花，中间黄色斑点，有点像鬼脸，花瓣二裂，花期 4-6 月
生长情况：多年生草本，全身有毛

天胡荽

伞形科 天胡荽属
Hydrocotyle sibthorpioides

叶：圆形，5-7 裂，边缘有钝齿
花：伞状花序，绿白色小花，花丝长
果：果子略呈心形，有棱，成熟后草黄色表面有紫色斑点。花果期 4-9 月。
生长情况：多年生草本，平铺在地上成片

救荒野豌豆

豆科 野豌豆属
Vicia sativa

叶：羽状复叶，叶轴先端有卷须。叶子长圆形，叶端有细尖
花：紫红色的蝶形花朵，花期 4-7 月
果：青色狭长的豆荚，内含种子，果期 7-9 月
生长情况：一、二年生或多年生草本，攀援植物



蚊母草

玄参科 婆婆纳属

Veronica peregrine

叶：叶子长椭圆形，边缘有三角状锯齿
花: 白色或浅蓝色小花, 四瓣, 花期 5-6 月
果：青色果子内常有小虫寄生，呈桃形，熟时微红色
生长情况：一年至二年生草本

小藜

藜科 藜属

Chenopodium serotinum

叶：叶片矩圆形，边缘有深波状锯齿
花：花数个团集，青色花苞近球形, 开黄色小花, 花期 4-5 月
生长情况：一年生草本

鸭跖草

鸭跖草科 鸭跖草属
Commelina communis

叶：叶披针形，有点像竹子的叶子
花：花瓣深蓝色，两瓣，花期 6-7 月
生长情况：一年生披散草本

野老鹤草

牻牛儿苗科 老鹳草属
Geranium carolinianum

叶：叶片圆肾形，5-7 裂，上部羽状深裂，有点像雪花
花：淡紫红色小花，五瓣，花期 5 月
果：果子青色，锥形，下端粗上端细，果期 5-6 月
生长情况：一年生草本，有时花和叶子呈红色

猪殃殃

茜草科 拉拉藤属
Galium aparine tenerum

叶：6 至 8 片轮生
花：花小，绿色
果：近球形，密被钩毛
生长情况：多枝、蔓生或攀缘状草本



木本植物

八角金盘

五加科 八角金盘属
Fatsia japonica

叶：叶片光滑且大，像手掌，多裂 5、7、9 片，很少有裂 8 片的
花：白色小花，球状，花期 10-11 月
果：果子小，球形，成熟后由青色变为紫黑色，果熟期 4 月
生长情况：常绿灌木，丛生；幼年时期叶片不分裂，类似三角形，边缘有齿，
校园分布：分布广泛，小树林处长得最茂盛



八仙花（绣球荚蒾）

忍冬科 荚蒾属
Hydrangea macrophylla

叶：叶片大，对生，叶边有齿，近圆形
花：球状，初为白色，花色多变
生长情况：落叶灌木，丛生
校园分布：小树林深处及男寝靠近网球场处

茶花（山茶）

山茶科 山茶属

Camellia japonica

叶：叶面光滑，叶端急尖，边缘有齿，摸起来较硬
花：花重瓣，校园里种植的为红色，花期 3-4 月
果：果子圆形，成熟后为褐色，会开裂
生长情况：常绿灌木或小乔木
校园信息：菜地旁，男女宿舍楼之间



垂丝海棠

蔷薇科 苹果属

Malus halliana

叶：叶形椭圆，边缘有小齿
花：重瓣，花瓣椭圆粉红色，花梗又长又细并且下垂，花期 3 月下旬
果：果子近圆形，略带紫色，果熟期 9 至 10 月
生长情况：乔木，早春期间特别美丽，有花雨
校园分布：南北教学楼之间和操场入口





紫丁香

木犀科 丁香属
Syringa oblata

叶：叶端尖，叶片近圆形
树干：粗糙，有皮孔
花：一簇簇淡紫色小花，四瓣，有香味，花期三月底到四月初
果：果子近圆形，果期 6-10 月
生长情况：落叶小乔木，先开花，后长叶
校园信息：菜地边

东京樱花

Cerasus yedoensis

花：白色，单瓣，花瓣呈心形。花期为 3 月底至 4 月初，花期短，大约为一周
叶：椭圆卵形或倒卵形，顶端渐尖或骤尾尖，边缘有尖锐锯齿。叶脉非常清晰，新叶为嫩绿色
树干：树皮上有皮孔
相似种：日本晚樱的叶较长，东京樱花的叶较宽，叶面更光亮，叶脉更明显
生长情况：落叶乔木
校园分布：科学楼的操场出口处有两棵

杜鹃

杜鹃花科 杜鹃属
Rhododendron simsii

叶：叶片长椭圆形，有毛
花：花朵梅红色漏斗形，五瓣，花瓣根部有深红色斑点， 花期 4-5 月
果：果期 6-8 月
生长情况：落叶灌木
校园分布：小树林，操场北面

杜英

杜英科 杜英属
Elaeocarpus decipiens

叶：互生，叶端急尖，披针形
花：白色，裂五瓣，花瓣边缘絮状，花期 6-7 月
果：果椭圆形，成熟后果由绿转黄黑。果期 8-12 月
生长情况：常绿乔木。秋冬至早春部分叶片转为绯红色，红绿相间（原因：低温霜冻的影响下，叶绿素转化为花青素，叶片的绿色被花青素的红色所遮盖）
校园信息：操场北边



枸骨

冬青科 冬青属

Ilex cornuta

叶：叶面深绿具光泽，叶背浅绿无光泽，边缘有尖角
花：一簇簇淡黄色小花，有浓郁香味，花期 4 至 5 月
果：球形，成熟时红色，果期 10 至 12 月
生长情况：四季常绿，为灌木
校园分布：操场东南角

桂花 / 木犀

木犀科 木犀属

Osmanthus fragrans

叶：叶子椭圆形，油亮光滑，部分叶缘有齿
花：一蓬蓬淡黄色小花，四瓣，特别香，花期 9-10 月上旬
果：果子长椭圆形，成熟后由青色变为紫黑色，果期 3 月
生长情况：常绿乔木
校园信息： 分布广泛，小卖部门口开得最盛
相似种：桂花不开时与石楠易混淆，桂花的叶子更卷



广玉兰

木兰科 木兰属
Magnolia grandiflora

叶：叶片较大，叶面深绿色具光泽
花：花大，白色，有芳香，花丝扁平，紫色，花期 5 至 6 月
果：种子近卵圆形，外皮红色，果期 9 至 10 月
生长情况：常绿乔木
校园分布：小树林深处，篮球场南边，花房两侧，多功能厅后草坪，国际部大楼西边，菜地边
相似类：琵琶，不开花时叶片较像，广玉兰叶片油亮且硬质，而琵琶叶面无光泽带毛

海桐

海桐花科 海桐花属
Pittosporum tobira

叶：轮生，边缘光滑，叶端圆形，叶面油亮
花：一簇簇白色的小花，花瓣五片，针形，花期 3 至 5 月
果：种子大，近圆形，绿色，里面的种子为红色，果熟期 9 至 10 月
生长情况：四季常绿，为灌木
校园分布：小树林深处及校园东南面有大片，西北角、东北角也有少许





含笑花

木兰科 含笑属
Michelia figo

叶：叶片椭圆形，光滑
花: 淡黄色, 边缘红紫色, 芳香, 花期 3-5 月,
果：果子球形，果期 7-8 月
生长情况：常绿灌木
校园信息：只有一棵，在小树林



黄金槐

蝶形花科 槐属
Aureus locustae

叶：复叶对生，叶椭圆形，淡黄绿色
枝干：枝金黄色，树干光滑
生长情况：落叶乔木
校园分布：小树林及多功能厅后方草坪







红花檵木

金缕梅科 檵木属

Loropetalum chinense rubrum

叶：叶革质，卵形，先端尖瑞，深紫红色
花：紫红色，披针形，花期 3 至 4 月
果：圆卵形，黑色，发亮
生长情况：灌木或小乔木，校园内只有灌木
校园分布：南北教学楼之间及男寝和食堂之间

夹竹桃

夹竹桃科 夹竹桃属

Nerium indicum

叶：革质，叶狭长，顶端急尖，边缘平滑。表面深绿，叶脉浅青色
花：花顶生，深粉色，花期几乎全年，夏秋为最盛
生长情况：常绿大灌木
校园分布：气象站旁
备注：夹竹桃有毒，勿食



鸡爪槭（红槭是其变种；俗称枫树）

槭树科 槭属

Acer palmatum

叶：5-9 掌状分裂，通常 7 裂，边缘有锯齿
树干：树皮深灰色
花：五瓣紫色小花，花期 4-5 月
果：翅果嫩时紫红色，成熟时淡棕黄色，果期 9 月
生长情况：落叶小乔木
校园分布：报告厅后方正门东面草坪

金边黄杨

卫矛科 卫矛属

Euonymus japonicus aurea-marginatus

叶：叶子椭圆形，边缘金色，有小齿
花：小，淡青色，花瓣近圆形，花期 6-7 月
果：小，红色，球形，果熟期 9-10 月
生长情况：常绿灌木
校园信息：腾飞广场

金叶女贞

木犀科 女贞属

Ligustrum × vicaryi Hort

叶：单叶对生，椭圆形，长 2 ～ 5 厘米
花：一簇簇白色小花
果：椭圆形，成熟后呈紫黑色
生长情况：落叶灌木，丛生
校园分布：操场西南角，小树林道边，科学楼北侧，腾飞广场两侧花坛，校园东南角，南、北教学楼、男女寝、食堂东侧，食堂与男寝之间

蜡梅

蜡梅科 蜡梅属

Chimonanthus praecox

叶：近似椭圆形，叶端急尖，叶面油亮
树干：树干上的一粒粒小突起是皮孔
花：花瓣多瓣，黄色，非常香，花期 11 月到次年 3 月
果：果实俗称土巴豆，刚长出时为青色，后木质化变褐色。
4 月开始结果
生长情况：落叶灌木，先花后叶
校园分布：小树林，女生宿舍与腾飞广场间

柳树（垂柳）

杨柳科 柳属
Salix babylonica

叶：枝细下垂，叶子狭披针形，锯齿缘
树干：树皮灰黑色，不规则开裂
花：有点像狗尾巴草，发出一根根白色花丝，顶端花药黄色，花期 3-4 月
生长情况：乔木，4 月底 5 月初柳絮飘散在空中
校园分布：绕小池塘一周





榔榆

榆科 榆属
Ulmus parvifolia

叶：冬季叶变为黄色或红色，质地厚，椭圆形，叶面深绿色，有光泽，中间有毛，边缘有锯齿
花：秋季开花，小花棕褐色
果：绿色翅果
生长情况：落叶乔木
校园分布：校园东南角靠近藿香路

罗汉松

罗汉松科 罗汉松属

Podocarpus macrophyllus

叶：螺旋形，条状，微弯，上面深绿色，有光泽，中间隆起，下面带灰绿色，中间微隆起

花：雄花为一簇簇小花；雌花单生，有梗

果：种子小，卵形，熟时呈紫黑色，有白粉，种托为圆柱形，紫红色

生长情况：常绿乔木

校园分布：小树林深处

龙爪槐

豆科 槐属

Sophora japonica

叶：羽状复叶，对生，叶子椭圆形
树干：树枝弯曲盘形，蟠曲如龙，树皮灰褐色，有裂纹
花：一串串白色小花，形状奇特，花瓣下翻露出花蕊，中心有黄点，花期 7-8 月
果：小，青色，串珠状，果期 8-10 月
生长情况：落叶乔木
校园信息：小卖部门口与对着的信息楼门口

梅

蔷薇科 杏属

Armeniaca mume

叶：叶端急尖后圆钝，叶缘有小齿
花：花梗短，花瓣重瓣近圆形，梅红色，花期 3 月上旬
果：结青梅，果子青色近圆形，花落后开始结果
相似种：与樱花的叶子略有相似，但梅花叶子的叶尖更长
生长情况：乔木
校园分布：池塘边



马尾松

松科 松属

Pinus massoniana

叶：针叶 2-3 针一束，较长，细柔，微扭曲，边缘有细锯齿

花：2-3 朵一束，淡紫红色

果：果小，呈球形，熟前绿色，熟后褐色，上部有短刺

生长情况：常绿乔木，喜阳

校园分布：校园东南角公路内侧

毛竹

禾本科 刚竹属
Phyllostachys pubescens

叶：细长型
花：花期 5 至 8 月
果：笋期 4 月
相似类：紫竹，毛竹主杆为绿色而紫竹主杆为深色





南天竹

小檗科 南天竹属
Nandina domestica

叶：叶片形似羽毛，一个叶轴上生三片（三回羽状复叶），顶端尖，边缘光滑，新叶为深红褐色
花：白色小花，花蕊黄色，有芳香，花期 3-6 月
果：果子鲜红色，果期 5-11 月
生长情况：常绿小灌木，冬天叶子变红
校园分布：小树林

女贞

木犀科 女真属
Ligustrum lucidum

叶：对生，叶片常绿，革质，长卵形，先端渐尖，叶面光亮，叶缘光滑
花：一簇簇白色小花，花期 5 至 7 月
果：肾形，深蓝黑色，果期 7 月至翌年 5 月
生长情况：灌木或乔木
校园分布：操场西南及西北角，办公楼后草坪
相似类：香樟，两者叶子和果子较像，女贞叶缘更光滑，香樟叶子更软，香樟的果子比女贞大且光亮

雀舌黄杨

黄杨科 黄杨属
Buxus bodinieri

叶：叶子形状如名像雀舌，匙形，叶面光滑油亮
花：一团团白色的小花，花期 2 月
果：果子很小，青色，球形，果期 5-8 月
生长情况：常绿灌木，学校里都修剪成球状
相似种：小叶黄杨，雀舌黄杨的叶子更加细长
校园分布：不多，在男寝门口与食堂东面

枇杷

蔷薇科 枇杷属

Eriobotrya japonica

叶：叶片革质，长圆形，先端渐尖，叶面多皱
花：白色，花瓣卵形，花期 10 至 12 月
果：即枇杷，球形或长圆形，黄色或橘黄色，外有锈色柔毛，不久脱落，果期 5 至 6 月
生长情况：常绿乔木
校园分布：小树林深处
相似类：广玉兰，不开花时叶片较像，枇杷叶面无光泽带毛，而广玉兰叶片油亮且硬质

日本晚樱

蔷薇科 樱属

Cerasus serrulata var. lannesiana

花：粉色，重瓣，花瓣呈心形。花期 4 月
叶：椭圆卵形或倒卵形，顶端渐尖或骤尾尖，边缘有尖锐锯齿。叶脉清晰，新叶为红褐色
树干：树皮上有皮孔
相似种：日本晚樱的叶较长，东京樱花的叶较宽，叶面更光亮，叶脉更明显
生长情况：落叶乔木
校园分布：科学楼前、小池塘边等

石榴

石榴科 石榴属

Punica granatum

叶：枝条长，对生，叶端尖，叶子长椭圆形
花：大，红色，重瓣，近圆形，花期六月
果：结的即石榴
生长情况：落叶乔木
校园信息：菜地小树林，女寝与食堂中间

石楠

蔷薇科 石楠属

Photinia serrulata

叶：边缘有齿，叶端急尖，新生叶片为红色
花：一簇簇白色小花，花瓣五片，近圆形，近闻花很臭
果：果子小，像红色玛瑙
生长情况：四季常绿，长新叶时从远处看植株上层红色特别明显，4 月开花
校园分布：校园东面大量分布，主席台两边的是灌木，操场南边有小乔木形态
相似类：石楠与桂花不开花时易混淆，叶片相似。石楠叶端后部分更肥大，桂花叶端有尖但叶片整体为椭圆状

水杉

杉科 水杉属

Metasequoia glyptostroboides

叶：羽状对生，叶细小而长，顶端圆钝，质地柔软
枝干：树冠广圆形。树皮灰褐色，裂成长条状
果：圆状球形，成熟前绿色，熟时深褐色，球果 11 月成熟
生长情况：落叶乔木
校园分布：校园外围一周，操场西面一整排最为显目



注：除此幅图片以外均为洒金桃叶珊瑚。



桃叶珊瑚

（校内多为其变种：洒金桃叶珊瑚）
山茱萸科 桃叶珊瑚属
Aucuba japonica

叶：叶大，革质，边缘有疏齿。叶子表面有黄色斑点
花：花小，暗紫色，花期 3-4 月
果：球形，鲜红色
枝干：青色
生长情况：常绿灌木
校园分布：小树林、小卖部门口，男女宿舍楼之间

日本珊瑚树

忍冬科 荚蒾属

Viburnum odoratissimum awabuki

叶：革质，顶端渐尖而头钝，边缘有浅波形锯齿叶表面深绿有光泽，背面浅绿
花：花小，白色，花期 5-6 月
生长情况：常绿灌木
校园分布：校园最外围及篮球场周围



小叶黄杨

黄杨科 黄杨属

Buxus sinica var. parvifolia

叶：叶子瓜子形，叶面油亮
花：花朵小，青色偏黄，花期 3 月
果：果子小，青色，球形，果期 5-6 月
生长情况：常绿灌木，种成一排或修剪成圆球形
校园分布：操场南北，国际部与办公楼南面，小树林处，出操广场东面等

梧桐 / 青桐

梧桐科 梧桐属
Firmiana platanifolia

叶：叶片为掌状 3-5 裂，裂变三角形
树干：树皮青绿色，上一块块椭圆形斑纹
花： 淡绿色
果：果子青色圆球形
生长情况：落叶乔木
校园分布：操场北边







杨梅

杨梅科 杨梅属
Cerasus pseudocerasus

叶：叶革质，无毛，先端尖，上面深绿色，下面浅绿色，常密集于小枝上端部分
花：形状似柳树的花，花药暗红色，花期 4 月
果：即杨梅，球形，果 6 至 7 月成熟
生长情况：常绿乔木
校园信息：只有小树林里有一棵

香樟

樟科 樟属

Cinnamomum camphora

叶：叶革质，卵圆形，顶端渐尖。叶面深绿，有光泽。叶脉上有明显突起的腺体，搓揉后有特殊香味。先长新叶后落叶，3-4 月换新叶
枝干：树干褐色，有不规则纵裂
花：花小，黄绿色，花期 4-5 月
果：小，球形，紫黑色，果期 8-11 月
生长情况：常绿乔木
校园分布：到处都是，路边上全是



雪松

松科 雪松属

Cedrus deodara

叶：叶一簇簇，坚硬，绿色，针叶呈三棱形，幼时有白粉
花：花小，卵形
果：果球形，成熟前淡绿色，微有白粉，成熟后红褐色，卵形，有短梗
生长情况：常绿乔木
校园分布：小树林深处，操场东南角，校园东侧树林靠近藿香路

银杏

银杏科 银杏属
Ginkgo biloba

叶：互生，叶柄长，扇形，淡绿色
树干：粗糙，有裂纹
花：雌雄异株，花青色。雌花似火柴梗，一长柄载一对胚珠；雄花似柳树的花，一簇簇下垂
果：即白果，成熟时为黄色，近球形，有臭味
生长情况：落叶大乔木，秋季叶子变黄掉落，十分美丽
校园信息：出操广场入口，操场北面，南北教学楼之间。校园里雄株极少，南北教学楼之间有一棵



樱桃

蔷薇科 李属

Cerasus pseudocerasus

叶：叶片卵形，先端渐尖，边缘有齿，沿脉有稀疏柔毛

花：花瓣白色，卵圆形，花期 4 月

果：即樱桃，近球形，果期 5 至 6 月

生长情况：乔木

校园信息：只有小树林里有一棵

玉兰

木兰科 木兰属

Magnolia denudata

叶: 叶薄, 形似羽毛, 顶端尖细, 背面叶脉突起。先花后叶。

花：花大，白色。花瓣较厚，形似勺子，基部有粉色。具有芳香。花期 2-3 月，7-9 月常会再开一次花。

枝干：树皮深灰色，粗糙开裂。

生长情况：落叶乔木。

校园分布：小树林里有一棵，东南角草坪那里有几棵。

备注：上海市市花，又称白玉兰。

紫荆

豆科 紫荆属

Cercis chinensis

叶：叶片绿色，近心形
树干：树皮和小枝灰白色
花：簇生，花瓣紫红色或粉红色，花期 3-4 月
果：绿色的荚果狭长形，像荷兰豆，干枯后褐色，果期 8-10 月
生长情况：丛生或单生灌木
校园分布：小树林靠近菜地

紫薇

千屈菜科 紫薇属

Lagerstroemia indica

枝干：树皮平滑，灰褐色，枝干大多扭曲
花：花瓣 6 片，皱缩，花色为粉、紫或白色。花期 6-9 月
叶：叶薄，椭圆形，顶端短尖或钝形，有时微凹。4 月开始长新叶，新叶呈红褐色
生长情况：落叶小乔木
校园分布：科学楼与篮球场之间、男寝与食堂之间





紫叶李

蔷薇科 李属

Prunus cerasifera Ehrhar f. atropurpurea (Jacq.) Rehd.

叶：常年紫红色，边缘有齿
花：花瓣白色，近圆形，花期 4 月
果：近球形，微被蜡粉，果期 8 月
生长情况：灌木或乔木，校园内为乔木
校园分布：菜地边，花房后草坪，校园东北角

紫竹

禾本科 刚竹属
Phyllostachys nigra

叶：细长型
果：笋期四月下旬
相似类：毛竹，紫竹主杆为深色而毛竹主杆为绿色

栀子

茜草科 栀子属
Gardenia jasminoides

叶：叶对生。革质，表面有光泽。椭圆形，顶端渐尖，边缘光滑。叶表面为青色，叶脉为绿色，密布绿色小裂纹，有点像大脑。
花：花大，白色，子房为黄色，花瓣较厚。有浓郁香气。花期5-7月。
生长情况：常绿灌木。
校园分布：南北教学楼之间、男寝与食堂之间。

藤本植物

葡萄

葡萄科 葡萄属

Vitis vinifera

叶：掌形，3-5 裂，叶边有齿

花：花小且奇特，只见一个青色小球，球周围发出六根花丝，球中心一根花柱，有香味，花期 4-5 月

果：葡萄，成熟后由青色转为紫黑色，果期 8-9 月

生长情况：木质藤本，秋冬落叶

校园信息：池畔，由于气候原因，果基本无法食用

乌蔹莓

葡萄科 乌蔹莓属
Cayratia japonica

叶：叶为鸟足状五小叶，小叶长椭圆形，边缘有锯齿
花：四瓣，花瓣小且颜色鲜艳，有粉色、橙色、红色等，花期 3-8 月
果：果子球形，成熟后由青色变为紫黑色，果期 8-11 月
生长情况：草质藤本，因叶柄形似五爪，又称五爪金龙



紫藤

豆科 紫藤属
Wisteria sinensis

叶：奇数羽状复叶。叶呈宽椭圆形，顶端渐尖，背面叶脉突起。新叶浅红褐色。
花：蝶形花冠，紫色，一串串地长，有香气。花期 4-5 月。
果：荚果扁平细长，坚硬，有很密的绒毛。
生长情况：落叶木质藤本。
校园分布：秋千附近以及图书馆与竹林之间。

华东师范大学第二附属中学 校园植物志

摄影：林丹、邬嘉诚
编辑：薛航、林丹、李经纶、潘岱松、邬嘉诚、叶之颖
排版：许瀞云
审校：薛航
（注：除了叶之颖为 2015 届学生，其余均为 2014 届出国 / 保送学生）
指导老师：王保卫

完成于二零一四年三月至九月