# 認識思覺失調症

## 一、 什麼是「思覺失調症」

思覺失調症是一種思考、情緒、知覺障礙的大腦疾病，有不合現實的想法或意念及生活功能嚴重受損（如：自我照顧、人際關係、因應能力、職業及社交等功能）。病程必須超過六個月以上才能確定此診斷。

## 二、 思覺失調症是如何發生的

主要原因與大腦的神經傳導物質不平衡有關。雖有家族傾向，親屬得病機率比一般人高，但整體上機率仍低，因此並不是得了思覺失調症的人就不能結婚或不能生小孩。

## 三、 思覺失調症可以治療嗎

思覺失調症可以治療，早期治療可避免疾病惡化。治療方法包括：藥物、家庭、心理、職能、環境及復健治療。急性期以藥物治療為主，慢性期則以精神復健，強調技能訓練與再教育為主，但藥物仍須持續規則服用。

## 四、 思覺失調症有哪些症狀

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| **幻覺**<br>有視、聽、嗅、觸幻覺等。 | **妄想**<br>錯誤且偏離事實的想法。 | **思考過程障礙**<br>胡言亂語、言語片段或停頓、自創新字等。 | **人際關係**<br>疏離、退縮。 | **情感冷漠**<br>缺乏情緒表達。 | 出現**攻擊、破壞、自殺**等**不適當行為**。 |

## 五、 思覺失調症會造成哪些社會功能受損

(一) 自我照顧技巧退化(如：不會自己刷牙、洗澡等)。

(二) 生活作息懶散，缺乏主動性(如：未主動服藥等)。

(三) 人際關係不良、退縮、孤僻(如：不與人說話等)。



(四) 情緒控制不良與壓力處理不當(如：容易生氣等)。

(五) 因應能力減弱(如：無法適應新環境或事物等)。

(六) 處理家事與理財的能力變差(如：不會洗衣煮飯、買東西等)。

(七) 資源應用的能力減退(如：不會自己搭公車等)。

(八) 喪失積極生活的態度與工作的動機(如，不想工作等)。

## 六、 思覺失調症的預後如何

思覺失調症預後，視個人體質、發病年齡、發作次數、病前性格、症狀嚴重程度...等。一般而言，經過治療大約 30%的人可以從事簡單工作，30%的人可以自我照顧，其餘 40%人需要長期慢性療養。

## 七、 如何照顧思覺失調症的病人

身為思覺失調症病人的家屬，在照顧病人時，有下列幾點必須注意：

(一) 一有前兆，馬上治療，以免錯過治療時機。

(二) 配合醫療團隊充分溝通，思覺失調症是一種疾病，就像心臟病、高血壓或糖尿病一樣，患者必須按時服藥才能維持身體及大腦健康。

(三) 提供支持疏通情緒，家屬在一開始時，應盡量減少病人的心理負擔， 同時也不要對病人有過高的期望，隨著病人功能的慢慢好轉，家屬才漸漸提高期望，以減少挫折感。

(四) 家屬在照顧病人過程中，遇到任何困難或挫折，可隨時向醫院的精神科醫師、社工師、或心理師尋求專業或情緒上的支持與援助。

[參考資料]
1. 最新精神科護理學(永大，2015)
2. 精神科護理概論-基本概念及臨床應用(華杏，2017)

為恭醫療財團法人為恭紀念醫院護理部編印
本衛教指導單張經醫療團隊檢視，內容僅供參考，仍需以病人狀況，由醫療團隊給予最佳照護，如對日常保健有問題者，請洽詢：
東興院區 精神科七病房 電話：037-676811 轉 57700