幻聽症狀之照護

最近修訂: 2026-08-21

【本篇學習重點】

1. 幻聽可能會影響日常生活、自我照顧或工作能力。
2. 運動、聽音樂或深呼吸等措施，可轉移對幻聽注意力。
3. 依照醫師指示規律服藥可以改善幻聽症狀。

一、什麼是幻聽？

幻聽是一種對聲音的幻覺，身旁沒有人或者沒有任何外來的刺激，仍然會感覺有人在身旁說話或發出聲音，可能會影響日常生活作息、自我照顧能力、社交或工作能力等。

二、我該注意什麼?

以下幾種情況下，可能會有幻聽發生：

1. 父母或親人有思覺失調症或其他精神疾病。
2. 成長過程腦部發育出現問題。
3. 發生重大意外事件，如車禍導致腦部損傷。
4. 過量飲酒、藥物濫用導致腦部病變。

三、幻聽的種類有哪些?

常見的幻聽是大腦聽見「有人在說話」可能是一個或多人的聲音，聲音可能是在批評、責罵、讚美、說笑話或命令要求做出傷害自己或他人的行為。另外也有聽到的是走路、爬樓梯聲音、機械聲、動物叫聲或從自己或別人的身體裡面發出的聲音等。

四、幻聽症狀出現該怎麼處理?

1. 幻聽症狀發生時的應對方法：
    A. 當幻聽出現，可以摀住耳朵或詢問身旁的人，有沒有跟自己聽到一樣的聲音，用來區分是不是有幻聽。
    B. 藉由駁回或停止思考的技巧方法，可以離開現場或對幻聽說停下來、走開或藉由找人講話、看電視、聽音樂、運動、寫字、散步、深呼吸放鬆等行為轉移注意力，或塞耳塞、不予理會，阻斷幻聽或減輕幻聽所帶來的不舒服情緒。
    C. 如果自己覺得情緒受到幻聽影響，感覺快要失控，可能會出現生氣、想打人、砸東西或傷害自己等行為時，應儘快至精神科門診就醫。
2. 幻聽症狀平時的應對方法：

A. 鼓勵增加人際接觸，主動把自己的想法與家人或信任的朋友分享，以區分幻覺與現實，並藉此獲得情感支持及社交能力。
B. 依照醫師指示，正確的按時服用藥物，觀察服用藥物後的反應和效果，並且適時與醫師溝通討論。
C. 透過正念的練習(由轉移注意力、重新適應及接受幻聽) ，來減少幻聽帶來的負面情緒。(延伸閱讀：負向情緒之處理)
D. 需避免喝酒及物質濫用，以避免造成復發。

參考資料

1. Arianti, S. F., & Puspasari, F. D. (2025). Nursing care for NY. L patients with schizophrenia auditing hallucinations using technique intervention. Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), 2(2), 1735-1742. https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.505
2. Giersch, A., Ferri, F., Park, P., Thompson, J. L., & Humpston, C. S. (2025). Bodily self-disturbances and hallucinations in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 51(Suppl. 3), S241-S252. https://doi.org/10.1093/schbul/sbaf063
3. Madani, M., Sabet, F. H., & Borjali, A. (2023). The effect of attentional avoidance, attentional focusing, and mindfulness on the frequency of voice-hearing and associated distress in people with schizophrenia: A randomized controlled trial. Iranian Journal of Psychiatry, 18(2), 108-118. https://doi.org/10.18502/ijps.v18i2.12361
4. Putri, N. D., & Suryawantie, T. (2026). Analysis of mental nursing care for sensory perception disorder: Auditory hallucinations with thought stopping therapy. Nursing Case Insight Journal, 4(1), 1-4. https://doi.org/10.63166/6m12q691
5. Yang, S., Zhou, W., Qin, Y., Zheng, T., Huang, F., Li, C., Dai, J., Zhou, L., Li, L., Wu, F., & Tang, Q. (2026). Mindfulness-based group therapy for auditory hallucination management in schizophrenia: A randomized controlled trial. Journal of Psychiatric Research, 196, 53-60. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2026.02.019

準備好了嗎?讓我們來牛刀小試一下

請您試著回答下列問題：

1. 幻聽是身旁沒有人的時候或者沒有任何外來的刺激，仍然會感覺有人在身旁發出聲音或說話。

○ 是 ○ 否 ○ 不知道

2. 看電視、聽音樂、深呼吸放鬆等方法，沒有辦法抒發情緒及轉移對幻聽的注意力。

○ 是 ○ 否 ○ 不知道

3. 想確認是不是幻聽，可以摀住耳朵或詢問身旁的人，有沒有跟自己一樣聽到相同的聲音，來區分有沒有幻聽的存在。

○ 是 ○ 否 ○ 不知道

4. 幻聽是指有人故意製造吵鬧的聲音或刻意謾罵所造成困擾。

○ 是 ○ 否 ○ 不知道

5. 如果遇到幻聽，可以對幻聽說「停」、「走開」或聽音樂等方法可以減輕幻聽帶來的不舒服情緒。

○ 是 ○ 否 ○ 不知道

請您填答護理指導的滿意度

統計結果不開放

☆☆☆☆☆

臺北榮民總醫院

11217臺北市北投區石牌路二段201號

(02)2871-2121

人工預約掛號電話：02-28712151

語音預約掛號電話：02-28732151

提醒您

- 吸菸、嚼檳榔會導致口腔癌，肥胖會增加乳癌及大腸癌之罹患風險，請控制體重並遠離菸及檳榔。
- 本網站所提供之資訊不能取代醫師之治療及醫師與病人之關係。

臺北榮民總醫院護理部　著作權所有