思覺失調症之照護

最近修訂: 2025-06-13

【本篇學習重點】

1. 思覺失調症的病因可能與大腦分泌物異常有關。
2. 思覺失調症會有妄想、幻覺、思考障礙等症狀。
3. 除了藥物治療，配合接受情緒與疾病管理、人際溝通等練習。

一、什麼是思覺失調症？

思覺失調症是一種嚴重精神疾病，是因為腦部的功能失調所引起，真正的病因目前仍未能確定，大部分的學者認為思覺失調症是腦部分泌的化學物質(如多巴胺)異常所造成，導致病人產生幻覺(能感覺到一些不存在的事物)、妄想(不符合事實，但病人堅信不疑的想法)及其他思想障礙(大腦失去正常思考的能力，沒有連貫性、邏輯性、目的性及整合能力)的病況，因此可以使用藥物來平衡腦部的分泌的物質以穩定疾病症狀。

二、思覺失調症有那些症狀？

思覺失調症主要出現想法的（認知）問題、行為的問題和情緒問題。

1. 明顯可以被察覺到脫離現實的症狀，例如:會有不符合現實的想法,對現實環境做錯誤的推論或解釋且深信不疑的妄想症狀,或出現看到、聽到或感受到不存在的事物等幻覺症狀，通常會合併出現怪異的行為。
2. 紊亂的思緒，也就是「思考障礙」，意思是失去正常思考的連貫性、邏輯性、目的性等，並且對於把事物整合在一起的能力受到影響，會出現「語無倫次」(人家問東他回答西)，「行為怪異」(天氣冷的時候穿很少、天氣熱的時候還穿著厚外套)，且生活懶散、缺乏動機及意志力、沒有表情、不說話，退縮在家不出門、不與人互動及對生活的事務不感興趣。
3. 不恰當的情緒表達，「情感障礙」(過度的開心或難過、該難過的時候卻笑得很開心)，或是提及傷心事即嚎啕大哭，一點小事則誇張地哈哈大笑等行為。

有上述症狀，不一定是思覺失調症，若您有上述症狀，請至精神科門診就醫。

三、思覺失調症要怎麼治療？

思覺失調症不是使用單一種方法就可以治療好的。急性期也就是在疾病症狀明顯，可能有傷害自己或傷害他人的時候，主要以抗精神病藥物治療，必要時，合併使用精神安定劑或抗焦慮劑，來穩定焦慮或誇張、變化的情緒；慢性期也就是妄想或者幻覺的症狀減少，受疾病的影響出現較退縮、不想動的情形，除了精神病藥物之外，則依個別需求加強情緒管理、疾病管理及人際互動技巧訓練，以增進人際互動能力及提升自信心。(延伸閱讀：負向情緒之處理、精神科病人服藥的遵從性、精神病人之人際技巧訓練)

四、得了思覺失調症，要怎麼照顧自己？

1. 面對疾病有下列的處理方法：

    A. 當妄想或幻覺出現時，除了服藥外，可找人聊天、聽音樂、看電視、看電影等，作一些可以轉移注意力的活動以減緩對生活的影響。(延伸閱讀：幻聽症狀之照護)
    B. 若不想出門、不想和別人互動，對生活的事務提不起勁，則協助確認自己的長處及特質，強化自信心，並維持規律生活作息。
    C. 當病人情緒控制力、主動參與人際互動及社交技巧等活動有好的表現時，立即給予嘉許，以增加其改變動機。
2. 預防疾病復發有下列方法：

    A. 加強病識感，建立病人規則服藥的習慣，可以配合使用藥盒，以提醒自己正確服藥。
    B. 學習壓力因應技巧，如放鬆技巧、聽音樂等緩解壓力。
    C. 參加復健治療活動，讓生活作息安排規律，例如參加支持性團體活動，可增加人際互動機會以外，也可以提昇自信心。
    D. 定期運動計畫，例如：快步走、有氧舞蹈、慢跑、跳繩等有氧運動，除了可以促進腦血流量、改善認知功能、提升心肺功能以及促進情緒穩定。
    E. 應避免喝酒及物質濫用。
    F. 定期返診，適時與醫師討論病情、用藥劑量、服藥次數等。

參考資料

1. 廖悅妘、楊佩靜、吳瑞珍（2023）．運用賦權概念照顧一位思覺失調症病人之護理經驗．嘉基護理，23(2)，52-61。
2. Galderisi, S., Kaiser, S., Bitter, I., Nordentoft, M., Mucci, A., Sabé, M., Giordano, G. M., Nielsen, M. Ø., Glenthøj, L. B., Pezzella, P., Falkai, P., Dollfus, S., & Gaebel, W. (2021). EPA guidance on treatment of negative symptoms in schizophrenia. European Psychiatry, 64(1), E21. https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2021.13
3. Maroney, M. (2022). Management of cognitive and negative symptoms in schizophrenia. Mental Health Clinician. 12(5), 282-299. https://doi.org/10.9740/mhc.2022.10.282

準備好了嗎?讓我們來牛刀小試一下。

請您試著回答下列問題：

1. 思覺失調症可能是因為腦部的功能失調所引起，大部分的學者認為是腦部分泌的化學物質異常所造成。

○ 是 ○ 否 ○ 不知道

2. 出現妄想、幻覺的人一定是思覺失調症。

○ 是 ○ 否 ○ 不知道

3. 思覺失調症不是使用單一種方法就可以治療好的。

○ 是 ○ 否 ○ 不知道

4. 服用抗精神病藥物期間可以喝酒。

○ 是 ○ 否 ○ 不知道

5. 當有幻覺時可以找人聊天、聽音樂、看電視等方法轉移注意力，以減緩症狀對生活的影響。

○ 是 ○ 否 ○ 不知道

請您填答護理指導的滿意度

統計結果不開放

☆☆☆☆☆

臺北榮民總醫院

11217臺北市北投區石牌路二段201號

(02)2871-2121

人工預約掛號電話：02-28712151

語音預約掛號電話：02-28732151

提醒您

- 吸菸、嚼檳榔會導致口腔癌，肥胖會增加乳癌及大腸癌之罹患風險，請控制體重並遠離菸及檳榔。
- 本網站所提供之資訊不能取代醫師之治療及醫師與病人之關係。

臺北榮民總醫院護理部　著作權所有