제 2 교시

수학 영역

5 지 선 다 형

- 1. $\sqrt[3]{8} \times \frac{2^{\sqrt{2}}}{2^{1+\sqrt{2}}}$ 의 값은? [2점]
 - ① 1 ② 2 ③ 4
- **4** 8
- **⑤** 16
- $oldsymbol{\mathcal{J}_n}$ 등비수열 $\left\{a_n
 ight\}$ 이

$$a_5 = 4$$
, $a_7 = 4a_6 - 16$

- 을 만족시킬 때, a_8 의 값은? [3점]

- ① 32 ② 34 ③ 36
- **4** 38
- **⑤** 40

- 2. 함수 $f(x) = 2x^3 x^2 + 6$ 에 대하여 f'(1)의 값은? [2점]
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

- 4. 다항함수 f(x)가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_{1}^{x} f(t) dt = x^3 - ax + 1$$

- 을 만족시킬 때, f(2)의 값은? (단, a는 상수이다.) [3점]


- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14
- ⑤ 16

 $5. \cos(\pi+\theta) = \frac{1}{3}$ 이고 $\sin(\pi+\theta) > 0$ 일 때, $\tan\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-2\sqrt{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $2\sqrt{2}$
- 3 1

7. 함수 $y = |x^2 - 2x| + 1$ 의 그래프와 x축, y축 및 직선 x = 2로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

- ② 3 ③ $\frac{10}{3}$ ④ $\frac{11}{3}$ ⑤ 4



6. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - ax + 1 & (x < 2) \\ -x + 1 & (x \ge 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합은? [3점]

- \bigcirc 5
- ② 6
- ③ 7
- **4** 8
- **⑤** 9


- **8.** 두 점 A(m, m+3), B(m+3, m−3)에 대하여 선분 AB를 2:1로 내분하는 점이 곡선 $y = \log_4(x+8) + m - 3$ 위에 있을 때, 상수 *m*의 값은? [3점]
- ① 4
- $2\frac{9}{2}$ 3 5 $4\frac{11}{2}$
- ⑤ 6

- 9. 함수 $f(x) = |x^3 3x^2 + p|$ 는 x = a와 x = b에서 극대이다. f(a) = f(b)일 때, 실수 p의 값은? (단, a, b는 a≠b인 상수이다.) [4점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

- $\emph{10.}$ 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_{10} 의 값은? [4점]
 - (7) $|a_4| + |a_6| = 8$
 - (나) $\sum_{k=1}^{9} a_k = 27$
 - ① 21
- ② 23
- 325
- **4** 27
- \bigcirc 29

11. 그림과 같이 $\angle BAC = 60^{\circ}$, $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$, $\overline{BC} = 2\sqrt{3}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 내부의 점 P에 대하여 ∠PBC=30°, ∠PCB=15°일 때, 삼각형 APC의 넓이는? [4점]




- ① $\frac{3+\sqrt{3}}{4}$ ② $\frac{3+2\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$

12. 곡선 $y=x^2$ 과 기울기가 1인 직선 l이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 양의 실수 t에 대하여 선분 AB의 길이가 2t가 되도록 하는 직선 l의 y절편을 g(t)라 할 때,

 $\lim_{t\to\infty}\frac{g(t)}{t^2}$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1



13. 두 함수

$$f(x) = x^2 + ax + b, \quad g(x) = \sin x$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, f(2)의 값은? (단, a, b는 상수이고, $0 \le a \le 2$ 이다.) [4점]

- $(7) \ \{g(a\pi)\}^2 = 1$
- (나) $0 \le x \le 2\pi$ 일 때, 방정식 f(g(x)) = 0의 모든 해의 합은 $\frac{5}{2}\pi$ 이다.
- ① 3

- $2\frac{7}{2}$ 34 $4\frac{9}{2}$
- \bigcirc 5

14. 세 양수 a, b, k에 대하여 함수 f(x)를

$$f(x) = \begin{cases} ax & (x < k) \\ -x^2 + 4bx - 3b^2 & (x \ge k) \end{cases}$$

라 하자. 함수 f(x)가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

- ㄱ. a=1이면 f'(k)=1이다.
- -. k=3이면 $a=-6+4\sqrt{3}$ 이다.
- ㄷ. f(k) = f'(k)이면 함수 y = f(x)의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 $\frac{1}{3}$ 이다.
- \bigcirc
- ② ¬, ∟
- ③ ¬, ⊏

- ④ ∟, ⊏
- ⑤ 7, ∟, ⊏

 $\emph{15.}$ 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+2} = \left\{ \begin{array}{ll} a_{n+1} + a_n & (a_{n+1} + a_n) \ \, \mathring{\underline{s}} 수인 \ \, 경우) \\ \\ \frac{1}{2}(a_{n+1} + a_n) \ \, (a_{n+1} + a_n) \ \, \mathring{\underline{a}} 수인 \ \, 경우) \end{array} \right.$$

를 만족시킨다. $a_1=1$ 일 때, $a_6=34$ 가 되도록 하는 모든 a_2 의 값의 합은? [4점]

- ① 60
- 2 64
- 3 68
- **4** 72
- **⑤** 76

단 답 형

$$16 \log_2 96 - \frac{1}{\log_6 2}$$
의 값을 구하시오. [3점]

17. 직선 y=4x+5가 곡선 $y=2x^4-4x+k$ 에 접할 때, 상수 k의 값을 구하시오. [3점]

18. n이 자연수일 때, x에 대한 이차방정식

$$x^2 - 5nx + 4n^2 = 0$$

의 두 근을 α_n , β_n 이라 하자.

$$\sum_{n=1}^{7} (1-\alpha_n)(1-\beta_n)$$
의 값을 구하시오. [3점]

19. 시각 t=0일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \ge 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = 3t^2 - 15t + k, \quad v_2(t) = -3t^2 + 9t$$

이다. 점 P와 점 Q가 출발한 후 한 번만 만날 때, 양수 k의 값을 구하시오. [3점]


20. 최고차항의 계수가 1이고 f(0) = 1인 삼차함수 f(x)와 양의 실수 p에 대하여 함수 g(x)가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(7) \ g'(0) = 0$$

(나)
$$g(x) = \begin{cases} f(x-p) - f(-p) & (x < 0) \\ f(x+p) - f(p) & (x \ge 0) \end{cases}$$

$$\int_0^p g(x) dx = 20$$
일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 그림과 같이 1보다 큰 두 실수 a, k에 대하여 직선 y=k가 두 곡선 $y=2\log_a x+k$, $y=a^{x-k}$ 과 만나는 점을 각각 A, B라하고, 직선 x=k가 두 곡선 $y=2\log_a x+k$, $y=a^{x-k}$ 과 만나는 점을 각각 C, D라 하자. $\overline{AB} \times \overline{CD} = 85$ 이고 삼각형 CAD의 넓이가 35일 때, a+k의 값을 구하시오. [4점]



22. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 f(x)가 있다.

실수 t에 대하여 함수 g(x)를 g(x) = |f(x) - t|라 할 때,

 $\lim_{x\to k}\frac{g(x)-g(k)}{|x-k|}$ 의 값이 존재하는 서로 다른 실수 k의 개수를 h(t)라 하자.

함수 h(t)는 다음 조건을 만족시킨다.

- $(7) \lim_{t \to 4+} h(t) = 5$
- (나) 함수 h(t)는 t=-60과 t=4에서만 불연속이다.

f(2) = 4이고 f'(2) > 0일 때, f(4) + h(4)의 값을 구하시오. [4점]

- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기) 했는지 확인하시오.
- 이어서, 「**선택과목(확률과 통계)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제2교시

수학 영역(확률과 통계)

5 지 선 다 형

23. ₃P₂+₃Π₂의 값은? [2점]

① 15 ② 16

③ 17 ④ 18

⑤ 19

24. 5명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

① 16 ② 20

3 24

4 28

(5) 32

25. 문자 A, A, B, B, B, C, C가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드를 모두 일렬로 나열할 때, 양 끝 모두에 B가 적힌 카드가 놓이도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 문자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) [3점]

① 45 ② 50

3 55

4) 60

⑤ 65



26. 서로 다른 공 6개를 남김없이 세 주머니 A, B, C에 나누어 넣을 때, 주머니 A에 넣은 공의 개수가 3이 되도록 나누어 넣는 경우의 수는? (단, 공을 넣지 않는 주머니가 있을 수 있다.) [3점]

① 120 ② 130

③ 140

4 150


(5) 160

27. 방정식 a+b+c+3d=10을 만족시키는 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수는? [3점]

- ① 15
- ② 18
- ③ 21
- **4** 24
- ⑤ 27

28. 원 모양의 식탁에 같은 종류의 비어 있는 4개의 접시가 일정한 간격을 두고 원형으로 놓여 있다. 이 4개의 접시에 서로 다른 종류의 빵 5개와 같은 종류의 사탕 5개를 다음 조건을 만족시키도록 남김없이 나누어 담는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]

- (가) 각 접시에는 1개 이상의 빵을 담는다.
- (나) 각 접시에 담는 빵의 개수와 사탕의 개수의 합은 3 이하이다.
- ① 420
- 2 450
- 3 480
- **4** 510
- **⑤** 540



수학 영역(확률과 통계)

고 3

단 답 형

- 29. 숫자 1, 2, 3 중에서 중복을 허락하여 다음 조건을 만족시키도록 여섯 개를 선택한 후, 선택한 숫자 여섯 개를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수를 구하시오. [4점]
 - (가) 숫자 1, 2, 3을 각각 한 개 이상씩 선택한다.
 - (나) 선택한 여섯 개의 수의 합이 4의 배수이다.

- 30. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$ 의 개수를 구하시오. [4점]
 - (가) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1 , x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \le f(x_2)$ 이다.
 - (나) $f(2) \neq 1$ 이고 $f(4) \times f(5) < 20$ 이다.

- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기) 했는지 확인하시오.
- 이어서, 「**선택과목(미적분)**」 문제가 제시되오니, 자 신이 선택한 과목인지 확인하시오.