

2019학년도 3월 고2 전국연합학력평가 정답 및 해설

• 수학 영역 •

나형 정답

1	③	2	④	3	①	4	②	5	⑤
6	⑤	7	③	8	④	9	⑤	10	①
11	④	12	③	13	①	14	②	15	③
16	②	17	⑤	18	④	19	①	20	②
21	⑤	22	12	23	29	24	11	25	9
26	36	27	8	28	576	29	87	30	26

해설

1. [출제의도] 다항식의 덧셈을 계산한다.

두 다항식 $A=2x^2+xy$, $B=x^2-2xy$ 에서
 $A+B=(2x^2+xy)+(x^2-2xy)$
 $= (2x^2+x^2)+(xy-2xy)$
 $= 3x^2-xy$

2. [출제의도] 합집합의 원소의 합을 구한다.

$A \cup B = \{1, 2\} \cup \{2, 3\}$
 $= \{1, 2, 3\}$
 이므로 집합 $A \cup B$ 의 모든 원소의 합은
 $1+2+3=6$

3. [출제의도] 직선의 방정식을 이해한다.

직선 $12x-2y+5=0$ 에서
 $y=6x+\frac{5}{2}$
 따라서 직선 $12x-2y+5=0$ 의 기울기는 6이다.

4. [출제의도] 복소수의 곱을 계산한다.

$i(1+i)=i+i^2$
 $=i-1$
 $=-1+i$

5. [출제의도] 항등식의 성질을 이해한다.

다항식 x^3-1 을 인수분해하면
 $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$
 이므로
 $a=1$, $b=1$
 따라서 $a+b=2$
[다른 풀이 1]
 $x^3-1=(x-1)(x^2+ax+b)$
 $=x^3+(a-1)x^2+(b-a)x-b$
 이므로 양변의 계수를 비교하면
 $a-1=0$, $b-a=0$, $-b=-1$
 $a=1$, $b=1$
 따라서 $a+b=2$

[다른 풀이 2]

모든 실수 x 에 대하여 등식
 $x^3-1=(x-1)(x^2+ax+b)$ ㉠
 이 성립하므로 ㉠의 양변에 적당한 x 의 값을 대입하여도 등식이 성립한다.
 등식 ㉠에 $x=0$ 을 대입하면
 $-1=-b$ 에서 $b=1$
 등식 ㉠에 $x=-1$ 을 대입하면
 $-2=-2(2-a)$ 에서 $a=1$
 따라서 $a+b=2$

6. [출제의도] 조합의 뜻을 이해한다.

서로 다른 6개의 과목 중에서 서로 다른 3개를 선택하는 경우의 수는 서로 다른 6개 중에서 3개를 선택하는 조합의 수 ${}_6C_3$ 과 같으므로

$${}_6C_3 = \frac{{}_6P_3}{3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$$

7. [출제의도] 역함수의 성질을 이해한다.

주어진 그림에서
 $f(2)=1$, $f(4)=3$
 함수 f 는 일대일대응이므로 역함수의 성질에 의하여
 $f^{-1}(3)=4$
 따라서
 $f(2)+f^{-1}(3)=1+4=5$

8. [출제의도] 합성함수의 뜻을 이해한다.

$f(x)=2x-1$ 에서
 $f(5)=2 \times 5-1=9$
 이므로
 $(f \circ f)(5)=f(f(5))=f(9)$
 $=2 \times 9-1=17$

[다른 풀이]

$(f \circ f)(x)=f(f(x))$
 $=f(2x-1)$
 $=2(2x-1)-1$
 $=4x-3$

이므로

$(f \circ f)(5)=4 \times 5-3=17$

9. [출제의도] 이차방정식과 이차함수의 관계를 이해한다.


이차함수 $y=2x^2+ax-1$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점의 x 좌표는 이차방정식 $2x^2+ax-1=0$ 의 두 실근과 같다.
 이때 이차방정식 $2x^2+ax-1=0$ 의 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 $-\frac{a}{2}$ 이다.

따라서 $-\frac{a}{2}=-1$ 에서

$a=2$

10. [출제의도] 원의 성질을 이용하여 선분의 길이의 최솟값을 추론한다.

점 A의 좌표가 (4, 3)이므로
 $\overline{OA}=\sqrt{4^2+3^2}=5$
 점 P는 원 $x^2+y^2=16$ 위의 점이므로
 $\overline{OP}=4$
 이때 그림과 같이 임의의 점 P에 대하여
 $\overline{OA} \leq \overline{OP} + \overline{PA}$
 가 성립하므로
 $\overline{AP} \geq \overline{OA} - \overline{OP} = 5-4=1$
 따라서 선분 AP의 길이의 최솟값은 1이다.



11. [출제의도] 연립방정식을 이해하여 해를 구한다.

$x-2y=1$ 에서
 $x=2y+1$ ㉠
 ㉠을 $x^2-4y^2=5$ 에 대입하면
 $(2y+1)^2-4y^2=5$
 $(4y^2+4y+1)-4y^2=5$
 $4y+1=5$
 $y=1$ ㉡
 ㉡을 ㉠에 대입하면
 $x=2 \times 1+1=3$
 따라서 $a=3$, $b=1$ 이므로

$$a+b=4$$

[다른 풀이]

$x-2y=1$ ㉢
 $x^2-4y^2=5$ ㉣
 ㉢의 좌변을 인수분해하면
 $(x-2y)(x+2y)=5$ ㉤
 ㉢을 ㉤에 대입하면
 $x+2y=5$ ㉥
 ㉢, ㉥을 연립하면
 $x=3$, $y=1$
 따라서 $a=3$, $b=1$ 이므로
 $a+b=4$

12. [출제의도] 절댓값을 포함하는 일차부등식의 해를 추론한다.

a 는 자연수이므로 $|x-3| \leq a$ 에서
 $-a \leq x-3 \leq a$
 $3-a \leq x \leq 3+a$ ㉦
 부등식 ㉦을 만족시키는 정수 x 의 개수는
 $(3+a)-(3-a)+1=2a+1$
 $2a+1=15$ 에서
 $a=7$

13. [출제의도] 나머지정리를 이해하여 미지수를 구한다.

다항식 $f(x)$ 를 $(x-3)(2x-a)$ 로 나눈 몫이 $x+1$ 이고 나머지가 6이므로
 $f(x)=(x-3)(2x-a)(x+1)+6$ ㉧
 다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 6이므로 나머지정리에 의해 $f(1)=6$ 이다.
 ㉧에 $x=1$ 을 대입하면
 $f(1)=(1-3)(2-a) \times 2+6$
 $=-4(2-a)+6$
 $=-8+4a+6$
 $=4a-2$
 따라서 $4a-2=6$, $a=2$

[다른 풀이]

다항식 $f(x)$ 를 $(x-3)(2x-a)$ 로 나눈 몫이 $x+1$ 이고 나머지가 6이므로
 $f(x)=(x-3)(2x-a)(x+1)+6$ ㉨
 한편, 다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 하면
 $f(x)=(x-1)Q(x)+6$ ㉩
 ㉨, ㉩에서
 $(x-3)(2x-a)(x+1)=(x-1)Q(x)$
 이때 $(x-3)(2x-a)(x+1)$ 은 $x-1$ 을 인수로 가져야 한다.
 따라서 $2x-a=2(x-1)$ 에서
 $a=2$

14. [출제의도] 삼차방정식의 허근과 관련된 문제를 해결한다.

조건 (가)에서 다항식 $x^3-3x^2+9x+13$ 을 조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -3 & 9 & 13 \\ & & -1 & 4 & -13 \\ \hline & 1 & -4 & 13 & 0 \end{array}$$

$x^3-3x^2+9x+13=(x+1)(x^2-4x+13)$
 이차방정식 $x^2-4x+13=0$ 에서
 $x=2+3i$ 또는 $x=2-3i$
 따라서 방정식 $x^3-3x^2+9x+13=0$ 의 세 근은
 $x=-1$ 또는 $x=2+3i$ 또는 $x=2-3i$
 조건 (나)에서
 $\frac{z-\bar{z}}{i} = \frac{(a+bi)-(a-bi)}{i} = \frac{2bi}{i} = 2b$
 $\frac{z-\bar{z}}{i}$ 가 음의 실수이므로 b 는 음수이다.

따라서 $z=2-3i$
 $a=2$, $b=-3$
 $a+b=-1$

15. [출제의도] ‘모든’이 포함된 명제와 관련된 문제를 해결한다.


명제

‘모든 실수 x 에 대하여 $2x^2+6x+a \geq 0$ 이다.’

가 거짓이면 이 명제의 부정

‘어떤 실수 x 에 대하여 $2x^2+6x+a < 0$ 이다.’
 는 참이다.

따라서 이차함수 $y=2x^2+6x+a$ 의 그래프와 x 축이 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.



이차방정식 $2x^2+6x+a=0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4}=3^2-2a>0$ 에서 $a<\frac{9}{2}$
 따라서 정수 a 의 최댓값은 4이다.

16. [출제의도] 점의 이동 및 두 직선의 위치 관계와 관련된 문제를 해결한다.

점 P는 점 A(-3, 1)을 y 축에 대하여 대칭이동한 점
 이므로 그 좌표는 (3, 1)이다.

또, 점 Q는 점 B(1, k)를 y 축의 방향으로 -5만큼
 평행이동한 점이므로 그 좌표는 (1, k-5)이다.

두 점 B(1, k), P(3, 1)에 대하여 직선 BP의 기울기는
 $\frac{1-k}{3-1}=-\frac{k-1}{2}$

두 점 P(3, 1), Q(1, k-5)에 대하여 직선 PQ의 기울
 기는

$$\frac{(k-5)-1}{1-3}=-\frac{k-6}{2}$$

직선 BP와 직선 PQ가 서로 수직이므로

$$\left(-\frac{k-1}{2}\right) \times \left(-\frac{k-6}{2}\right) = -1$$

$$(k-1)(k-6) = -4$$

$$k^2 - 7k + 10 = 0$$

$$(k-2)(k-5) = 0$$

$$k=2 \text{ 또는 } k=5$$

따라서 모든 실수 k 의 값의 곱은

$$2 \times 5 = 10$$

17. [출제의도] 원과 직선의 위치 관계와 관련된 문제를 해결한다.

조건 (가)에서 원 $C: x^2+y^2-4x-2ay+a^2-9=0$ 이
 원점을 지나므로 $x=0$, $y=0$ 을 대입하면

$$a^2-9=0, a^2=9$$


$$a=-3 \text{ 또는 } a=3$$

$a=-3$ 일 때, 원 C 의 방정식은

$$x^2+y^2-4x+6y=0, (x-2)^2+(y+3)^2=13$$

$a=3$ 일 때, 원 C 의 방정식은

$$x^2+y^2-4x-6y=0, (x-2)^2+(y-3)^2=13$$



이때 $a=3$ 이면 원 C 는 직선 $y=-2$ 와 만나지 않으
 므로 조건 (나)에 의하여 $a=-3$ 이다.

$$(x-2)^2+(y+3)^2=13, y=-2 \text{를 연립하면}$$

$$(x-2)^2+(-2+3)^2=13$$

$$(x-2)^2=12$$

$$x=2 \pm 2\sqrt{3}$$

따라서 원 C 와 직선 $y=-2$ 가 만나는 두 점의 좌표
 는 각각 $(2-2\sqrt{3}, -2)$, $(2+2\sqrt{3}, -2)$ 이므로 두 점
 사이의 거리는

$$(2+2\sqrt{3})-(2-2\sqrt{3})=4\sqrt{3}$$


[다른 풀이]

$a=-3$ 일 때, 원 C 의 방정식은

$$x^2+y^2-4x+6y=0$$

$$(x-2)^2+(y+3)^2=13$$

따라서 원 C 의 중심은 A(2, -3)이고, 반지름의 길
 이는 $\sqrt{13}$ 이다.



원의 중심 A(2, -3)에서 직선 $y=-2$ 에 내린 수선의
 발을 H라 하고, 원 C 와 직선 $y=-2$ 가 만나는 두
 점을 각각 P, Q라 하면

$$\overline{AP}=\sqrt{13}, \overline{AH}=1$$

이므로

$$\overline{PH}=\sqrt{(\sqrt{13})^2-1^2}=2\sqrt{3}$$

따라서

$$\overline{PQ}=2\overline{PH}=4\sqrt{3}$$

18. [출제의도] 삼각형의 무게중심과 관련된 문제를 해결한다.

두 점 A, B의 좌표를 각각

$$(a_1, b_1), (a_2, b_2)$$

라 하면 삼각형 OAB의 무게중심의 좌표가 (5, 4)이
 므로

$$\frac{0+a_1+a_2}{3}=5, \frac{0+b_1+b_2}{3}=4$$

$$a_1+a_2=15, b_1+b_2=12 \dots\dots \textcircled{1}$$

선분 OA를 2:1로 외분하는 점 C의 좌표는

$$\left(\frac{2a_1-0}{2-1}, \frac{2b_1-0}{2-1}\right), \text{ 즉 } (2a_1, 2b_1)$$

마찬가지로 선분 OB를 2:1로 외분하는 점 D의 좌표
 는

$$(2a_2, 2b_2)$$

이때 두 선분 AD, BC는 모두 삼각형 OCD의 중선이
 므로 교점 E는 삼각형 OCD의 무게중심이다.

따라서 점 E의 좌표는

$$\left(\frac{0+2a_1+2a_2}{3}, \frac{0+2b_1+2b_2}{3}\right)$$

①에 의하여

$$\frac{2a_1+2a_2}{3}=\frac{2(a_1+a_2)}{3}=\frac{2 \times 15}{3}=10,$$


$$\frac{2b_1+2b_2}{3}=\frac{2(b_1+b_2)}{3}=\frac{2 \times 12}{3}=8$$

이므로 점 E의 좌표는 (10, 8)이다.

따라서 $p=10$, $q=8$ 이므로

$$p+q=18$$

[다른 풀이]



점 E는 삼각형 OCD의 무게중심이므로 점 E는 선분
 DA를 2:1로 내분하는 점이다.

선분 OA의 중점을 F라 하고, 삼각형 OAB의 무게중
 심을 G라 하면 점 G는 선분 BF를 2:1로 내분하는
 점이므로 세 점 O, G, E는 한 직선 위에 있다.

이때 $\overline{OF}:\overline{OA}=1:2$ 이므로 두 삼각형 OFG, OAE는 닮
 음비가 1:2인 닮은 도형이다.

즉 $\overline{OG}:\overline{OE}=1:2$ 이고 점 G의 좌표가 (5, 4)이므로

$$p=2 \times 5=10, q=2 \times 4=8$$

$$\text{따라서 } p+q=18$$

19. [출제의도] 조합의 수를 이해하여 집합의 개수를 구하는 과정을 추론한다.

$$A=\{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$$

$$=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$B=\{x \mid x \text{는 } 6 \text{ 이상 } 15 \text{ 이하의 자연수}\}$$

$$=\{6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$$

에서

$$A-B=\{1, 2, 3, 4, 5\}, A \cap B=\{6, 7, 8, 9, 10\}$$

이므로

$$n(A-B)=5, n(A \cap B)=5$$

$$X_1=X \cap (A-B), X_2=X \cap (A \cap B) \text{라 하면}$$

$$X=X_1 \cup X_2 \text{이고 } X_1 \cap X_2=\emptyset \text{이다.}$$

$$(i) n(X \cup B)=12 \text{이고 } n(B)=10 \text{이므로}$$

$$n(X_1)=\boxed{2}$$

집합 X_1 은 집합 $A-B$ 의 부분집합 중 원소의
 개수가 2인 부분집합이므로 가능한 집합 X_1 의
 개수는 ${}_5C_2=\boxed{10}$ 이다.

(ii) 집합 X_2 는 집합 $A \cap B$ 의 부분집합이므로 가능
 한 집합 X_2 의 개수는 $2^5=\boxed{32}$ 이다.

(i), (ii)에 의하여 집합 X 의 개수는 집합 X_1 을 정
 하는 경우의 수와 집합 X_2 를 정하는 경우의 수의 곱
 과 같으므로

$${}_5C_2 \times 2^5=\boxed{10} \times \boxed{32}=320$$


따라서 $p=2$, $q=10$, $r=32$ 이므로

$$p+q+r=44$$

20. [출제의도] 유리함수의 그래프와 관련된 문제를 해결한다.

(i) $k>0$ 일 때,


두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 를 좌표평면에 나타내
 면 다음과 같다.



두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 교점 중 x 좌표가 양수인 점의 개수는 2이다.

(ii) $k=0$ 일 때,


두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 를 좌표평면에 나타내면 다음과 같다.



두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 교점 중 x 좌표가 양수인 점의 개수는 1이다.

(iii) $k<0$ 일 때,

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 를 좌표평면에 나타내면 다음과 같다.



두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 교점 중 x 좌표가 양수인 점의 개수는 1이다.

(i), (ii), (iii)에 의하여

$$h(k) = \begin{cases} 1 & (k \leq 0) \\ 2 & (k > 0) \end{cases}$$

연속하는 세 정수 k , $k+1$, $k+2$ 에 대하여 등식

$$h(k)+h(k+1)+h(k+2)=4 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

가 성립하려면

$$h(k)=1, \quad h(k+1)=1, \quad h(k+2)=2$$


이어야 한다.

이때 $h(-1)=1$, $h(0)=1$, $h(1)=2$ 이므로 등식 $\textcircled{7}$ 을 만족시키는 정수 k 의 값은 -1 이다.


21. [출제의도] 일대일대응을 이해하여 명제의 참, 거짓을 추론한다.

ㄱ. 함수 $g(x)$ 의 정의역과 치역이 모두 실수 전체의 집합이고 함수 $g(x)$ 의 역함수가 존재하므로 함수 $g(x)$ 는 일대일대응이다. 따라서 함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같이 두 가지이다.

(i) $g(-2)=f(-2)=6$, $g(1)=f(1)=-3$ 일 때,



(ii) $g(-2)=f(-2)=-3$, $g(1)=f(1)=6$ 일 때,



(i), (ii)에서

$$f(-2)+f(1)=3 \quad (\text{참})$$

ㄴ. $g(0)=f(0)=-1$ 에서

$f(x)=ax^2+bx-1$ (a 는 양의 상수, b 는 상수)로 놓을 수 있다.

$g(1)=f(1)=-3$ 이면 $f(-2)=6$ 이어야 하므로 $a+b-1=-3$, $4a-2b-1=6$


$$\text{연립방정식 } \begin{cases} a+b=-2 \\ 4a-2b=7 \end{cases} \text{을 풀면}$$

$$a=\frac{1}{2}, \quad b=-\frac{5}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x - 1 \\ &= \frac{1}{2}\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{33}{8} \end{aligned}$$

이므로 곡선 $y=f(x)$ 의 꼭짓점의 x 좌표는 $\frac{5}{2}$ 이다. (참)



ㄷ. 곡선 $y=f(x)$ 의 꼭짓점의 x 좌표가 -2 이므로 $f(x)=a(x+2)^2+p$ (a 는 양의 상수, p 는 상수)라 할 수 있다.

이때 함수 $g(x)$ 가 일대일대응이므로

$$f(-2)=-3, \quad f(1)=6$$

이다.


$$p=-3, \quad 9a+p=6$$

에서 $a=1$ 이므로

$$f(x)=(x+2)^2-3$$

따라서 $g(0)=f(0)=1$ 이므로

$$g^{-1}(1)=0 \quad (\text{참})$$



그러므로 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

22. [출제의도] 순열의 수를 계산한다.

$${}_4P_2=4 \times 3=12$$

23. [출제의도] 두 점 사이의 거리를 계산한다.

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \sqrt{(4+1)^2 + (1-3)^2} \\ &= \sqrt{29} \end{aligned}$$


선분 \overline{AB} 를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이는

$$\overline{AB}^2=29$$

24. [출제의도] 무리함수의 그래프를 이해한다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{2x+a}+7 \\ &= \sqrt{2\left(x+\frac{a}{2}\right)}+7 \end{aligned}$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



함수 $f(x)$ 는 $x=-\frac{a}{2}$ 일 때 최솟값 7을 가진다.

$-\frac{a}{2}=-2$ 에서 $a=4$ 이고 $m=7$ 이므로

$$a+m=11$$

25. [출제의도] 다항식의 나눗셈을 이해한다.

다항식 $2x^3-x^2+x+3$ 을 $x+1$ 로 나눈 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ & & -2 & 3 & -4 \\ \hline & 2 & -3 & 4 & -1 \end{array}$$

따라서 $Q(x)=2x^2-3x+4$ 이므로

$$Q(-1)=2+3+4=9$$

26. [출제의도] 집합의 연산 법칙을 이해한다.

$$\begin{aligned} A &= \{x \mid x \text{는 } 4 \text{의 배수}\} \\ &= \{4, 8, 12, 16, 20\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \{x \mid x \text{는 } 20 \text{의 약수}\} \\ &= \{1, 2, 4, 5, 10, 20\} \end{aligned}$$

드모르간의 법칙에 의하여

$$\begin{aligned} (A^C \cup B)^C &= (A^C)^C \cap B^C \\ &= A \cap B^C \\ &= A - B \end{aligned}$$

$A-B=\{8, 12, 16\}$ 이므로 집합 $A-B$ 의 모든 원소의 합은 $8+12+16=36$ 이다.

27. [출제의도] 필요조건과 충분조건을 이해한다.

두 조건 p , q 의 진리집합을 각각 P , Q 라 하자.

$2x-a \leq 0$ 에서 $x \leq \frac{a}{2}$ 이므로

$$P = \left\{x \mid x \leq \frac{a}{2}\right\}$$

조건 $q: x^2-5x+4 > 0$ 에 대하여

$$\sim q: x^2-5x+4 \leq 0$$

$x^2-5x+4 \leq 0$ 에서


$$(x-1)(x-4) \leq 0$$

$$1 \leq x \leq 4$$

이므로

$$Q^C = \{x \mid 1 \leq x \leq 4\}$$

p 가 $\sim q$ 이기 위한 필요조건이면 명제 $\sim q \rightarrow p$ 가 참이므로 $Q^C \subset P$ 가 성립해야 한다.



위 그림에서 $\frac{a}{2} \geq 4$, $a \geq 8$

따라서 실수 a 의 최솟값은 8이다.

28. [출제의도] 경우의 수를 구하는 실생활과 관련된 문제를 해결한다.

조건 (가)에서 A와 B가 같이 앉을 수 있는 2인용 의자는 마부가 앉아 있는 의자를 제외한 3개이고, 두 사람은 자리를 서로 바꿔 앉을 수 있으므로 A와 B가 앉는 경우의 수는

$$3 \times 2! = 6$$

남은 5개의 좌석에 C와 D가 앉는 전체 경우의 수는 ${}_5P_2 = 20$

이때 C와 D가 같은 2인용 의자에 이웃하여 앉는 경우의 수를 구해 보자.

두 사람이 이웃하여 앉을 수 있는 의자는 A와 B가 앉아 있는 의자와 마부가 앉아 있는 의자를 제외한 나머지 2개이고, 두 사람은 서로 자리를 바꿔 앉을 수 있으므로 C와 D가 앉는 경우의 수는

$$2 \times 2! = 4$$

따라서 조건 (나)에서 C와 D가 이웃하지 않도록 앉는 경우의 수는

$$20 - 4 = 16$$


남은 3개의 좌석에 E, F, G가 앉는 경우의 수는 $3! = 6$

따라서 모든 경우의 수는

$$6 \times 16 \times 6 = 576$$

29. [출제의도] 원과 직선의 위치 관계와 관련된 문제를 해결한다.

두 원 C_1 , C_2 의 중심을 각각 A, B라 하면 두 점 A, B의 좌표는 각각 $(-7, 2)$, $(0, b)$ 이다.



그림과 같이 두 점 A, B에서 직선 l_1 에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하면

$$\overline{AH} = 2\sqrt{5}, \overline{BI} = \sqrt{5}$$

이므로 두 삼각형 PAH, PBI는 닮음비

$$\overline{AH} : \overline{BI} = 2 : 1$$

인 닮은 도형이다.

이때 점 B는 선분 AP의 중점이므로

$$\frac{(-7)+a}{2} = 0, \frac{2+b}{2} = b$$

$$a = 7, b = 1 \dots\dots \textcircled{㉠}$$

점 P(7, 0)을 지나고 점 B(0, 1)에서의 거리가 $\sqrt{5}$ 인 직선을

$$y = m(x - 7), \text{ 즉 } mx - y - 7m = 0 \text{ (} m \text{은 상수)}$$

로 놓으면

$$\frac{|m \times 0 - 1 - 7m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{5}$$

$$|-7m - 1| = \sqrt{5(m^2 + 1)} \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉡의 양변을 제곱하면

$$49m^2 + 14m + 1 = 5m^2 + 5$$

$$44m^2 + 14m - 4 = 0, 22m^2 + 7m - 2 = 0$$

$$(2m + 1)(11m - 2) = 0$$

$$m = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } m = \frac{2}{11}$$

따라서 두 직선 l_1 , l_2 의 기울기의 곱은

$$\left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{2}{11} = -\frac{1}{11}$$

$$\text{이므로 } c = -\frac{1}{11} \dots\dots \textcircled{㉢}$$

㉠, ㉢에서

$$11(a + b + c) = 11\left(7 + 1 - \frac{1}{11}\right) = 87$$

30. [출제의도] 이차함수의 그래프 및 ‘어떤’이 포함된 명제와 관련된 문제를 해결한다.

$$f(x) = x^2 - 2x + 6 \\ = (x - 1)^2 + 5$$

이므로 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭이다.


한편,

$$-|x - t| + 11 = \begin{cases} x - t + 11 & (x < t) \\ -x + t + 11 & (x \geq t) \end{cases}$$

이므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $x = t$ 에 대하여 대칭이다.


따라서 함수 $y = h(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같이 세 가지로 나타난다.

(i) 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 만나지 않거나 한 점에서만 만날 때,



함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값은 존재하지 않는다.


(ii) 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 두 교점의 x 좌표가 α , β ($\alpha < \beta \leq 1$ 또는 $1 \leq \alpha < \beta$)일 때,



함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값은 존재하지 않는다.

(iii) 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 두 교점의 x 좌표가 α , β ($\alpha < 1 < \beta$)일 때,

① $f(\alpha) = f(\beta)$, 즉 $t = 1$ 일 때,



두 교점은 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭이다.

이때 β 의 값을 구하면

$$x^2 - 2x + 6 = -x + 12$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x + 2)(x - 3) = 0$$


$$x = -2 \text{ 또는 } x = 3$$

$$\beta > 1 \text{ 이므로 } \beta = 3$$

$$g(3) = -|3 - 1| + 11 = 9$$


따라서 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값은 5뿐이다.

② $f(\alpha) > f(\beta)$ 일 때,



함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값은 5와 $f(\beta)$ ($5 < f(\beta) < 9$)이다.

③ $f(\alpha) < f(\beta)$ 일 때,



함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값은 5와 $f(\alpha)$ ($5 < f(\alpha) < 9$)이다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 명제

‘어떤 실수 t 에 대하여 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 는 서로 다른 세 점에서 만난다.’

가 참이 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는

$$5 \leq k < 9$$

따라서 자연수 k 의 값은 5, 6, 7, 8이므로 그 합은

$$5 + 6 + 7 + 8 = 26$$