

4. OLIVIER

4.1. Lutte contre la pyrale, Euzophera pinguis

4.1.1. Introduction

La pyrale de l'olivier fore des galeries autour des branches de l'olivier dont elle cause ainsi l'affaiblissement et la mort.

Ce microlépidoptère est présent dans tout le nord-ouest de la Tunisie. Son cycle biologique ainsi que les moyens de lutte ont fait l'objet de plusieurs observations sur le terrain.

4.1.2. Répartition

Une certaine évolution des populations a pu être constatée pendant ces dernières années. Au cours des années agricoles 1982 à 1985, les régions de Béja et du Kef furent fortement attaquées. Au cours des dernières années, l'attaque a sensiblement diminué dans la région de Béja.

Dans le sud du pays (Zarzis), une concentration importante de pyrale a pu être détectée plus récemment.

4.1.3. Systématique


La pyrale appartient à la famille des microlépidoptères, Pyralidae. Deux sous-espèces ont été décrites : Euzophera pinguis pinguis Haw 1811, et Euzophera pinguis concolorella Ragonot 1892. Seule cette seconde sous-espèce a été observée en Tunisie.

4.1.4. Symptômes de l'attaque

Les larves causent des dégâts aux arbres en creusant des galeries autour des branches. La circulation de la sève est stoppée. Les galeries se trouvent autour de la base des branches âgées de plus de deux ans et à la base du tronc (voir Fig. 17).

Il est très difficile d'observer les galeries car seuls les excréments des larves et la sciure de bois sont visibles, formant un dépôt de granulés à l'orifice de celles-ci.

Fig. 17. - Galeries de la pyrale situées autour de la base des branches



La visibilité directe des dégâts causés par la pyrale dépend directement de l'âge et de la vigueur de l'arbre. Un arbre âgé de 30 ans, fortement infesté (15 chenilles) ne montre presque pas de dégâts: seules quelques feuilles et petites branches sont sèches; tandis qu'un arbre âgé d'une dizaine d'années et fortement infesté (6 chenilles) montre des dégâts très importants: des branches entières sont desséchées, les feuilles tombent et la récolte est réduite.

L'identification de l'insecte se fait en grattant les arbres pour trouver les larves, les nymphes ou les cocons vides.

Selon Balachowsky (1972), une seule larve peut creuser une galerie tout autour de la branche. Ceci a été confirmé par nos observations.

E. pinguis est un parasite primaire, car il attaque les arbres sains et vigoureux.

4.1.5. Morphologie

4.1.5.1. Les oeufs

Les oeufs sont blanc rose. La forme en est ovale et aplatie avec un diamètre de 0,8 à 1 mm. Ils sont rassemblés en paquets de 5 à 6 oeufs.

4.1.5.2. La larve

On peut comparer la larve de la pyrale à celle du Carpocapse des arbres à pépins. La couleur en est blanc verdâtre. Elle peut atteindre 20 à 25 mm. L'appareil buccal est chitinisé et très robuste (couleur brune).


4.1.5.3. La nymphe

La nymphe se trouve dans un cocon tissé de couleur grise. Au début, la nymphe est brun clair et plus tard, brun foncé.

4.1.5.4. L'adulte

Le papillon est de couleur brun grisâtre, mesure 20 à 25 mm de long et est caractérisé par deux bandes sur l'aile antérieure, l'aile postérieure en est dépourvue.

Fig. 18. - Adulte de la pyrale de l'olivier
Euzophera pinguis



4.1.6. Biologie

Le parasite passe l'hiver à l'état de chenille. Il n'y a pas de diapause. La larve se nourrit pendant l'hiver et cause de nombreux dégâts. Ce xylophage creuse des galeries dont la longueur peut atteindre 10 cm.

La larve se nymphose à l'intérieur de la galerie, dans un cocon blanc grisâtre.

L'adulte quitte le cocon par le même orifice d'entrée. Deux jours plus tard, l'adulte commence à pondre les oeufs séparément ou en groupes de 5 à 6, dans les fissures de l'écorce et à l'aisselle des branches. Une femelle pond environ 20 oeufs. Une semaine après la ponte, les adultes meurent. Les oeufs éclosent et les petites chenilles vagabondent tout en cherchant l'endroit idéal pour pénétrer dans le bois.

4.1.7. Cycle évolutif

Dans le nord de la Tunisie, la pyrale de l'olivier a deux générations par an. La première se situe au printemps (avril-juin) et la seconde au mois de septembre (voir Fig. 19).

La nymphose des larves hivernantes commence début mars, se termine vers le début du mois de mai et dure environ un mois.

La sortie des adultes commence en avril et est très échelonnée. La ponte débute 48 heures après la sortie de l'adulte et s'étend sur plusieurs jours. Le stade embryonnaire dure 12 à 14 jours et se passe principalement au mois de mai. Les premières larves éclosent déjà fin avril - début mai. La chenille se nourrit tout l'été et se nymphose vers la fin du mois de juillet jusqu'au mois de septembre. Les deux générations se chevauchent pendant cette période.

Dans les galeries, tous les stades sont présents : larves, nymphes de la première génération, oeufs et jeunes larves de la seconde génération, qui hivernent à l'état de chenilles, qui donneront ensuite les adultes de la première génération (voir Fig. 19).