

Alternariose de la tomate

Alternaria solani Igifaranga en Kirundi

	Prévention	Surveillance	Lutte directe	Lutte directe	Restrictions
 Zones arrondies, brunes, concentrique et entourées d'un halo jaunâtre (Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org - CC BY 3.0 US)  L'alternariose cause des taches arrondies, brunes, zonées concentriquement sur les fruits (Michal Mañas/via Wikimedia Commons – CC BY 4.0)	• Semer en lignes séparées de 20cm dans le germinoir pour faciliter les travaux d'entretien • Effectuer la taille des plants pour aérer la culture • Utilisation des variétés tolérantes Tengeru 97 et Tanya • Utilisation des semences saines; éviter de produire des semences dans son champ de tomate • Rotation avec des cultures qui ne sont pas de la même famille (haricot, choux, riz patate douce, etc.) • Pour réduire l'inoculum, éviter d'irriguer avec de l'eau passant dans un autre champ de tomate, de pomme de terre, etc. • Respecter les écartements de 60cmx50 cm	• L'alternariose est une maladie fongique • Passer dans le champ une fois tous les deux jours jusqu'à la récolte • Observer des taches brunes allongées, parfois zonées concentrique sur les feuilles, les fruits • On agit quand il y a présence de deux à cinq plantes infectées par petit champ	• Utiliser du lait frais à la dose 1 litre dans 10 litres d'eau (INADES Formation) • Arracher les plants sévèrement atteints et les enfouir • Appliquer un mélange d'extrait de feuilles fraîches de papayer (1kg) dans 10 litres d'eau. Après 15 jours de fermentation, filtrer et utiliser directement sans diluer. • En préventif : Appliquer tous les 15 jours à 1 litre d'eau pour 10 m² • En curatif : Appliquer dès l'apparition des symptômes, appliquer toutes les semaines à 2 litres pour 10 m²	• Les fongicides disponibles sur le marché peuvent protéger contre une nouvelle infection, mais ne peuvent pas guérir une plante. Si des taches sur les feuilles sont observées, les fongicides disponibles n'ont aucun effet sur cette plante. • Lorsque vous utilisez un pesticide ou un botanique, portez toujours des vêtements de protection et suivez les instructions figurant sur l'étiquette du produit, comme le dosage, le moment de l'application, le délai d'emploi avant récolte, le nombre maximal de pulvérisations, le délai de rentrée restreint. Ne pas verser dans les égouts et les sources d'eau. • Toujours consulter la liste récente des pesticides enregistrés par MINEAGRIAE de Burundi • Chlorothalonil (par exemple BANKO 720 sc, 720g/l sc) • Azoxystrobine (par exemple BANKIT 25 sc)	• OMS : U ou IV (peu susceptible d'être toxique). Délai avant récolte (DAR): 7 jours. Délai de ré-entrée (DRE) : 24h. Toxiques sur les organismes du sol (vers de terre), acariens prédateurs, abeilles et autres pollinisateurs. • OMS : U ou IV (peu toxique).DAR: 7 jours. DRE: 24h. Toxiques sur les organismes aquatiques, les organismes du sol (vers de terre), acariens prédateurs, parasitoïdes, pollinisateurs

Burundi

CRÉÉ/ACTUALISÉ: Mars 2022

AUTEUR(S): MBONIHANKUYE Cyrille (ISABU) et NIYIBIKORA Idrissa (BEPEAE)

ÉDITÉ PAR: Plantwise