PARMAR SSC

PARMAR RAILWAY

PARMAR RAILWAY

RRB NTPC 2026-27

GK PYQ SERIES

GEOGRAPHY | INDIAN POLITY | ECONOMICS | SCIENCE | HISTORY | STATIC GK | CURRENT AFFAIRS

GEOGRAPHY

LECTURE 10

THIS WILL CHANGE THE GAME

COMPLETE HINDI NOTES
संपूर्ण हिंदी नोट्स

GEOGRAPHY
INDIAN POLITY
ECONOMICS
SCIENCE
HISTORY
STATIC GK
CURRENT AFFAIRS

PARMAR RAILWAY

Parmar Sir

EXPERIENCE | STRATEGY | SELECTION ORIENTED

PARMAR ACADEMY APP
DOWNLOAD THE APP

PARMAR RAILWAY
STUDY VIDEOS

PARMAR SSC
PDF & NOTIFICATIONS

7068824945
FOR ANY QUERY

Q01. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत की रेशेदार फसल (Fibre Crop) का एक उदाहरण है?

(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 20 जून 2026 | दोपहर 12:45 - 2:15)

(A) खीरा
(B) शलजम
(C) मूली
(D) जूट

- जूट को 'स्वर्ण रेशा' के नाम से भी जाना जाता है।
- **उत्पादन में शीर्ष:** विश्व में भारत शीर्ष पर है, जबकि निर्यात में बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है।
- भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है।
- **जूट के लिए सहायक पूर्व-मानसूनी वर्षा:** इसे 'नॉरवेस्टर' कहते हैं। इसे पश्चिम बंगाल में 'काल बैसाखी' तथा असम में 'बारदोलाई छीड़ा' कहा जाता है।

- **रेशेदार फसलें:** कपास (Cotton), अलसी (Flax/Linen), भांग (Hemp), जूट (Jute) → रेशेदार फसलें हैं।



Q02. संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की कृषि पद्धति अपनाई जाती है?

(NTPC UG CBT-01 | 2025-26 | शाम 4:30 - 6:00)

(A) गहन निर्वाह कृषि
(B) स्थानांतरी कृषि
(C) रोपण कृषि
(D) वाणिज्यिक अनाज कृषि



कृषि प्रणालियों का वर्गीकरण एवं विशेषताएँ:

- **गहन निर्वाह कृषि (Intensive Subsistence Farming):** यह कम भूमि और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें अत्यधिक उर्वरक और श्रम का उपयोग कर स्व-उपभोग हेतु उच्च उत्पादकता प्राप्त की जाती है।
- **विस्तृत कृषि (Extensive Farming):** यह बड़े भूभाग और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ मशीनों का अधिक प्रयोग होता है (जैसे अमेरिका/कनाडा में वाणिज्यिक अनाज कृषि)।
- **आदिम कृषि कृषि (Primitive Farming):** जनजातियों द्वारा पुराने उपकरणों (कुदाल, दरांती) से की जाने वाली खेती। इसके अंतर्गत स्थानांतरी कृषि (Shifting cultivation) और चलवासी पशुचारण (Nomadic herding) आते हैं।
- **रोपण कृषि (Plantation Agriculture):** लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े भूभाग पर केवल एक ही फसल (जैसे– चाय, रबर, कॉफी) उगाना।
- **मिश्रित कृषि बनाम मिश्रित फसल:** मिश्रित कृषि का अर्थ है कृषि के साथ-साथ पशुपालन करना। जबकि, मिश्रित फसल का अर्थ एक ही भूमि पर बीजों को मिलाकर एक साथ कई फसलें उगाना है।
- **अंतर-फसलीकरण (Intercropping):** एक निश्चित स्वरूप (Rows/Columns) में अलग-अलग फसलें एकांतर क्रम में लगाना।

Q03. बंजर भूमि (Wasteland) से क्या तात्पर्य है?

(NTPC UG CBT-01 | 16 जून 2026 | सुबह 9:00 - 10:30)

(A) वनों से आच्छादित भूमि
(B) प्राकृतिक या मानवीय कारणों से कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि
(C) शहरी हरित क्षेत्र
(D) नदी घाटी की उपजाऊ भूमि

बंजर भूमि वह क्षेत्र है जिसे वर्तमान प्राकृतिक परिस्थितियों या मानवीय गतिविधियों (जैसे अत्यधिक दोहन या अपरदन) के कारण कृषि कार्यों के उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।

Q04. भारत का कौन-सा क्षेत्र कर्तन-दहन कृषि (झूम कृषि) के लिए सबसे प्रसिद्ध है?

(NTPC UG CBT-01 | 15 जून 2026 | दोपहर 12:45 - 2:15)

(A) उत्तर-पूर्वी पहाड़ियाँ
(B) दक्कन के पठार
(C) पश्चिमी घाट
(D) सिंधु-गंगा के मैदान

स्थानांतरी कृषि (Shifting Cultivation) के विभिन्न नाम:

- यह एक प्रकार की प्राचीन निर्वाह कृषि है, जिसमें जनजातियों द्वारा पेड़ों को काटकर और जलाकर (Slash and Burn) मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। उर्वरता समाप्त होने पर स्थान बदल दिया जाता है, जिससे निर्वनीकरण (Deforestation) होता है।

भारत में स्थानीय नाम:

- **उत्तर-पूर्वी भारत:** झूम (Jhum)
- **झारखंड:** कुरुवा (Kuruwa)
- **छत्तीसगढ़ (बस्तर) एवं अंडमान-निकोबार:** दीपा (Dipa)
- **मध्य प्रदेश:** दहिया (Dahiya) या बेवर (Bewar)
- **ओडिशा:** पामा डाबी (Pama Dabi) या भिंगा/कोमन
- **पश्चिमी घाट:** कुमारी (Kumari)
- **राजस्थान:** वालरा (Valre/Walra)
- **आंध्र प्रदेश:** पोडू (Podu) या पेडा (Peda)

विश्व में स्थानीय नाम:

- **श्रीलंका:** चेना (Chena)
- **मैक्सिको:** मिल्पा (Milpa)
- **इंडोनेशिया:** लदांग (Ladang)
- **ब्राज़ील:** रोका (Roka)
- **वेनेज़ुएला:** कोनूको (Conuco)

Q005. भारत में नहर सिंचाई का सर्वाधिक व्यापक विस्तार किन क्षेत्रों में हुआ?

(NTPC UG CBT-01 | 14 जून 2026 | सुबह 9:00 - 10:30)

(A) तटीय बलुई मृदा वाले क्षेत्रों

(B) पथरीले भूभाग वाले मरुस्थलीय क्षेत्रों

(C) बारहमासी नदियों वाले जलोढ़ मैदानों

(D) अत्यधिक वर्षा और तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों

नदियों की प्रकृति एवं सिंचाई का संबंध:

- नहरों के निर्माण के लिए समतल भूमि (जलोढ़ मैदान) और वर्ष भर जल उपलब्ध कराने वाली नदियों की आवश्यकता होती है।
- **बारहमासी नदियाँ (Perennial Rivers):** इनमें वर्ष भर जल रहता है क्योंकि इनका मुख्य स्रोत ग्लेशियर (हिमनद) होते हैं (जैसे– हिमालयी नदियाँ)।
- **पूर्ववर्ती नदियाँ (Antecedent Rivers):** अधिकांश हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती प्रकृति की हैं, अर्थात् ये हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हैं और पहाड़ों को काटकर अपना मार्ग बनाती हैं।
- **मौसमी नदियाँ (Ephemeral/Seasonal Rivers):** प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहने के कारण मौसमी होती हैं।

Q006. निम्नलिखित में से कौन-सी उत्तरी राज्य की फसल, रबी फसलों का एक उदाहरण है?

(NTPC UG CBT-01 | 14 जून 2026 | सुबह 9:00 - 10:30)

(A) कपास

(B) चावल

(C) बाजरा

(D) गेहूँ

भारतीय फसल ऋतुओं का वर्गीकरण:

खरीफ फसलें (मानसूनी फसलें):

- **बुवाई:** जून-जुलाई, **कटाई:** सितंबर-अक्टूबर।
- **उदाहरण:** धान (चावल), मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, कपास। (ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाजों को 'श्री अन्न' भी कहा जाता है)।

रबी फसलें (शीतकालीन फसलें):

- **बुवाई:** अक्टूबर-नवंबर, **कटाई:** मार्च-अप्रैल (होली के समय)।
- **उदाहरण:** गेहूँ, चना, सरसों, अलसी (Linseed), रेपसीड, मटर।

ज़ायद फसलें (ग्रीष्मकालीन / अल्पकालिक फसलें):

- **बुवाई:** मार्च-अप्रैल, **कटाई:** जून-जुलाई। रबी और खरीफ के बीच के खाली समय में उगाई जाती हैं।
- **उदाहरण:** खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, चारा फसलें (Fodder crops), मूंग, उड़द।

Q07. भारत के किस राज्य में धान की तीन फसलें उगाई जाती हैं – जिन्हें 'औस', 'अमन' और 'बोरो' कहा जाता है?

(NTPC UG CBT-01 | 08 मई 2026 | शाम 4:30 - 6:00)

(A) पश्चिम बंगाल
(B) बिहार
(C) मणिपुर
(D) नागालैंड

- भारत के पूर्वी भाग (विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा) में धान की तीन फसलें उगाई जाती हैं।
  - **औस (Aus):** इसे शरद ऋतु (Autumn) की फसल मान सकते हैं।
  - **अमन (Aman):** इसे शीतकालीन फसल माना जाता है। इसकी कटाई नवंबर से दिसंबर के आसपास होती है।
  - **बोरो (Boro):** यह ग्रीष्मकालीन (Summer) धान की फसल है।

Q08. भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में असमान भूभाग और कम वर्षा के कारण टैंक सिंचाई मुख्य रूप से की जाती है?

(NTPC UG CBT-01 | 09 मई 2026 | सुबह 9:00 - 10:30)

(A) पश्चिम बंगाल
(B) हरियाणा
(C) हिमाचल प्रदेश
(D) कर्नाटक

जल संचयन एवं सिंचाई प्रणालियाँ:
- प्रायद्वीपीय पठार (जैसे कर्नाटक) के असमान भूभाग और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल संचयन के लिए टैंक सिंचाई (Tank Irrigation) सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
- **विभिन्न राज्यों की जल संचयन प्रणालियाँ:**
  - **हिमाचल प्रदेश:** गुल्स (Guls) या कुल्स (Kuls)
  - **राजस्थान:** जोहड़ (Johad) या खादिन (Khadin)

Q09. जल संरक्षण के लिए किस सिंचाई तकनीक को सबसे कुशल माना जाता है?

(NTPC UG CBT-01 | 09 मई 2026 | सुबह 9:00 - 10:30)

(A) आप्लाव सिंचाई
(B) ड्रिप सिंचाई
(C) नहर सिंचाई
(D) स्प्रिंकलर सिंचाई

- **टपक सिंचाई (Drip Irrigation):** यह जल संरक्षण की सबसे कुशल तकनीक है क्योंकि इसमें जल सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी न्यूनतम होती है।
- **स्प्रिंकलर सिंचाई (Sprinkler Irrigation):** यद्यपि यह भी एक आधुनिक तकनीक है, लेकिन इसमें फव्वारे के रूप में जल छिड़का जाता है। इस कारण जल जड़ों के अलावा आस-पास भी गिरता है और वाष्पीकरण से जल की कुछ बर्बादी होती है।

Q10. व्यापक (Extensive) और गहन (Intensive) कृषि प्रणालियों के बीच मुख्य अंतर क्या है?

(NTPC Graduation CBT-01 | 18 मार्च 2026 | शिफ्ट 1)

(A) मशीनरी का प्रकार
(B) प्रति भूमि इकाई उत्पादन
(C) उपयोग की जाने वाली सिंचाई
(D) बीज का आकार

विस्तृत बनाम गहन कृषि:
- दोनों के बीच सबसे प्रमुख अंतर 'प्रति भूमि इकाई उत्पादन' और 'जोत के आकार' का है।
- **गहन कृषि:** छोटे भूखंड पर अधिक श्रम और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके अत्यधिक उत्पादकता (प्रति इकाई उच्च उत्पादन) प्राप्त की जाती है।
- **व्यापक/विस्तृत कृषि:** बड़े भूखंडों पर मशीनों की सहायता से की जाती है (जैसे रूस के क्षेत्र), जहाँ उत्पादकता प्रति इकाई भूमि कम हो सकती है लेकिन कुल क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है।

Q11. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक भारत में कृषि विविधता में योगदान नहीं करता है?

(NTPC Graduation CBT-01 | 19 मार्च 2026 | शिफ्ट 2)

(A) सिंचाई की उपलब्धता
(B) मिट्टी के प्रकार
(C) जलवायु
(D) समान भू-आकृति

कृषि विविधता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक:
- **सिंचाई की उपलब्धता:** इसके आधार पर जल-गहन या सूखा-प्रतिरोधी (Drought-resistant) फसलों का चयन किया जाता है।
- **मृदा का प्रकार:** विभिन्न मृदाओं (जैसे काली, जलोढ़) की विशेषताएँ अलग-अलग फसलों (जैसे कपास, गेहूँ) के अनुकूल होती हैं।
- **जलवायु एवं उच्चावच:** तापमान, वर्षा और भू-आकृति में भिन्नता ही अलग-अलग क्षेत्रों में विविध फसलों के उत्पादन का मुख्य कारण है; यदि भू-आकृति सर्वत्र समान होगी तो कृषि विविधता उत्पन्न नहीं होगी।

Q12. निम्नलिखित में से क्रमशः असम और कर्नाटक में कौन-सी रोपण फसलें हैं?

(NTPC Graduation CBT-01 | 19 मार्च 2026 | शिफ्ट 1)

(A) चावल और गेहूँ
(B) जौ और रागी
(C) चाय और कॉफी
(D) गन्ना और सरसों

- असम अपने चाय बागानों (Tea plantations) के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कर्नाटक मुख्य रूप से कॉफी (Coffee) उत्पादन के लिए जाना जाता है।
- **कर्नाटक में उगाई जाने वाली कॉफी की प्रमुख किस्में:** अरेबिका (Arabica), लाइबेरिका (Liberica) और रोबस्टा (Robusta) हैं।

Q13. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023-24 में भारत में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में पहले स्थान पर है?

(NTPC Graduation CBT-01 | 16 मार्च 2026 | शिफ्ट 3)

(A) तमिलनाडु
(B) कर्नाटक
(C) केरल
(D) आंध्र प्रदेश

- प्राकृतिक रबर एक महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक और रोपण फसल है।
- भारत के कुल प्राकृतिक रबर उत्पादन का लगभग 70 से 75 प्रतिशत हिस्सा अकेले केरल राज्य से प्राप्त होता है।

Q14. किस राज्य में स्थानांतरणशील (कर्तन एवं दहन प्रणाली) को स्थानीय स्तर पर 'कुरुवा' (Kuruwa) के नाम से संबोधित किया जाता है?

(NTPC Graduation CBT-01 | 16 मार्च 2026 | शिफ्ट 1)

(A) मध्य प्रदेश
(B) झारखंड
(C) राजस्थान
(D) अरुणाचल प्रदेश

Q15. मनीला भांग _____ में पायी जाती है?

(NTPC Graduation CBT-01 | 17 मार्च 2026 | शिफ्ट 3)

(A) मलेशिया
(B) इंडोनेशिया
(C) फिलीपींस
(D) जापान

- मनीला भांग (Hemp) एक प्रकार की रेशेदार फसल (Fibre crop) है।
- मनीला, फिलीपींस देश की राजधानी है, इसी के नाम पर इस रेशेदार फसल का नाम रखा गया है।

Q16. निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गीली खेती (Wet farming) पाए जाने की संभावना सबसे कम है?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 09 सितंबर 2025 | शिफ्ट 2)

(A) हरियाणा
(B) असम
(C) मणिपुर
(D) त्रिपुरा

आर्द्र कृषि (Wet Farming) की विशेषताएँ:
- यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ अत्यधिक वर्षा (लगभग 150 से 200 सेमी.) होती है।
- असम, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा के कारण आर्द्र कृषि बहुत आम है।
- हरियाणा एक कम वर्षा वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ आर्द्र कृषि की संभावना सबसे कम होती है।

Q17. निम्नलिखित में से कौन-सी फसल जलभराव (Waterlogged) की स्थिति में उगाई जाती है?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 09 सितंबर 2025 | शिफ्ट 2)

(A) मक्का
(B) बाजरा
(C) मूंगफली
(D) चावल

- धान (चावल) की खेती रोपण विधि द्वारा की जाती है, जिसके लिए खेत में पानी का पूर्णतः भरा होना आवश्यक है।
- मक्का, बाजरा, मूंगफली और चावल – ये सभी खरीफ (Kharif) यानी मानसूनी फसलें हैं।

Q18. 'निवल बोया गया क्षेत्र' (Net Sown Area) शब्द का क्या अर्थ है?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 04 सितंबर 2025 | शिफ्ट 1)

(A) वर्ष के दौरान फसलों के साथ खेती किया गया कुल क्षेत्र
(B) सिंचाई के अधीन कुल क्षेत्र
(C) वनों से ढका क्षेत्र
(D) पाँच साल से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ी गई भूमि

Q19. भारत में, 'स्थायी चरागाहों और चराई भूमि' के अंतर्गत क्षेत्र ज्यादातर किसके स्वामित्व में है?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 21 अगस्त 2025 | शिफ्ट 1)

(A) सहकारिताएँ
(B) निजी कंपनियाँ
(C) वन विभाग
(D) ग्राम पंचायतें

Q20. भारत में, कौन-सा क्षेत्र गैर-जलोढ़ क्षेत्रों के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 | 09 जून 2025 | शिफ्ट 1)

(A) पश्चिमी उत्तर प्रदेश
(B) पठारी क्षेत्र
(C) तटीय मैदान
(D) पंजाब

- नलकूप (Tube-well) लगाने के लिए गहरी खुदाई (Boring) करनी पड़ती है।
- पठारी क्षेत्र उच्च भूमि और कठोर चट्टानी क्षेत्र (गैर-जलोढ़) होते हैं, जहाँ भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे होता है, इसलिए यहाँ नलकूप सिंचाई उपयुक्त नहीं होती है।
- उत्तरी मैदान (जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब) और तटीय मैदानों में नदियों के डेल्टा के कारण उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो नलकूप सिंचाई के लिए अत्यंत अनुकूल है।

Q21. भारत में, 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (CCA) वाली सिंचाई परियोजनाओं को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 | 05 जून 2025 | शिफ्ट 3)

(A) स्थानीय परियोजनाएँ
(B) सूक्ष्म परियोजनाएँ
(C) लघु परियोजनाएँ
(D) प्रमुख परियोजनाएँ

- **लघु परियोजनाएँ:** 2,000 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य कमान क्षेत्र।
- **मध्यम परियोजनाएँ:** 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच का क्षेत्र।
- **प्रमुख परियोजनाएँ:** 10,000 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र। सूक्ष्म जैसी कोई श्रेणी नहीं होती है।

Q22. भारत में कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त है?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 09 सितंबर 2025 | शिफ्ट 2)

(A) लैटेराइट मृदा
(B) काली मृदा
(C) जलोढ़ मृदा
(D) लाल मृदा

- **कपास:** यह एक खरीफ फसल है, जिसे 210 पाला-रहित (frost-free) दिनों की आवश्यकता होती है।
- **Bt कपास:** यह एक आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM - Genetically Modified) फसल है, जो 'बोलवर्म' नामक कीट के प्रति प्रतिरोधी है।
- **काली मृदा:** इसे 'रेगुर' भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार के उत्तर-पश्चिमी भाग (महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश) में पाई जाती है।

- **मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक:** तापमान एवं वर्षण (जलवायु), उच्चावच, वनस्पति (Flora/Fauna), समय (जो मोटाई तय करता है) और जनक चट्टान जो बनावट और रासायनिक संरचना तय करती है।

Q23. अर्ध-शुष्क उत्तर-पश्चिमी भारत में, अत्यधिक नहर सिंचाई के कारण मृदा लवणता बढ़ती है और फसल पैदावार घटती है। इसका स्पष्टीकरण और सुधार क्या है?

(NTPC UG CBT-01 | 09 मई 2026 | शाम 4:30 - 6:00)

(A) जल-आप्लावन होता है; सूखा-प्रतिरोधी फसलें अपनाना।
(B) ठंडा जल दबाव डालता है; तापमान नियंत्रित करना।
(C) पोषक तत्व बह जाते हैं; उर्वरक बढ़ाना।
(D) भौम जलस्तर बढ़ने से लवणता बढ़ती है; जलनिकासी सुधार और निक्षालन।

- **लवणता का कारण:** अर्ध-शुष्क क्षेत्रों (जैसे पंजाब, हरियाणा) में अत्यधिक सिंचाई से जलभराव होता है। तेज धूप में पानी वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन केशिका क्रिया द्वारा खनिज और लवण सतह पर आ जाते हैं, जिससे मृदा क्षारीय/लवणीय हो जाती है।
- **मृदा उपचार:** लवणीय मृदा के उपचार के लिए जिप्सम ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) का उपयोग किया जाता है, जबकि अम्लीय मृदा के उपचार के लिए चूने (Lime) का प्रयोग होता है।

हरित क्रांति (Green Revolution):

- **'हरित क्रांति'** शब्द विलियम गॉड (William Gaud) ने दिया था।
- **जनक:** विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एम. एस. स्वामीनाथन।
- पहला उच्च उपज किस्म (HYV) बीज 'IR8' (International Rice 8) था, जिसे फिलीपींस से लाया गया था।
- **हरित क्रांति के प्रथम चरण (1960 के दशक) के नकारात्मक प्रभाव:** मृदा का लवणीय होना, भूजल स्तर में भारी गिरावट और किसानों के बीच आर्थिक असमानता।

Q24. काली मिट्टी में उच्च नमी प्रतिधारण महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में फसल सघनता को कैसे प्रभावित करता है?

(NTPC Graduation CBT-01 | 27 मार्च 2026 | शिफ्ट 2)

(A) यह नमी बनाए रखकर कई फसल चक्रों का समर्थन करता है

(B) यह जलजमाव रोकने को एकल मौसम तक सीमित करता है

(C) यह रोपण फसलों को प्रोत्साहित करता है

(D) यह फसल चक्रण की आवश्यकता को कम करता है

- **स्वतः जुताई (Self-ploughing/tilling):** काली मिट्टी की जल-धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और यह अपारगम्य (Impermeable) होती है। नमी होने पर यह चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं।
- इसी नमी को लंबे समय तक रोके रखने की क्षमता के कारण यह ग्रीष्म ऋतु में भी कई फसल चक्रों का समर्थन करती है।

Q25. निम्नलिखित में से कौन भारत के उत्तरी मैदानों में बाढ़ के मैदानों की नई और युवा जमाओं को संदर्भित करता है, जो हर साल नवीनीकृत होती हैं?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 22 अगस्त 2025 | शिफ्ट 3)

(A) तराई

(B) भांगर

(C) कंकर

(D) खादर

- **भाबर:** पहाड़ों के ठीक नीचे 8 से 16 किमी चौड़ी पट्टी, जहाँ नदियाँ पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं।
- **तराई:** 10 से 30 किमी चौड़ी दलदली पट्टी जहाँ नदियाँ पुनः प्रकट होती हैं। यहाँ पानी का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। कई राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में हैं।
- **खादर:** बाढ़ वाले मैदानों की नई जलोढ़ मृदा, जो लगभग हर साल नवीनीकृत होती है और अत्यधिक उपजाऊ होती है।
- **भांगर:** पुराने जलोढ़ जमाव, जो बाढ़ के स्तर से ऊपर होते हैं।

Q26. शुष्क क्षेत्रों में, भूमिगत जल केशिका क्रिया द्वारा ऊपर आकर सूख जाता है, पीछे छूटे लवण कठोर परत बनाते हैं जिसे कहा जाता है:

(RRB NTPC UG CBT-01 | 21 अगस्त 2025 | शिफ्ट 3)

(A) हार्डपैन (Hardpans)

(B) पेडलफर (Pedalfer)

(C) लैटेराइट (Laterite)

(D) ग्रेनाइट (Granite)

Q27. शुष्क क्षेत्रों में भूमि क्षरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सबसे उपयुक्त है?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 19 अगस्त 2025 | शिफ्ट 2)

(A) कंटूर प्लाइंग (Contour ploughing)

(B) स्थानांतरित खेती (Shifting cultivation)

(C) आश्रय पट्टी वृक्षारोपण (Shelterbelt plantation)

(D) सीढ़ीदार खेती (Terrace farming)

- **आश्रय पट्टी (Shelterbelts):** शुष्क क्षेत्रों में तेज हवाओं की गति को कम करने के लिए पेड़ों को कतारों में लगाया जाता है।
- **कंटूर प्लाइंग / बंडिंग (Contour ploughing):** ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च रेखाओं के साथ बैरियर बनाए जाते हैं, जिससे पानी का बहाव धीमा होता है और ऊपरी उपजाऊ मिट्टी नहीं बहती।
- **सीढ़ीदार खेती (Terrace farming):** तीव्र ढलान वाले पहाड़ों पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती करना।
- **मल्चिंग (Mulching):** मिट्टी की नमी बनाए रखने और वाष्पीकरण रोकने के लिए मिट्टी के ऊपर जैविक पदार्थ या पुआल (Straw) की परत बिछाना।

Q28. जल सिंचित खेती (Wet farming) आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 | 24 जून 2025 | शिफ्ट 2)

(A) लैटेराइट मिट्टी
(B) जलोढ़ मिट्टी
(C) लाल मिट्टी
(D) काली मिट्टी

- **लैटेराइट मिट्टी (Laterite Soil):** 'लैटेराइट' शब्द लैटिन शब्द 'Later' (अर्थ- ईंट) से बना है। यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन (महत्वपूर्ण खनिजों के बह जाने) की प्रक्रिया से बनती है। यह अम्लीय और कम उपजाऊ होती है।
- **लाल मिट्टी:** यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों (जैसे पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र और गिरिपद/Piedmont zone) में पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। जल योजित (Hydrated) होने पर यह पीली दिखाई देती है।

Q29. कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन आयरन और एल्यूमीनियम प्रचुर मात्रा में होता है?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 | 20 जून 2025 | शिफ्ट 1)


(A) लैटेराइट मिट्टी
(B) काली मिट्टी
(C) रेगिस्तानी मिट्टी
(D) जलोढ़ मिट्टी

- भारत की लगभग सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है।
- यदि मिट्टी में आयरन और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में है, तो वह लैटेराइट मृदा है।
- यदि मिट्टी में आयरन, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिना (Alumina - Al_2O_3) प्रचुर मात्रा में है, तो वह काली मृदा है।
- जलोढ़ मिट्टी में भी फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन यह पोटाश में समृद्ध होती है।

Q30. लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ सबसे अधिक पाई जाती हैं:

(RRB NTPC Graduation CBT-01 | 11 जून 2025 | शिफ्ट 1)

(A) दक्कन के पठार पर
(B) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में
(C) पश्चिमी हिमालय में
(D) गंगा और गोदावरी के डेल्टा में



- **O-संस्तर** (Organic Layer): सबसे ऊपरी परत, जहाँ ह्यूमस मौजूद होता है।
- **A-संस्तर:** शीर्ष मृदा (Topsoil)।
- **E-संस्तर** (Eluviated Layer): निक्षालित या संक्रमण परत, जहाँ से खनिज रिसकर नीचे चले जाते हैं।
- **B-संस्तर:** अवमृदा (Subsoil)।
- **C-संस्तर:** जनक चट्टान (Parent Rock)।
- **ह्यूमस (Humus):** यह पत्तियों और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बना एक गहरे रंग का अनाकार ठोस यौगिक (Dark-colored amorphous solid compound) है, जिसकी प्रकृति कोलाइडल (Colloidal) होती है।

Q31. उत्तर-पश्चिम भारत में अचानक होने वाली शीतकालीन वर्षा के लिए कौन-सी जलवायु घटना जिम्मेदार है?

(NTPC UG CBT-01 | 19 जून 2026 | शाम 4:30 - 6:00)

(A) पुरवा पवन-तरंग
(B) स्थानिक पवन
(C) जेट प्रवाह
(D) पश्चिमी विक्षोभ

शीतकालीन वर्षा के प्रमुख कारण:
- **उत्तर-पश्चिम भारत:** यहाँ सर्दियों में वर्षा भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले 'पश्चिमी विक्षोभ' के कारण होती है।
- **जेट प्रवाह:** 9 से 13 किमी. की ऊँचाई पर चलने वाली ये तीव्र पवनें ही पश्चिमी विक्षोभों को भारत तक लाती हैं।
- राजस्थान में इस शीतकालीन वर्षा को 'मावट' कहा जाता है।
- **कोरोमंडल तट (अक्टूबर-नवंबर):** यहाँ शीतकालीन वर्षा उत्तर-पूर्वी मानसून (लौटते हुए मानसून) के कारण होती है।

Q32. कोपेन की योजना के अनुसार, सामुद्रिक पश्चिमी तटीय जलवायु (Cfb) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?


(NTPC UG CBT-01 | 18 जून 2026 | सुबह 9:00 - 10:30)

(A) यहाँ ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम स्पष्ट दिखाई देता है।
(B) यह महाद्वीपों के आंतरिक हिस्सों में पायी जाती है।
(C) महासागरीय प्रभाव से तापमान में बहुत कम उतार-चढ़ाव होता है।
(D) यहाँ 20 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होती है।

समूह	नाम	लक्षण
A	उष्णकटिबंधीय (Tropical)	सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18°C या अधिक (कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र)
B	शुष्क (Dry)	संभावित वाष्पीकरण वर्षण से अधिक
C	गर्म शीतोष्ण (Warm Temperate; मध्य अक्षांश)	सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान −3°C से अधिक पर 18°C से कम; उष्णकटिबंध के निकट का शीतोष्ण क्षेत्र
D	शीत हिम-वन (Cold Snow Forest)	सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान −3°C या उससे कम
E	शीत (Cold; टुंड्रा)	सभी महीनों का औसत तापमान 10°C से कम (जैसे लद्दाख)
H	उच्च भूमि (Highland)	ऊँचाई के कारण ठंडी

- m = मानसून; s = ग्रीष्म शुष्क (Summer Dry); w = शीत शुष्क (Winter Dry); f = पूरे वर्ष वर्षा (Full Rain)।
- पहले बड़ा अक्षर, फिर छोटा अक्षर लिखा जाता है।
- छोटा w = शीत शुष्क, जबकि बड़ा W (B समूह में) = मरुस्थल (Desert); S = स्टेपी (Steppe)।

क्षेत्र	कोड	कारण
गंगा घाटी / उत्तरी मैदान	**Cwg**	C = गर्म शीतोष्ण; w = शीत शुष्क (वर्षा ग्रीष्म में); g = गंगा घाटी।
दक्कन पठार	**Aw**	कर्क रेखा के नीचे, A = उष्णकटिबंधीय; मानसून आता है पर शीत शुष्क।
पश्चिमी घाट	**Amw**	उष्णकटिबंधीय पर शुष्क नहीं, भारी वर्षा।
कोरोमंडल तट	**As**	A = उष्णकटिबंधीय; s = ग्रीष्म शुष्क, क्योंकि ग्रीष्म में अरब सागर शाखा के लिए यह पवनविमुख है और बंगाल की खाड़ी शाखा समानांतर निकल जाती है; वर्षा शीत में उत्तर-पूर्वी मानसून से।
पूर्वोत्तर भारत	**Dfc**	D = भारी हिमपात; f = भारी वर्षा।
थार मरुस्थल	**BWhw**	B = शुष्क; W (बड़ा) = मरुस्थल।
थार के आसपास (अरावली की ओर)	**BShw (BS)**	थोड़ी वर्षा; स्टेपी प्रकार।
लद्दाख	**E / ET**	अत्यंत ठंडा; टुंड्रा प्रकार।



तापमान पर समुद्र और महाद्वीप का प्रभाव:

- **समुद्र का समकारी प्रभाव:** समुद्र तट के समीप स्थित क्षेत्रों (Marine Coast) में दिन-रात (Diurnal) और वार्षिक तापमान का अंतर (Range) बहुत कम होता है।
- **महाद्वीपीयता प्रभाव:** महाद्वीपों के आंतरिक भागों (जैसे दिल्ली, राजस्थान) में समुद्र का प्रभाव नहीं होता, जिसके कारण यहाँ गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है (दैनिक और वार्षिक तापमान का अंतर अधिक होता है)।

Q33. निम्नलिखित में से कौन-सा, भारत की चार आधिकारिक मौसम-विज्ञान संबंधी ऋतुओं में सम्मिलित नहीं है?

(NTPC UG CBT-01 | 15 जून 2026 | शाम 4:30 - 6:00)

(A) शीत ऋतु
(B) ग्रीष्म ऋतु
(C) वसंत ऋतु
(D) वर्षा ऋतु

- भारतीय मौसम विभाग (IMD) भारत में मुख्य रूप से चार आधिकारिक ऋतुएँ मानता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और मानसून निवर्तन (Post-monsoon / Retreating monsoon)।
- वसंत ऋतु (Spring) आधिकारिक मौसम-विज्ञान वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है।
- शीत अयनांत 22 दिसंबर को तथा ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है।

Q34. कोपेन की योजना के अनुसार, जलवायु के प्रकार और उसकी वनस्पति या विशेषताओं का सही मिलान कौन-सा है?

(NTPC UG CBT-01 | 08 मई 2026 | शाम 4:30 - 6:00)

(A) Aw - पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घासभूमियाँ
(B) Cfa - शीत मरुस्थल और स्थायी तुषार भूमि
(C) BWh - सघन सदाबहार वितान
(D) ET - उष्णकटिबंधीय वर्षावन

Q35. निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में स्थायी तुषार मृदा (Permafrost soil) और काई तथा लाइकेन जैसी निम्न वनस्पति पाई जाती है?

(NTPC UG CBT-01 | 08 मई 2026 | शाम 4:30 - 6:00)

(A) Aw - उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु
(B) Cfb - समुद्री पश्चिमी तट जलवायु
(C) ET - टुंड्रा जलवायु
(D) BSh - उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु

- टुंड्रा क्षेत्र अत्यधिक ठंडे होते हैं, जहाँ उचित पेड़ विकसित नहीं हो पाते; यहाँ मुख्य रूप से काई (Mosses) और लाइकेन (Lichens) पाए जाते हैं।
- **काई (Mosses):** ये ब्रायोफाइटा (Bryophyta) संघ से संबंधित हैं, जिन्हें 'पादप जगत का उभयचर' (Amphibians of the plant kingdom) कहा जाता है।
- **लाइकेन (Lichens):** यह कवक (Fungi) और शैवाल (Algae) के बीच एक सहजीवी संबंध (Symbiotic relationship) है। यह जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के लिए एक प्राकृतिक संकेतक (Natural indicator) का कार्य करता है।

Q36. किस प्राकृतिक क्षेत्र में मरुद्भिदी (Xerophytic) या सूखा-प्रतिरोधी झाड़ियों की प्रधानता होती है, जिनकी जड़ें लंबी और पत्तियां कम होती हैं?

(NTPC UG CBT-01 | 09 मई 2026 | शाम 4:30 - 6:00)

(A) ब्रिटिश प्रकार का शीत शीतोष्ण क्षेत्र
(B) भूमध्यसागरीय अरण्यभूमि
(C) स्टेपी घास के मैदान
(D) उष्ण मरुस्थलीय (सहारा प्रकार) क्षेत्र

- मरुद्भिदी ऐसे पौधे हैं जो बहुत कम वर्षा और शुष्क परिस्थितियों (जैसे उष्ण मरुस्थल) में जीवित रहने के लिए स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं।
- पानी की कमी के कारण वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए इनकी पत्तियाँ काँटों में बदल जाती हैं।

Q37. भारत में कौन-सी ऋतु तप्त, शुष्क पवनों से अभिलक्षित होती है जिसे 'लू (Loo)' के नाम से जाना जाता है?

(NTPC UG CBT-01 | 09 मई 2026 | सुबह 9:00 - 10:30)

(A) ग्रीष्म ऋतु
(B) मानसून निवर्तन
(C) पूर्व मानसून बौछारें
(D) शीत ऋतु

विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें (Local Winds):

- **लू (Loo):** ग्रीष्म ऋतु में भारत में 'अधिवहन' (Advection - ऊष्मा का क्षैतिज स्थानांतरण) के कारण चलती है।
- **चिनूक (Chinook):** 'हिम भक्षी' (Snow eater), उत्तरी अमेरिका।
- **हरमट्टन (Harmattan):** 'डॉक्टर विंड' (Doctor Wind), गिनी तट (अफ्रीका)।

- **खमसिन (Khamsin):** मिस्र (Egypt)।
- **सिरोको (Sirocco):** सहारा मरुस्थल (यह रक्त वर्षा या Blood rain के लिए जानी जाती है)।
- **फॉन (Foehn):** आल्प्स पर्वत (यूरोप) में चलने वाली गर्म पवन।
- **बोरा (Bora) और मिस्ट्रल (Mistral):** यूरोप की ठंडी पवनें।
- **ब्रिकफील्डर (Brickfielder):** ऑस्ट्रेलिया।




Q38. तिब्बती पठार, जिसे प्रायः 'रूफ ऑफ द वर्ल्ड' (विश्व की छत) कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र को निरूपित करता है?

(NTPC UG CBT-01 | 07 मई 2026 | शाम 4:30 - 6:00)

(A) ध्रुवीय मरुस्थल
(B) अल्पाइन टुंड्रा
(C) आर्कटिक टुंड्रा
(D) शीतोष्ण घासस्थल

- 'अल्पाइन टुंड्रा' (Alpine Tundra) ध्रुवों पर नहीं, बल्कि अत्यधिक ऊँचाई वाले पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों (जैसे तिब्बत का पठार या हिमालय के उच्च भाग) में पाई जाने वाली टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है, जहाँ भीषण ठंड के कारण पेड़ों का विकास नहीं हो पाता।



Q39. निम्नलिखित में से कौन मौसम और जलवायु के बीच के अंतर को सबसे अच्छी तरह से समझाता है?

(NTPC Graduation CBT-01 | 22 मार्च 2026 | शिफ्ट 3)

(A) मौसम अल्पकालिक परिवर्तनों को; जलवायु दीर्घकालिक प्रतिरूपों को दर्शाती है
(B) मौसम दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को; जलवायु अल्पकालिक परिवर्तनों को
(C) मौसम और जलवायु बिल्कुल समान परिघटना हैं
(D) मौसम स्थायी है; जलवायु अस्थायी है

- **मौसम (Weather):** यह किसी विशिष्ट समय पर वायुमंडल की अल्पकालिक (दिन-प्रतिदिन की) स्थिति है।
- **जलवायु (Climate):** यह किसी विशाल क्षेत्र के मौसम का दीर्घकालिक औसत प्रतिरूप (Long-term pattern) है, जिसके लिए सामान्यतः 30 वर्षों के डेटा का आकलन किया जाता है।

Q40. मैंगो शावर (आम्र वर्षा) निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होती है?

(NTPC Graduation CBT-01 | 19 मार्च 2026 | शिफ्ट 2)

(A) कर्नाटक और केरल
(B) बिहार और पश्चिम बंगाल
(C) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
(D) केरल और तमिलनाडु

पूर्व-मानसूनी वर्षा (Pre-monsoon Showers):
- ग्रीष्म ऋतु के अंत में होने वाली इन पूर्व-मानसूनी बौछारों को केरल और तटीय कर्नाटक में 'मैंगो शावर' (Mango Shower) कहा जाता है क्योंकि ये आम को जल्दी पकने में मदद करती हैं।
- इन्हीं क्षेत्रों (मुख्यतः केरल और कर्नाटक) में इसे 'ब्लॉसम शावर' (Blossom Shower / चेरी ब्लॉसम) भी कहा जाता है, जो कॉफी के फूलों को खिलने में सहायता करती है।

Q41. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के तटीय और आंतरिक भागों के बीच तापमान में भिन्नता की व्याख्या करता है?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 09 सितंबर 2025 | शिफ्ट 3)

(A) ऊंचाई
(B) महाद्वीपीयता
(C) दाब पेटियाँ
(D) अक्षांश

- **महाद्वीपीयता:** महाद्वीपों के आंतरिक भागों में समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं पहुँच पाता, जिससे वहाँ दैनिक और वार्षिक तापमान का अंतर बहुत अधिक होता है।
- तटीय क्षेत्रों में समुद्र की निकटता के कारण तापमान लगभग समान रहता है।

Q42. सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर-पश्चिम से भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 13 अगस्त 2025 | शिफ्ट 3)

(A) भूमध्य सागर
(B) काला सागर
(C) बाल्टिक सागर
(D) उत्तरी अटलांटिक महासागर

पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances):
- भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले ये चक्रवाती विक्षोभ जेट प्रवाह के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं।
- इन्हीं के कारण उत्तर-पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है (जिसे राजस्थान में 'मावट' कहा जाता है)।

Q43. भूमध्य रेखा के आसपास के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहाँ दोनों गोलार्द्धों से व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 11 अगस्त 2025 | शिफ्ट 3)

(A) ध्रुवीय मोर्चा (Polar Front)
(B) उपोष्णकटिबंधीय उच्च (Subtropical High)
(C) अश्व अक्षांश (Horse Latitudes)
(D) अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ)

- **ITCZ (Intertropical Convergence Zone):** यह भूमध्य रेखा के पास का वह निम्न वायुदाब क्षेत्र है, जहाँ व्यापारिक पवनें (Trade winds) आपस में मिलती हैं।
- यह कोई स्थिर (Static) क्षेत्र नहीं है; सूर्य की गति के साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है (जैसे जुलाई में यह लगभग 20°-25° उत्तरी अक्षांश तक पहुँच जाता है)।
- **अश्व अक्षांश (Horse Latitudes):** यह 30° उत्तर और 30° दक्षिण अक्षांशों के पास स्थित 'उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब' (Subtropical High) का क्षेत्र है।

Q44. उत्तर-पश्चिम भारत में कौन सा प्राकृतिक निर्माण गर्मी के महीनों के दौरान एक निम्न दबाव क्षेत्र शुरू करता है?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 11 अगस्त 2025 | शिफ्ट 1)

(A) थार रेगिस्तान
(B) गंगा बेसिन
(C) अरावली पहाड़ियाँ
(D) सतपुड़ा पर्वत

- ग्रीष्म ऋतु में थार मरुस्थल अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ तीव्र निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है।
- इसी समय तिब्बत का पठार भी अत्यधिक गर्म होता है, जिससे पूर्वी जेट प्रवाह उत्पन्न होते हैं। यह निम्न दबाव क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम मानसून को भारतीय भूभाग की ओर खींचने में मदद करता है।

Q45. निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की भारत की जलवायु को आकार देने में भूमिका को छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 | 10 जून 2025 | शिफ्ट 1)

(A) मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकना
(B) दक्षिण-पश्चिम मानसून हवाओं के लिए अवरोधक बनना
(C) उत्तरी भारत में बर्फबारी में योगदान करना
(D) संवहन धाराएँ बनाना

हिमालय का जलवायुविक महत्त्व:

- हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है।
- यह मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोधक का कार्य करता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है और तिब्बत का पठार वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है।
- अपनी अत्यधिक ऊँचाई के कारण यह उत्तरी भारत में बर्फबारी का कारण बनता है।
- संवहन धाराएँ मुख्य रूप से आर्थर होम्स के सिद्धांत के तहत पृथ्वी के मेंटल (मैग्मा) में उत्पन्न होती हैं।

Q46. भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे अधिक पाई जाने वाली वृक्ष प्रजाति कौन-सी है?

(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 19 जून 2026 | दोपहर 12:45 - 2:15)

(A) पाइन
(B) फर
(C) सागौन
(D) ओक

उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन (Tropical Deciduous Forests):

- इन्हें 'मानसूनी वन' भी कहा जाता है और ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं।
- **प्रमुख वृक्ष:** साल, सागौन (Teak), शीशम, चंदन, महुआ, पलाश, नीम और खैर।
- **वर्गीकरण:** वर्षा के आधार पर इन्हें आर्द्र पर्णपाती (100-200 सेमी) और शुष्क पर्णपाती (70-100 सेमी) में बाँटा जाता है। शुष्क पर्णपाती वनों को 'पार्कलैंड परिदृश्य' भी कहा जाता है।
- चीड़, देवदार आदि शंकुधारी वनों की प्रजातियाँ हैं।

Q47. किस प्रकार के वनों में पौधे वर्ष के अधिकांश समय पर्णरहित रहते हैं?

(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 16 जून 2026 | सुबह 9:00 - 10:30)

(A) सदाबहार वन
(B) पर्वतीय वन
(C) उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन
(D) वेलांचली व अनूप वन

कांटेदार वनों की अनुकूलन विशेषताएँ:

- उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में पानी की कमी (शुष्कता) के कारण पौधों की पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ताकि रंध्रों के माध्यम से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को रोका जा सके।
- यहाँ बबूल और 'टसॉक घास' (गुच्छा घास) जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।
- सदाबहार वनों के पेड़ अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराते, इसलिए वे हमेशा हरे-भरे दिखते हैं और उनका वितान या Canopy बहुत सघन होता है।

Q48. उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है?

(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 15 जून 2026 | शाम 4:30 - 6:00)

(A) शीतोष्ण घासस्थल
(B) कांटेदार और झाड़ियों वाली वनस्पति
(C) उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
(D) उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन

उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन:

- ये वन भारी वर्षा (>200 सेमी) वाले क्षेत्रों जैसे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं।
- **प्रमुख वृक्ष:** आबनूस, महोगनी, सिनकोना (जिसकी छाल से मलेरिया की दवा कुनैन/Quinine बनती है), रोज़वुड और एपिफाइट्स (अन्य पेड़ों पर चढ़ने वाली वनस्पतियाँ)।
- अमेज़ॅन के वर्षावन भी इसी का एक उदाहरण हैं।

Q49. निम्नलिखित में से कौन-सा जन्तु, टुंड्रा प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है?

(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 14 जून 2026 | सुबह 9:00 - 10:30)

(A) इबेरियन लिंक्स
(B) गीदड़
(C) वालरस
(D) रेगिस्तानी सींगदार वाइपर

टुंड्रा जीवों की विशेषताएँ:

- टुंड्रा क्षेत्र अत्यधिक ठंडे (ध्रुवीय) होते हैं। यहाँ ध्रुवीय भालू और वालरस जैसे बर्फीली जलवायु के अनुकूल जीव पाए जाते हैं।
- ठंडे वातावरण के कारण सरीसृप (जैसे वाइपर) टुंड्रा क्षेत्रों में जीवित नहीं रह सकते।

Q50. निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति को 'टैगा (taiga)' भी कहा जाता है?

(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 13 जून 2026 | शाम 4:30 - 6:00)

(A) उष्णकटिबंधीय घासस्थल
(B) भूमध्यसागरीय वनस्पति
(C) शंकुधारी वन
(D) शीतोष्ण पर्णपाती वन

टैगा और अन्य वन प्रणालियाँ:

- **टैगा/शंकुधारी वन:** टुंड्रा के ठीक नीचे पाए जाने वाले इन वनों को टैगा (रूसी भाषा में 'अछूता' कहा जाता है। बर्फ को आसानी से गिराने के लिए यहाँ के पेड़ शंकु के आकार के होते हैं, जैसे– पाइन , देवदार।
- **शीतोष्ण पर्णपाती वन:** इन वनों में तीतर और मोनाल (उत्तराखंड में) जैसे पक्षी पाए जाते हैं।
- **भूमध्यसागरीय वनस्पति:** यह खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और वर्षा शीत ऋतु में होती है।

Q51. भारत में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को आकार देने में कौन-सा जलवायु कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?

(NTPC Graduation CBT-01 | 27 मार्च 2026 | शिफ्ट 3)

(A) मृदा पोषक तत्वों की गुणवत्ता
(B) वार्षिक वर्षा (> 250 सेमी)
(C) ऊंचाई संबंधी प्रवणता
(D) माध्य वार्षिक तापमान भिन्नताएँ

- **वर्षा का प्रभाव:** भारत में प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार मुख्य रूप से वार्षिक वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है।
- जहाँ वर्षा अधिक (>200 सेमी) होती है, वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं और जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ कँटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं।

Q52. निम्नलिखित में से कौन सा रोपित (Planted) और प्राकृतिक (Natural) वनस्पति के बीच एक प्रमुख अंतर है?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 04 सितंबर 2025 | शिफ्ट 1)

(A) फलों की उपस्थिति
(B) उत्पत्ति का स्थान
(C) शामिल मानव पर्यवेक्षण
(D) पत्तियों की संख्या

- **प्राकृतिक वनस्पति:** यह प्रकृति में स्वतः (बिना मानवीय हस्तक्षेप के) उगती और विकसित होती है।
- **रोपित वनस्पति:** इसे मनुष्यों द्वारा लगाया जाता है और इसके विकास में मानवीय हस्तक्षेप (Human supervision/interference) शामिल होता है।

Q53. निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में पश्चिमी घाट के निचले क्षेत्र स्थित हैं जहाँ उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 28 अगस्त 2025 | शिफ्ट 3)

(A) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक
(B) गुजरात, महाराष्ट्र और केरल
(C) केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक
(D) आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा

Q54. बिर्च (Birch) और रोडोडेंड्रोन (Rhododendrons) किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 29 अगस्त 2025 | शिफ्ट 1)

(A) उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन

(B) उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन

(C) पर्वतीय वन

(D) वेलांचली एवं अनूप वन

Q55. कौन सा मूल्यवान पेड़ मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय में उगता है और निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाता है?

(RRB NTPC UG CBT-01 | 22 अगस्त 2025 | शिफ्ट 2)

(A) मैगनोलिया

(B) रोडोडेंड्रोन

(C) सिनकोना

(D) देवदार

Q56. भारत में 100 सेमी और 200 सेमी के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से वन पाए जाते हैं?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 | 10 जून 2025 | शिफ्ट 1)

(A) काँटेदार वन

(B) उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन

(C) अल्पाइन वन

(D) उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन

पर्वतीय ऊँचाई एवं वनस्पति का क्रम (Himalayas):

- **गिरिपद/तराई क्षेत्र:** हिमालय के सबसे निचले हिस्सों (गिरिपद) में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
- **मध्य ऊँचाई:** जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, यहाँ शंकुधारी (Coniferous) और अल्पाइन (Alpine) वन पाए जाते हैं।
- **शीर्ष ऊँचाई:** हिमालय के सबसे ऊपरी अत्यधिक ठंडे हिस्सों में टुंड्रा (Tundra) वनस्पति पाई जाती है।

विश्व के प्रमुख घास के मैदान और स्थानांतरी कृषि

विश्व के प्रमुख घास के मैदान (Grasslands):

- प्रेयरीज (Prairies): उत्तरी अमेरिका
- स्टेपीज (Steppes): यूरेशिया / एशिया
- वेल्ड्स (Velds): दक्षिण अफ्रीका
- सवाना (Savanna): अफ्रीका
- डाउंस (Downs): ऑस्ट्रेलिया
- कैम्पोस (Campos): ब्राज़ील
- लानोस (Llanos): वेनेज़ुएला

स्थानांतरी कृषि (Shifting Cultivation) के अन्य अंतर्राष्ट्रीय नाम:

- रोका (Roka): ब्राज़ील
- कोनूको (Conuco): वेनेज़ुएला



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW