



¡Si podés quedate en casa!

Toda la información de los trámites y servicios en línea



Plan Nacional Coronavirus

Accedé a toda la información oficial



Emergencia Sanitaria

Medidas para personas y empresas

Covid-19

Recomendaciones para el equipo de salud sobre COVID-19 en niños.

25 de Abril, 2020



Compartir

El Ministerio de Salud Pública (MSP) adopta y recomienda el documento "Propuesta para la definición de caso sospechoso e indicación de test diagnóstico de COVID-19 en niños", dirigido a los equipos de salud.



Las manifestaciones clínicas de la COVID-19 son similares en niños y adultos. Sin embargo, los niños con COVID-19 confirmada se presentan con síntomas más leves. El riesgo de que se progrese a enfermedad severa y su mortalidad es menor en niños y adolescentes.

Los síntomas reportados incluyen “síntomas de resfriado”, como fiebre, rinorrea, tos y en algunos casos vómitos y diarrea, aunque estos últimos son menos frecuentes.

Asimismo la mayoría de los niños con COVID-19 presentan contactos intradomiciliarios. Del 4 a 9% son asintomáticos y aún no se conocen con exactitud qué características son las que hacen a algunos de ellos más susceptibles de contraer la enfermedad en términos más graves. A pesar de ello, la mayoría de los expertos recomiendan considerar en este grupo a los niños inmunodeprimidos por cualquier causa, los portadores de cardiopatías, patologías respiratorias crónicas (excepto asma), y diabéticos con un mal control de la enfermedad. Debido a que se han comunicado casos de mayor gravedad en menores de un año se recomienda extremar la vigilancia en este grupo.

El documento elaborado por el Programa de Salud de la Niñez del MSP a través de un trabajo interinstitucional, recomienda utilizar el juicio clínico para determinar la necesidad de realizar test diagnósticos específicos para confirmar COVID-19 y descartar otras causas de enfermedad respiratoria (VRS, Influenza, etc.), en función de: el estudio de epidemiología local de COVID-19 y el curso clínico de la enfermedad, incluyendo la presencia de síntomas y el contacto cercano con caso confirmado de COVID-19 dentro de los 14 días del comienzo de los síntomas.

El documento proporciona recomendaciones a los equipos de salud, para diferenciar la sintomatología que produce la enfermedad COVID-19 de otras afecciones comunes como influenza, resfrío común y alergias estacionales, debido a que la sintomatología respiratoria es muy común en la población pediátrica, especialmente en meses invernales.

Enlaces de descarga



[Propuesta de definición de caso sospecho e indicación de test de Covid-19 en niños \(.pdf 1671 KB\)](#)

Etiquetas

Empresas y servicios de salud

Profesionales y técnicos

Usuarios

¿Te pareció útil esta página?

[Sí](#) [No](#)

¿Encontraste algún error o tenés alguna sugerencia?

[Ayúdanos a mejorar](#)

Ministerio de Salud Pública

Dirección: 18 De Julio 1892

Teléfonos: [1934](#)

[Contacto](#)

Horario de atención: Lunes a viernes de 09:00 a 16:00

Información de interés

- [Fondo Nacional de Recursos](#)
- [Objetivos Sanitarios 2020](#)
- [Capacitación 2018](#)
- [INDT](#)

Enlaces de interés

- [Registro de Títulos](#)
- [Consulta de Medicamentos](#)
- [Infotítulos](#)
- [Mejores prácticas en el primer nivel de atención](#)

gub.uy



Sitio oficial de la República Oriental del Uruguay

[Mapa del Sitio](#)

[Declaración de accesibilidad](#)

[Términos de uso](#)

[Política de Privacidad](#)

CHAT!

¿Dudas sobre
Coronavirus?