

Gäller från 2020-04-01

Provtagningsindikation för covid-19, version 11

Indikationen fokuserar på att identifiera fall inom sjukvård och omsorg för att på så sätt skydda de mest utsatta grupperna.

För definition av fall av covid-19 hänvisas till <u>falldefinitionen vid anmälan enligt smittskyddslagen</u>. Sjukdom hos individer med gott allmäntillstånd och utan behov av sjukvård hanteras i första hand genom isolering i hemmet och social distansering.

Regionala och lokala anpassningar samordnas av regional särskild sjukvårdsledning och smittskyddsläkaren utifrån vad som är mest ändamålsenligt baserat på aktuellt epidemiologiskt läge och regionala och lokala strukturer.

Kategori 1 – prioriterad provtagning

Patienter i behov av inneliggande sjukvård och omsorg samt redan inneliggande vid sjukhus och omsorgsboende

Klinisk bild

Akut infektionsinsjuknande med feber och/<u>eller</u> luftvägssymtom utan känd orsak med behov av inneliggande vård på sjukhus

Observera: Diagnostik får inte fördröja handläggning av andra akuta tillstånd som kräver snabb hantering så som till exempel lungemboli och sepsis.

Kategori 2A

Personal i sjukvård och omsorg baserat på vad som är mest ändamålsenligt utifrån aktuella resursbehov.

Klinisk bild

Akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom

Kategori 2B

Misstänkt fall vid institutionsboende baserat på vad som är mest ändamålsenligt utifrån aktuella resursbehov.

Klinisk bild

Akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom