Ejercicio 4: $S = \{id_1, id_2, id_6, id_5\}$

| Ejercicio 5: Modelo de Naïve Bayes | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase | $P$(Clase) | Canal | $P$(Canal \| Sí) | $P$(Canal \| No) | Plan | $P$(Plan \| Sí) | $P$(Plan \| No) | Región | $P$(Región \| Sí) | $P$(Región \| No) | Disp. | $P$(Disp. \| Sí) | $P$(Disp. \| No) |
| Sí | 0.4 | Web | 0.25 (1) | 0.667 (4) | Básico | 0.00 (0) | 0.500 (3) | Norte | 0.25 (1) | 0.667 (4) | Andr. | 0.5 (2) | 0.5 (3) |
| No | 0.6 | Móvil | 0.75 (3) | 0.333 (2) | Estd. | 0.25 (1) | 0.333 (2) | Sur | 0.75 (3) | 0.333 (2) | iOS | 0.5 (2) | 0.5 (3) |
| | | | | | Prem. | 0.75 (3) | 0.167 (1) | | | | | | |

| Ejercicio 5: Predicción Naïve Bayes | | | |
|---|---|---|---|
| *id* | *clase real* | *clase pred.* | *probabilidad* |
| 11 | sí | sí (TP) | 0.717 |
| 12 | no | no (TN) | 1.000 |
| 13 | sí | no (FN) | 1.000 |
| 14 | no | sí (FP) | 0.938 |
| 15 | no | sí (FP) | 0.717 |
| 16 | sí | no (FN) | 0.703 |

(P ← SÍ, N ← NO)

| Ejercicio 5: Matriz de confusión | | |
|---|---|---|
| **Predicho** / **Real** | SÍ compra | NO compra |
| SÍ compra | 1 ($id_{11}$) | 2 ($id_{13}$, $id_{16}$) |
| NO compra | 2 ($id_{14}$, $id_{15}$) | 1 ($id_{12}$) |

$TPR = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}, \quad TNR = \frac{TN}{TN+FP} = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}\ , \quad G\text{-}mean = \sqrt{TPR \cdot TNR} = \sqrt{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{1}{3}} \approx 0.333$