OVSz VÉRADÁSRA VALÓ ALKALMASSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ GYÓGYSZEREK

Kérjük, hogy jelölje a kérdőíven, ha jelenleg bármilyen gyógyszert szed, vagy az alábbi táblázatban felsorolt gyógyszerek bármelyikét szedte a múltban, a megadott időn belül.

A véradásra való alkalmasságot általában nem befolyásoló gyógyszerek:

*A felsorolt gyógyszercsoportok szedése/alkalmazása mellett **általában engedélyezett a véradás**, azonban a döntést az alapbetegség figyelembe vételével a kivizsgáló szakember hozza meg.*

Ha rendszeresen táplálék kiegészítőt vagy gyógyteát fogyaszt, szóban jelezze a kivizsgáláskor.

- Külsőleg alkalmazott gyógyszerek
- Allergia ellenes szem- és orrcseppek
- Fogamzásgátló gyógyszerek
- Vérnyomást csökkentő gyógyszerek
- Koleszterin-szint csökkentők
- Hangulatjavító gyógyszerek
- Szorongás csökkentő gyógyszerek
- Figyelem javító gyógyszerek
- Pajzsmirigy-hormon pótló gyógyszerek
- Homeopatiás szerek
- Vitaminok
- Étvágycsökkentők
- Altatók
- Nyugtatók
- hashajtók,
- Epehajtók
- Emésztés serkentők
- Fájdalomcsillapítók
- Vércukorszintet csökkentő gyógyszerek (kivéve inzulin)

Magzatkárosító gyógyszerek:

Néhány gyógyszer magzatkárosító mellékhatással rendelkezik.

*Ha várandós nő olyan vért kap, amiben ezek a gyógyszerek jelen vannak, jelentősen megnő az embrió méhen belüli elhalásának, vagy a **születendő gyermek súlyos rendellenességének kockázata**.*

*Akit ilyen gyógyszerrel kezeltek, **nem adhat vért**, amíg a gyógyszer a szervezetében jelen van.*

Feltétlenül jelezze a kérdőíven, ha a felsorolt gyógyszerek bármelyikét szedte a megadott időtartamon belül.

Gyógyszer név	Hatóanyag	Időtartam
Kopaszodás kezelésére:		
PROPECIA	**finasteride**	**30 nap**
Hegekkel gyógyuló súlyosan pattanásos bőr (akne) kezelésére:		
ACCUTANE, ABSORICA, AMNESTEEM, CLARAVIS, ISOTRETINOIN, INERTA, ISOTIORGA, MEDINAC, MYORISAN, ROACCUTAN, SOTRET NEO, ZENATANE	**isotretionin**	**30 nap**
Férfiak prosztata megnagyobbodásának kezelésére:		
DUAMILD, FINANORM, FINASTERID, FINASTERIDE, FINPROS, PROPEDICA, PROSCAR, PROSTERID, REDUPROS	**finasteride**	**30 nap**
AGLANDIN, AVODART, DUODART, GELMOR, JALYN, PROSDUTAM, TADUSTA, TAMSUDIL DUO, UNISOL	**dutasteride**	**6 hónap**
Migrén, bipoláris zavar, epilepszia kezelésére:		
CONVULEX, DEPAKINE CH., EPILIM, DEPOKATE ER, STAVZOR	**valproinsav**	**30 nap**
Vírusfertőzéssel kapcsolatban szedett gyógyszerek:		
FAVIPIRAVIR	**favipiravir**	**30 nap**
A bőrdaganatok egy fajtájának (basalioma) kezelésére:		
ERIVEDGE	**vismodegib**	**2 év**
ODOMZO	**sonidegib**	**2 év**
Pikkelysömör (psoriasis) kezelésére:		
NEOTIGASON, SORIATANE	**acitretin**	**3 év**
TEGISON, TIGASON	**etretinate**	**végleges**
Egyes immunológiai betegségek kezelésére használt gyógyszerek:		
LEFLUNOMID, ARAVA	**leflunomide**	**2 év**
AUBAGIO	**teriflunomide**	
CELLCEPT, MYFENAC, MYFORTIC	**mycophenolate**	**6 hét**
THALOMIDE	**thalidomide**	**30 nap**
RINVOQ	**upadacitinib**	**30 nap**
Bármilyen HIV megelőzésére vagy gyógyítására alkalmazott gyógyszer (PrEP / PEP /ART) *A gyógyszernevek csak példák. Kérjük, minden gyógyszert jelezzen!*		
TRUVADA, TABINERA, DESCOVY, DUNOTRISIN, EMTRICITABINE/TENOFOVIR-DISOPROXIL	**emtricitabine és tenofovir disoproxil komb.**	**6 hónap**
TIVICAY	**dolutegravir**	
ISENTRESS	**raltegravir,**	
APRETUDE VOCABRIA (injekció)	**cabotegravir**	**2 év**
SUNLENCA (injekció)	**lenacapavir**	

OVSz VÉRADÁSRA VALÓ ALKALMASSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ GYÓGYSZEREK

Véralvadást gátló (antikoaguláns) gyógyszerek /„Vérhígítók”:				**Időtartam**
A véralvadást gátló gyógyszer arra szolgál, hogy az arra hajlamos személyekben ne alakuljon ki vérrög a lábakban, a tüdőben vagy a test más részeiben. *Akit ilyen gyógyszerrel kezelnek, **nem adhat vért**, amíg a gyógyszer hatása tart, mert a véradáskor jelentős véraláfutás vagy vérzés keletkezne.*	CLEXANE	HEPARIBENE	SYNCUMAR	**7 nap**
	DABIGATRAN	INHIXA	TELEXER	
	DANENGO	KARDATUXAN	VESSEL-DUE	
	ELIQUIS	LIXIANA	WARFARIN	
	FRAGMIN	MARFARIN	XERDOXO	
	FRAXIPARINE	PRADAXA	XARELTO	
	FRAXODI	RIVAROXABAN	XILTESS	

Láz- és fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és trombocita-aggregációt gátló gyógyszerek:				
Egyes lázcsillapítók, fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők és a vérrögök kialakulásának megelőzésére alkalmazott trombocita-aggregációt gátló szerek a vérlemezkék szabályos működését akadályozzák. *A táblázatban szereplő gyógyszerek szedése **<u>általában nem akadálya a véradásnak</u>**, azonban a levett vér nem alkalmazható valamennyi beteg gyógyítására.* *Kérjük, hogy ártalmatlannak tűnő gyógyszerek szedését is jelölje, például: ASPIRIN, IBUPROFEN, FLECTOR, DICLOFENAC*	ACIZAL EP	DEKENOR	MELOXICAM	**14 nap**
	ACLOTIN	DEXOBLOK	MESULID	
	ADVIL	**DICLAC**	MOVALIS	
	AFLAMIN	**DICLOFENAC**	NEODOLPASSE	
	AKLOFEP	DICLOMEL SR	NIDOL	
	ALEVE	DICLOPRAM	NOCLAUD	
	ALGOFLEX	DICORAL	NOMIGRIN	
	ALGOFLEX NEO	DIFLAM	NOVORUFEN	
	ALKA-SELTZER	DISGREN	**NUROFEN**	
	ANALGESIN	DOLGIT	PANACTIV	
	ANTACLAST	DOLOWILL	PEDEA	
	APRANAX	DORIFEN	PLAGREL	
	ASA KRKA	EFIENT	PLAVIX	
	ASA PROTECT	EGITROMB	RANTUDIL	
	ASACTAL	ELISKARDIA	RAPIDOPHEN	
	ASATRIN	ENANTYUM	RELIFEX	
	ASPICONT	FELDENE	RHINATHIOL COLD	
	ASPIRIN	**FLECTOR**	SERACTIL	
	ASPREVIN	FLEMAC	SKUDEXA	
	ASTRIX	FLUGALIN	**SPEDIFEN**	
	ATROMBIN	FORTEDOL	TBL. ANTIDOL.	
	BEWIM	IBUMAX	TBL. CHINAC.	
	BISOBLOCK PLUS	**IBUPROFEN**	TICLID	
	BREXIN	**IBUSTAR**	TROMBEX	
	BRILIQUE	IPATON	UPTRAVI	
	BRUFEN	**KALMOPYRIN**	VOLTAREN	
	CAMELOX	KARDEGIC	XEFO	
	CATAFLAM	KARDOGREL	XETERDUO	
	CILIZEK	KERBERAN	XILOX	
	CILOPEDIA	KETODEX	ZADEX	
	CILOSTAZOL	MELFEN	ZYLLT	
	CLOPIDEP	MELOXAN		
	CLOPIDOGREL	MELOXEP		