H106, LHP, source id $= 0$, $\mathbf{q} \sim (2,2,0)^\mathsf{T}$

H106, REG, source id $= 0$, $\mathbf{q} \sim (2,2,0)^\mathsf{T}$

H106, LHP, source id $= 1$, $\mathbf{q} \sim (2,2,0)^\mathsf{T}$

H106, REG, source id $= 1$, $\mathbf{q} \sim (2,2,0)^\mathsf{T}$

$\mathrm{Im}\, R_A^{y,y}(\mathbf{q},t,\tau)$

$t = 10a$

H106, LHP, source id $= 0$, $\mathbf{q} \sim (2,2,0)^\mathsf{T}$

H106, REG, source id $= 0$, $\mathbf{q} \sim (2,2,0)^\mathsf{T}$

H106, LHP, source id $= 1$, $\mathbf{q} \sim (2,2,0)^\mathsf{T}$

H106, REG, source id $= 1$, $\mathbf{q} \sim (2,2,0)^\mathsf{T}$

$\mathrm{Im}\, R_A^{y,y}(\mathbf{q},t,\tau)$

$t = 12a$

H106, LHP, source id $= 0$, $\mathbf{q} \sim (2,2,0)^\mathsf{T}$

H106, REG, source id $= 0$, $\mathbf{q} \sim (2,2,0)^\mathsf{T}$

H106, LHP, source id $= 1$, $\mathbf{q} \sim (2,2,0)^\mathsf{T}$

H106, REG, source id $= 1$, $\mathbf{q} \sim (2,2,0)^\mathsf{T}$

$\mathrm{Im}\, R_A^{y,y}(\mathbf{q},t,\tau)$

$t = 14a$

τ/a