

Umgang mit Depression

Wenn Suizidgefahr
dazukommt

Bei konkretem Plan, verfügbaren Mitteln oder fehlender Sicherheit: **sofort 144.**
Bei ernster Sorge ohne unmittelbare Lebensgefahr: **0800 33 66 55.**

Sofortkontakte

NOTFALLDIENST ZÜRICH
0800 33 66 55

Wenn die Lage ernst ist oder Sie
professionelle Einschätzung brauchen


SANITÄT
144

Bei akuter Suizidgefahr oder wenn niemand
mehr sicher ist

DARGEBOTENE HAND
143

Wenn Sie selbst sofort mit jemandem
sprechen müssen

Depressions-Thermometer: Schwere und Suizidgefahr



Orientierung in der Depression

Depression ist nicht bloss Traurigkeit, sondern oft Leere, Schwere und tatsächliches Nicht-Können. Dieses Blatt ersetzt keine fachliche Einschätzung. Was Angehörige meist tun können: weniger Druck, weniger Lösungen, mehr tragfähige Präsenz und frühes Einbeziehen des Behandlungsteams.

Woran Sie eine schwere Phase erkennen

- starker Rückzug, stundenlanges Liegen oder Schlafen
 - Hoffnungslosigkeit, Sätze wie «Es hat alles keinen Sinn»
 - Verlangsamung und kaum Reaktion
 - Selbstabwertung wie «Ich bin eine Last»
 - Vernachlässigung von Essen, Körperpflege, Alltag
- Entscheidend sind Dauer, Tiefe und Veränderung gegenüber dem üblichen Zustand.

Wie Kontakt gelingt

- kurz präsent sein: «Ich bin da. Du musst nichts sagen.»
 - Druck rausnehmen, in kleinen Einheiten denken
 - Gefühl stehen lassen statt korrigieren
 - zur Kontaktaufnahme mit dem Behandlungsteam ermutigen — gemeinsam anrufen
 - an vereinbarte Medikamenten-Einnahme erinnern, ohne Dosierungen zu ändern
 - Kindern altersgerecht erklären: es ist eine Krankheit
- Hilfreich oft: «Ich kann das nicht lösen, aber ich bin hier.»

Was eher schadet

- «Reiss dich zusammen» oder neue Lösungsvorschläge
- ständiges Nachfragen, ob es schon besser ist
- Vergleiche mit anderen oder Schuldgefühle machen
- Suizidhinweise aus Angst überhören

Wann sofort handeln

Nicht weiter allein tragen, sondern sofort Hilfe holen, wenn Suizidgedanken oder Todeswünsche geäußert werden, Verabschiedungen oder konkrete Hinweise da sind, ein Plan oder Mittel vorhanden sind oder die Person nicht mehr sicher allein ist.

Direkt fragen ist erlaubt: «Denkst du daran, dir etwas anzutun?» Bei konkreter Suizidgefahr: 144.

Nächster Schritt

Wenn schwer, aber nicht akut lebensbedrohlich: Behandlungsteam oder Notfalldienst früh einbeziehen. Bei konkreter Suizidgefahr endet der Gesprächsrahmen — Schutz vor Kommunikation. Holen Sie auch für sich selbst Unterstützung, bevor Sie zusammenbrechen. Weiterführend: Notfallseite · Modul 6: Kommunikation in der Depression

Quellen (Auswahl)

1. NICE (CG185): Bipolar disorder: assessment and management. Updated 2025-09-02. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg185>
2. NICE (NG225): Self-harm: assessment, management and preventing recurrence. Reviewed 2024-08-16. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng225>
3. Ärztefon Zürich: 0800 33 66 55; bei akuter Lebensgefahr 144. <https://www.aerztefon.ch/kontakt/>