


18 Belastungen

Wenn die Belastung kippt

Wenn Sie merken, dass Sie kaum noch schlafen, innerlich nur noch im Alarmzustand sind oder selbst zusammenbrechen könnten: holen Sie Unterstützung dazu und tragen Sie diese Lage nicht länger allein.

- 1 Belastung als Landkarte sehen
- 2 Drei stärkste Lasten markieren
- 3 Früh Hilfe holen statt spät zusammenbrechen

Vier Belastungsfelder statt 18 Einzelpunkte



Schon wenige Punkte können reichen, um dauerhaft zu erschöpfen. Die Landkarte soll sortieren, nicht beweisen, dass es schlimm genug ist.

Worum es hier geht

Viele Angehörige merken erst spät, wie viel sie längst mittragen. Nicht nur Termine, Krisen oder Gespräche kosten Kraft. Auch das ständige Mitdenken, Beobachten, Absichern, Hoffen und Funktionieren wird zu einer eigenen Last.

Ein grosser Teil davon ist von aussen kaum erkennbar. Innerlich laufen aber Alarmbereitschaft, Schlafmangel, Schuldgefühle, Einsamkeit und ständiges Vorausdenken mit. Dieses Blatt ordnet 18 typische Belastungen in vier Felder, damit aus diffusem Druck eine verständlichere Lage wird.

Die 18 Belastungen als Landkarte

Wissen und Unsicherheit

- Unsicherheit, was Symptom und was Persönlichkeit ist
- Informationsmangel rund um Behandlung, Rückfälle und Krisen
- Angst vor Rückfall, Eskalation oder Kontrollverlust
- Hilflosigkeit, weil nicht alles beeinflussbar ist

Körper und Alarm

- dauernde Anspannung und inneres Beobachten
- Schlafprobleme durch Wachsamkeit und Sorgen
- Belastung durch Suizidangst oder Krisenwissen
- Reizbarkeit oder innere Härte als Zeichen von Überlastung

Beziehung und Alleinsein

- Einsamkeit, obwohl andere Menschen da sind
- Scham oder das Gefühl, die Lage erklären zu müssen
- Rückzug aus dem sozialen Umfeld
- innere Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz
- Trauer um Leichtigkeit, Gegenseitigkeit und Normalität

Verantwortung und Verlust

- Alleinverantwortung im Alltag oder in Krisen
- Schuldgefühle, wenn eigene Grenzen spürbar werden
- Überforderung durch Information, Behandlung und Organisation
- finanzielle Sorgen oder praktische Dauerlast
- das Gefühl, selbst kaum mehr vorzukommen

Was häufig hilft

- die eigene Belastung als reale Folge der Situation einordnen, nicht als persönliches Versagen
- einzelne Belastungen benennen, statt nur zu sagen: „Es ist alles zu viel“
- Unterstützung früher einbeziehen, bevor Überlastung zur Normalität wird
- fragen: Was frisst gerade am meisten Kraft – Unsicherheit, Verantwortung, Schlafmangel, Einsamkeit oder Angst?

Ein hilfreicher Satz kann sein:

„Was ich trage, ist nicht eingebildet – es ist eine reale Belastung.“

Was eher nicht hilft

- Belastung erst dann ernst zu nehmen, wenn gar nichts mehr geht
- nur das Sichtbare gelten zu lassen und das innere Mittragen kleinzureden
- sich mit anderen zu vergleichen, die scheinbar besser funktionieren
- anzunehmen, gute Angehörige müssten alles still aushalten

Nächster sinnvoller Schritt

Schreiben Sie die drei Belastungen auf, die Sie im Moment am meisten Kraft kosten. Markieren Sie, was davon für andere sichtbar ist und was fast nur innerlich mitläuft. Nicht, um alles sofort zu lösen, sondern um die Last erstmals klarer zu sortieren.

Weiterführend:

- Modul 2: Was Angehörige am meisten belastet
- Modul 2: Hypervigilanz
- Modul 7: Selbstfürsorge als Belastungsmanagement
- Dargebotene Hand: 143
- Ärztelefon Zürich: 0800 33 66 55

Quellen (Auswahl)

1. Karambelas et al. (2022): Caregiver burden and psychological functioning in caregivers. BMC Psychiatry. <https://doi.org/10.1186/s12888-022-04069-w> · 2. Ntsayagae et al. (2023): Caregiver burden among caregivers of patients with mental illness. Int J Environ Res Public Health. <https://doi.org/10.3390/ijerph192416842> · 3. NICE (CG185): Bipolar disorder: assessment and management. Updated 2025-09-02. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg185>