

Schlaf als Frühwarnsystem

Warum der Schlafrhythmus bei der bipolaren Störung oft das erste und wichtigste Warnzeichen für eine neue Episode ist. **Der typische Verlauf**

Der Taktgeber des Gehirns

Für Menschen mit einer bipolaren Störung ist Schlaf nicht nur Erholung, sondern ein zentraler Stabilisator. Der Schlaf-Wach-Rhythmus ist eng mit der Stimmungsregulation verknüpft. Veränderungen im Schlafverhalten treten oft Tage oder sogar Wochen vor den eigentlichen Stimmungsschwankungen auf.



Ein wichtiges Warnsignal für Manie


2 Nächte < 6 Stunden oder 1 Nacht < 4 Stunden — und trotzdem energiegeladen.

Wenn die erkrankte Person deutlich weniger schläft, sich am nächsten Tag aber nicht müde, sondern leistungsfähig fühlt, ist dies ein hochgradiges Warnsignal für eine beginnende Manie.

Schlaf und Depression

Auch vor einer depressiven Episode verändert sich der Schlaf oft drastisch. Dies kann sich als extremes Schlafbedürfnis (Hypersomnie) äussern, bei dem die Person 10–14 Stunden schläft und trotzdem erschöpft bleibt, oder als quälende Schlaflosigkeit (Insomnie) mit frühem Erwachen und Grübeln.

Der typische Verlauf



Was Sie als Angehörige tun können

Als Angehörige bemerken Sie Schlafveränderungen oft als Erste. Das Problem: Wenn Sie dies in der beginnenden Manie ansprechen, stossen Sie oft auf Unverständnis ("Mir geht es doch super!").

- **Vorab klären:** Besprechen Sie in einer stabilen Phase, dass Sie auf den Schlaf achten werden. Vereinbaren Sie, was passiert, wenn das Warnsignal eintritt (z. B. Arzt anrufen, Notfallmedikation).
- **Beobachten, nicht kontrollieren:** Teilen Sie Ihre Beobachtung sachlich mit ("Mir fällt auf, dass du seit zwei Nächten kaum schläfst"), ohne Vorwürfe zu machen.
- **Reize reduzieren:** Helfen Sie, abends Ruhe einkehren zu lassen (weniger Licht, keine aufregenden Diskussionen).



Grenzen der Verantwortung

Sie können warnen und unterstützen, aber Sie können niemanden zum Schlafen zwingen. Wenn die Situation eskaliert, greift der Krisenplan.