

Umgang mit Depression

Wenn Suizidgefahr
dazukommt

Bei Suizidgedanken, Verabschiedungen oder konkreten Hinweisen: **direkt fragen und sofort 144 oder 0800 33 66 55 anrufen.**

Sofortkontakte

NOTFALLDIENST ZÜRICH 0800 33 66 55 Wenn die Lage ernst ist oder Sie professionelle Einschätzung brauchen	SANITÄT 144 Bei akuter Suizidgefahr oder wenn niemand mehr sicher ist	DARGEBOTENE HAND 143 Wenn Sie selbst sofort mit jemandem sprechen müssen
--	---	--

1 Kurz präsent sein statt drängen	2 Weniger Lösungen, mehr Ruhe	144 Bei akuter Suizidgefahr sofort handeln
---	---	--

Orientierung in der Depression

Depression ist nicht bloss Traurigkeit, sondern oft Leere, Schwere und tatsächliches Nicht-Können. Was hilft: weniger Druck, weniger Lösungen, mehr tragfähige Präsenz.

Woran Sie eine schwere Phase erkennen

- starker Rückzug, stundenlanges Liegen oder Schlafen
- Hoffnungslosigkeit, Sätze wie «Es hat alles keinen Sinn»
- Verlangsamung und kaum Reaktion
- Selbstabwertung wie «Ich bin eine Last»
- Vernachlässigung von Essen, Körperpflege, Alltag

Entscheidend sind Dauer, Tiefe und Veränderung gegenüber dem üblichen Zustand.

Wie Kontakt gelingt

- kurz präsent sein: «Ich bin da. Du musst nichts sagen.»
- Druck rausnehmen, in kleinen Einheiten denken
- Gefühl stehen lassen statt korrigieren
- zur Kontaktaufnahme mit dem Behandlungsteam ermutigen — gemeinsam anrufen
- Medikamenten-Einnahme sanft begleiten («Ich erinnere dich gern»)
- Kindern altersgerecht erklären: es ist eine Krankheit

Hilfreich oft: «Ich kann das nicht lösen, aber ich bin hier.»

Was eher schadet

- «Reiss dich zusammen» oder neue Lösungsvorschläge
- ständiges Nachfragen, ob es schon besser ist
- Vergleiche mit anderen oder Schuldgefühle machen
- Suizidhinweise aus Angst überhören

Wann sofort handeln

Nicht weiter allein tragen, sondern sofort Hilfe holen, wenn Suizidgedanken oder Todeswünsche geäussert werden, Verabschiedungen oder konkrete Hinweise da sind, ein Plan oder Mittel vorhanden sind oder die Person nicht mehr sicher allein ist.

Direkt fragen ist erlaubt: «Denkst du daran, dir etwas anzutun?»

Nächster Schritt

Wenn schwer, aber nicht akut lebensbedrohlich: Behandlungsteam oder Notfalldienst früh einbeziehen. Bei konkreter Suizidgefahr endet der Gesprächsrahmen — Schutz vor Kommunikation. Holen Sie auch für sich selbst Unterstützung, bevor Sie zusammenbrechen.

Weiterführend: Notfallseite · Modul 6: Kommunikation in der Depression

Quellen (Auswahl)

1. NICE (CG185): Bipolar disorder: assessment and management. Last updated 2025-09-02. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg185>
2. DGBS, DGPPN und AWMF (2019/2020): S3-Leitlinie Diagnostik und Therapie Bipolarer Störungen. <https://dgbbs.de/verein/s3-leitlinie/>
3. Yatham et al. (2018): CANMAT/ISBD guidelines for bipolar disorder. Bipolar Disorders. <https://doi.org/10.1111/bdi.12609>