Kritische Zeitpunkte

Wann Belastung besonders hoch ist – und was Sie tun können

AKUTE AUFNAHME/ STATION

Was passiert:
Schock, Unsicherheit, Überforderung, Notfallmodus

Was Sie tun können

- Informationen einfordern, Kontakt zum Behandlungsteam, eigene Bedürfnisse nicht vergessen

ENTLASSUNG (Verantwortungs-übergang)

Was passiert:
Angst vor Überforderung, Unsicherheit über Umgang, Alleinverantwortung

Was Sie tun können

- Entlassungsgespräch einfordern,
- Krisenpläne vereinbaren,
- Nachsorge klären,
- Unterstützungsnetz-werk aktivieren

ERSTE RÜCKFALL-ZEICHEN

Was passiert:
Angst vor erneuter Episode, Hoffnung schwindet, Erschöpfung steigt

Was Sie tun können

- Warnzeichen ernst nehmen,
- Behandlungsteam kontaktieren,
- Krisenpläne aktivieren, eigene Auszeiten nehmen

WAS SIE TUN KÖNNEN:

→ **Bereiten Sie sich auf diese Zeitpunkte vor**
→ **Fordern Sie Einbindung in die Behandlung ein**
→ **Bauen Sie Unterstützungsnetzwerk VOR Krisen auf**
→ **Nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch**

Basierend auf: Schmid et al. (2005); Granek et al. (2016)
Konzeptuelle Synthese für psychoedukative Zwecke