Verstehen

Das Gehirn verstehen

Was bei emotionaler Überflutung passiert.



AMYGDALA - Alarm-Zentrale

Reagiert auf Bedrohung. Löst Kampf-oder-Flucht aus.

Bei BPS: überaktiv, reagiert stärker und schneller.

HIPPOCAMPUS - Erinnerungs-Speicher

Ordnet Erlebnisse zeitlich ein. Unterscheidet Vergangenheit von Gegenwart. Bei Stress: Funktion eingeschränkt.

PRÄFRONTALER KORTEX - Denk-Zentrale

Planung, Impulskontrolle, Reflexion.

Bei Überflutung: vorübergehend offline.

↓ **ÜBERFLUTET**

← **BERUHIGUNG FEHLT** →

↑ **BERUHIGUNG → DENKEN KOMMT ZURÜCK**

Emotionale Überflutung ist keine Absicht, sondern eine neurobiologische Reaktion. Das Gehirn braucht Zeit, um wieder klar zu denken.

LEGENDE

Terracotta = Alarm. Sand = Übergang. Sage = Beruhigung. Pfeile = Wirkungsrichtung.

3 SCHRITTE ZUR BERUHIGUNG

1. Atmen und Wahrnehmen:
4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus. Benennen Sie, was Sie spüren.

2. Pausieren und Bewegen:
Raum wechseln, kurz gehen, Wasser trinken.

3. Fokus und Einordnen:
Erst wenn der Körper ruhig ist, kann das Gespräch weitergehen.

Quelle: Porges (2011); LeDoux (1996). Für Angehörige – Fachstelle Angehörigenarbeit, PUK Zürich – Ch. Egger | Stand: 03.02.2026.

Die visuelle Vorschau bleibt auf Seite 1 erhalten. Die barrierearme Textversion folgt auf den nächsten Seiten.

Das Gehirn verstehen

Bei emotionaler Überflutung übernimmt das Alarm-System. Das Denken kommt erst zurück, wenn der Körper wieder etwas ruhiger ist.

Textversion · Verstehen · Infografik

Das Gehirn-Modell erklärt in einfacher Form, was bei emotionaler Überflutung passiert. Für Angehörige wird dadurch nachvollziehbarer, warum zuerst Beruhigung und erst danach Klärung hilft.

Für Angehörige ist die Grafik vor allem als Einordnungshilfe gedacht: Überflutung ist keine Absicht, sondern eine neurobiologische Reaktion. Deshalb hilft zuerst Beruhigung und erst danach Klärung.

Die drei Bereiche der Grafik

Die Infografik stellt drei Hirn-Bereiche mit ihren Funktionen und ihrer Rolle unter Stress gegenüber.

Amygdala – Alarm-Zentrale

Reagiert auf Bedrohung und löst Kampf oder Flucht aus. Bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung reagiert sie oft stärker und schneller.

Hippocampus – Erinnerungsspeicher

Ordnet Erlebnisse zeitlich ein. Unterscheidet Vergangenheit von Gegenwart. Bei Stress: Funktion eingeschränkt.

Präfrontaler Kortex – Denk-Zentrale

Planung, Impulskontrolle, Reflexion. Bei Überflutung: vorübergehend offline.

Was dann oft passiert

Überflutet

Die Alarmreaktion übernimmt, und der innere Spielraum wird klein.

Beruhigung fehlt

Ohne Beruhigung bleibt das System in Alarm oder Übergang hängen.

Beruhigung → Denken kommt zurück

Wenn der Körper ruhiger wird, wird Denken wieder zugänglicher.

Kernaussage

Worum es bei der Überflutung geht

Emotionale Überflutung ist keine Absicht, sondern eine neurobiologische Reaktion. Das Gehirn braucht Zeit, um wieder klar zu denken.

Orientierung

Was die Grafik verständlich machen will

Wenn Alarm übernimmt, wird Denken enger. Mit Beruhigung kommt Schritt für Schritt wieder mehr Zugang zu Reflexion und Gespräch zurück.

3 Schritte zur Beruhigung

1. Atmen und Wahrnehmen

4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus. Benennen Sie, was Sie spüren.

2. Pausieren und Bewegen

Raum wechseln, kurz gehen, Wasser trinken.

3. Fokus und Einordnen

Erst wenn der Körper ruhig ist, kann das Gespräch weitergehen.

Quelle: Porges (2011); LeDoux (1996).

Für Angehörige – Fachstelle Angehörigenarbeit, PUK Zürich – Ch. Egger | Stand: 03.02.2026.

Lokale PDF-Fassung mit integrierter Textversion, Titel-Metadaten und A4-Ausgabe.