

Prävention und Kontrolle Katheter-assoziiertes Harnwegsinfektionen

Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprä- vention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut

1 Vorbemerkung

§ 23 Abs. 1 Satz 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG) verpflichtet die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO), ihre Empfehlungen aufgrund neuer infektionsepidemiologischer Erkenntnisse stetig weiterzuentwickeln. Außerdem wurden die Kategorien, mit denen die Evidenz einer Empfehlung beschrieben wird, im Jahr 2010 neu gefasst [1]. Beide Regularien waren ein wichtiger Anlass, die bisherige Empfehlung zur Prävention Katheter-assoziiertes Harnwegsinfektionen zu überarbeiten und insgesamt neu zu fassen. Empfehlungen aus der Veröffentlichung aus dem Jahr 1999, die sich in der täglichen Praxis bewährt haben und den Stand von Wissenschaft und Technik wiedergeben, wurden unverändert übernommen [2].

Häufige Anfragen betrafen:

1. Wie oft muss der Auffangbeutel eines Harnableitungssystems gewechselt werden?
2. Was sind geeignete Mittel zur Desinfektion des Auslasses bei Entleerung des Auffangbeutels, bzw. Wechsel des Auffangbeutels?

Beide Fragen betreffen die sachgerechte Anwendung eines Medizinproduktes. Darüber haben Hersteller in der Gebrauchsanweisung erschöpfend Auskunft zu geben (§ 3 Nr. 10 MPG; § 2 Abs. 5 MPBetrV). Deshalb können im Rahmen einer KRINKO-Empfehlung keine eigenen bzw. von den jeweiligen Herstellerangaben abweichende Empfehlungen erfolgen, da sie materielles Recht nicht ersetzen können [3].

1.1 Bezug zu anderen KRINKO-Empfehlungen

Auch andere Empfehlungen der Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention enthalten ergänzende Hinweise zur Umsetzung der nachfolgend getroffenen Aussagen; dies sind namentlich: Händehygiene [4], Anforderungen der Krankenhaushygiene und des Arbeitsschutzes an die Hygienebekleidung und persönliche Schutzausrüstung [5] und Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention zur Surveillance (Erfassung und Bewertung) von nosokomialen Infektionen (Umsetzung von § 23 IfSG) [6].

1.2 Kategorien für die Empfehlungen der KRINKO

Die Definition der Kategorien, die den KRINKO-Empfehlungen zu Grunde gelegt werden, sind nachfolgend in Tab. 1 aufgeführt.

1.3 Internationale Leitlinien zur Prävention Katheter-assoziiertes Harnwegsinfektionen

Die Autorinnen Conway und Larson haben 2012 acht englischsprachige Empfehlungen zur Prävention Katheter-assoziiertes Harnwegsinfektionen (catheter-associated urinary tract infections = CAUTI) verglichen und konstatieren eine bemerkenswerte Konstanz von Empfehlungen über 30 Jahre [7–9]. Weiter stellen sie fest, dass es nach wie vor zu speziellen Fragestellungen nur wenige Studien mit heterogenen Ergebnissen gibt, und in der SHEA (The Society for Healthcare Epidemiology of America)/IDSA (Infectious Diseases Society of America)-Empfehlung aus dem Jahr 2008 sind nur sieben konkrete Handlungsempfehlungen enthalten, die auf mehr als einer randomisierten, kontrollierten Studie basieren [10].

Neuere Publikationen empfehlen u. a. eine Bündelung von Einzelmaßnahmen [11]. Weitere Empfehlungen zur Prävention von CAUTI finden sich auch in den aktualisierten Empfehlungen (epic3) von

Tab. 1 Kategorien in der Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (2010)

Kategorie IA: Diese Empfehlung basiert auf gut konzipierten systematischen Reviews oder einzelnen hochwertigen randomisierten kontrollierten Studien
Kategorie IB: Diese Empfehlung basiert auf klinischen oder hochwertigen epidemiologischen Studien und strengen, plausiblen und nachvollziehbaren theoretischen Ableitungen
Kategorie II: Diese Empfehlung basiert auf hinweisenden Studien/Untersuchungen und strengen, plausiblen und nachvollziehbaren theoretischen Ableitungen
Kategorie III: Maßnahmen, über deren Wirksamkeit nur unzureichende oder widersprüchliche Hinweise vorliegen, deshalb ist eine Empfehlung nicht möglich
Kategorie IV: Anforderungen, Maßnahmen und Verfahrensweisen, die durch allgemein geltende Rechtsvorschriften zu beachten sind

Loveday et al. [12] und in der SHEA/IDSA-Empfehlung von Lo et al. aus dem Jahr 2014 [13].

Die von Conway und Larson gesichteten Empfehlungen stimmen weitgehend (über 30 Jahre) in den folgenden Punkten überein:

- Jede Anlage eines Harnwegskatheters bedarf einer strengen, ärztlichen **Indikationsstellung**.
- Die Technik beim Legen von Harnwegskathetern und bei der Katheterpflege erfordert ebenso wie die Erkennung von Katheter-assoziierten Komplikationen eine regelmäßige **Schulung**.
- Das Legen eines Katheters erfolgt unter **aseptischen Bedingungen**.
- Es sind nur sterile und geschlossene Harnableitungssysteme zu verwenden.
- Katheter sollen **so früh wie möglich entfernt** werden.

2 Risikocharakterisierung

2.1 Epidemiologische Aspekte

Harnwegsinfektionen gehören in Krankenhäusern mit einem Anteil von 23,2% neben den postoperativen Wundinfektionen (24,3%), den unteren Atemwegsinfektionen (21,7%), gefolgt von *Clostridium difficile*-Infektionen (6,4%) und der primären Sepsis (5,7%) zu den häufigsten nosokomialen Infektionen [14, 15]. In 80% der Fälle sind nosokomiale Harnwegsinfektionen mit einem Katheter assoziiert [16], wobei zwischen 12% und 16% aller Krankenhauspatienten im Verlauf ihres Krankenhausaufenthaltes einen Blasenverweilkatheter erhalten [10, 17, 18]. Besonders hoch ist die Prävalenz von Harnwegskathetern auf Intensivstationen [19, 20]. Nach den Daten des Krankenhaus-Infektions-Surveillance-Systems KISS (Infektionssurveillance im Modul ITS-KISS, Berechnungszeitraum Januar 2009 bis Dezember 2013) betrug die Harnwegskatheter-Anwendungsrate (ab Januar 2011) auf diesen Stationen 81,7% (gepoolter arithmetischer Mittelwert). Die Inzidenzdichte der Harnwegsinfektionen belief sich auf Intensivstationen im Zeitraum 2011 bis 2013 auf 0,93 pro

1000 Harnwegskathetertage [21], auf Normalstationen lag der Wert bei 3,79 Harnwegsinfektionen pro 1000 Harnwegskathetertage [22].

Die **tägliche Inzidenz** einer neu erworbenen Bakteriurie bei transurethral katheterisierten Patienten liegt zwischen 3% und 10%, sodass nach 30 Tagen bei der Mehrzahl der Patienten eine Bakteriurie nachzuweisen ist [23]. Der transurethrale Dauerkatheter ist somit der bedeutendste Risikofaktor für eine aufsteigende Harnwegsinfektion wie Urethritis, Prostatitis, Epididymitis, Zystitis, Pyelonephritis, Bakteriämie und Urosepsis [24].

Die Vermeidung von Harnröhrenstrikturen und subvesikalen Infektionen sowie die problemlose Kontrolle von Spontanmiktion und Restharn sind entscheidende Vorteile des suprapubischen Katheters.

Etwa 17% aller Fälle von nosokomialen Bakteriämien sind Folge von Katheter-assoziierten Infektionen der Harnwege. Klinisch relevante Bakteriämien im Sinne einer Urosepsis sind mit einer Mortalität von 10% verbunden [9]. Insgesamt verlängern die CAUTI die Dauer der stationären Behandlung und erhöhen die Morbidität und Mortalität sowie die Behandlungskosten [25, 26].

Bei der klinischen Bewertung von nosokomialen, Katheter-assoziierten Harnwegsinfektionen ist zwischen einer

- asymptomatischen Bakteriurie und
- einer symptomatischen Harnwegsinfektion

zu unterscheiden [27, 28]. Während die symptomatische Infektion grundsätzlich einer Behandlung bedarf, gilt dies für die asymptomatische Bakteriurie nicht. So entwickeln 90% der Patienten mit einer asymptomatischen Bakteriurie keine symptomatische Infektion und bei weniger als 5% kommt es zu einer Bakteriämie [9]. Die antibiotische Behandlung asymptomatischer Bakteriurien bei liegendem Katheter bedarf deshalb einer strengen Indikationsstellung und sollte nur in begründeten Ausnahmefällen (z. B. in der Schwangerschaft und/oder unter Immunsuppression) vorgenommen werden [7].

2.2 Erregerspektrum

Für die Jahre 2009 bis 2013 wurden entsprechend dem KISS als Erreger Harnwegskatheter-assoziiierter Harnwegsinfektionen *E. coli* (43,6%, davon beträgt der ESBL-Anteil 11,8%), *Enterococcus* spp. (23,0%), *P. aeruginosa* (10,7%), *Klebsiella* spp. (10,3%), *Proteus* spp. (9,6%), *S. saprophyticus* (2,2%) und *S. aureus* (3,2%) genannt [29].

2.3 Infektionsquelle

Erregerreservoir der CAUTI sind die endogene Flora des Gastrointestinaltraktes, des Urogenitaltraktes und der Perianalregion des Patienten. Weitere Infektionsquellen können bei Missachtung der Regeln einer aseptischen Vorgehensweise, z. B. durch kontaminierte Medizinprodukte, entstehen [8]. Den Harntrakt erreichen die Erreger dabei entweder *extraluminal*, entlang der sogenannten mucopurulenten Membran zwischen dem Katheter und der Harnröhrenwand oder *intraluminal* aufsteigend bei unsachgemäßer Diskonnektion des geschlossenen Harn-drainagesystems [30, 31].

2.4 Risikofaktoren

Die Definition von Risikofaktoren für die Entstehung von CAUTI ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Einleitung von Präventionsmaßnahmen [9, 11].

Als solche Risikofaktoren sind beschrieben [32–39]:

- die Dauer der Katheterisierung
- eine eingeschränkte Immunität
- ein fortgeschrittenes Lebensalter (> 50 Jahre)
- das weibliche Geschlecht
- die Diskonnektion des geschlossenen Harn-drainagesystems
- die Missachtung von Hygieneregeln bei der Katheterisierung und Katheterpflege
- ein Diabetes mellitus
- eine Niereninsuffizienz

In Abhängigkeit von Faktoren, wie z. B. der Dauer der Katheterisierung, der Harnzusammensetzung, der Diurese und des

Kathetermaterials bildet sich entlang der Katheteroberfläche insbesondere im Innenlumen ein Biofilm, der zu einer Erregerpersistenz führen kann, die sich durch eine Antibiotikatherapie nicht erfolgreich behandeln lässt [40–42].

3 Prävention

3.1 Sozio-ökonomische Aspekte

Der Prävention nosokomialer, Katheter-assoziiierter Harnwegsinfektionen kommt aus individueller Patientensicht als auch aus sozio-ökonomischen Aspekten eine herausragende Bedeutung zu. In den USA schätzt man die zusätzlichen Kosten für eine Episode dieser Infektion auf 600 Dollar und für eine Episode einer Katheter-assoziierten Bakteriämie auf 2.800 Dollar [23]. Entsprechende Daten zu den aufgeführten zusätzlichen Kosten liegen für Deutschland nicht vor.

3.2 Präventionspotential

Es ist davon auszugehen, dass bis zu 70% aller CAUTI durch geeignete Präventionsmaßnahmen verhindert werden könnten [31, 43]. Voraussetzung für eine erfolgreiche Prävention ist eine stringente Surveillance im Hinblick auf die Prävalenz [23, 44]. Zu den wirksamsten Präventionsmaßnahmen gehören in diesem Zusammenhang die Vermeidung unnötiger Katheterisierungen, die tägliche Überprüfung der Indikation und in den Fällen wo ein Katheter unvermeidbar ist, die Beschränkung der Liegedauer auf ein Minimum [31, 45–51]. Als besonders wirksam bezüglich der Prävention hat sich die strikte Umsetzung verschiedener **Interventionsbündel** erwiesen [33, 52–56].

Verschiedene Publikationen zur Wirksamkeit von Interventionsbündeln haben eine Reduktion der Raten von CAUTI bzw. eine Reduktion der Anwendungsraten und/oder Anwendungsdauer von Harnwegskathetern gezeigt [45, 52, 55, 57–64]. In den unterschiedlichen Settings/Risikobereichen wurden jeweils unterschiedliche Maßnahmenbündel eingesetzt. Im informativen Anhang zu dieser Empfehlung werden drei Studien aus verschiedenen Ländern und in verschie-

denen Settings beispielhaft vorgestellt [55, 58, 59].

Das vorrangige Ziel der nachfolgenden Empfehlungen besteht darin, die Häufigkeit infektiöser Komplikationen im Zusammenhang mit dem Katheterismus der Harnblase zu minimieren.

4 Empfehlung der Kommission

4.1 Indikationsstellung für eine Katheterisierung, Liegedauer des Katheters und Interventionsbündel

Die strenge, medizinisch begründete Indikationsstellung und die Beschränkung der Liegedauer eines Katheters auf das medizinisch notwendige Minimum gehören zu den effektivsten und damit wesentlichen Maßnahmen zur Prävention von CAUTI. Die Implementierung von Kombinationen verschiedener Einzelmaßnahmen durch Interventionsbündel ist inzwischen etabliert [9, 11, 46, 65–71].

Als Beispiele für medizinisch begründete Anwendungen eines Katheters gelten [9]:

- akuter Harnverhalt
- Notwendigkeit der Bilanzierung bei schwer kranken Patienten
- Patienten mit urologischen Operationen
- Förderung der Wundheilung im Bereich des äußeren Genitale bei Harninkontinenz
- mehrstündige Operationen mit hohem Flüssigkeitsumsatz
- Palliative Therapie am Lebensende (auf Wunsch des Patienten).

Als Beispiele für unnötige Anwendungen eines Katheters gelten dagegen [11]:

- die Verordnung nur aufgrund einer Harninkontinenz des Patienten und
- eine Verlängerung der Katheterliegedauer, z. B. bei Patienten nach chirurgischen Eingriffen oder nach Abschluss der intensivmedizinischen Überwachung/Bilanzierung.

Die Kommission empfiehlt:

- jede Anwendung eines Blasenkatheters von einer strengen, medizinisch begründeten und ärztlich angeord-

neten Indikation abhängig zu machen und diese zu dokumentieren (Kat. IB),

- die Liegedauer eines Blasenverweilkatheters stets auf ein erforderliches Minimum zu beschränken (Kat. IB),
- das Weiterbestehen einer Indikation für eine Katheterdrainage täglich ärztlich zu überprüfen und zu dokumentieren (Kat. IB),
- in Einrichtungen ohne ständige ärztliche Anwesenheit entsprechende ärztliche Anordnungen regelmäßig zeitnah einzuholen (Kat. II),
- die Einführung von sog. Interventionsbündeln, wobei sich die Verwendung von Checklisten in einigen Studien bewährt hat (Kat. IB).

Bezüglich spezifischer Aspekte bei Patienten mit neurogenen Blasenfunktionsstörungen wird auf die entsprechende Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Urologie aus dem Jahre 2014 verwiesen [72].

4.2 Schulung von Personal und Beachtung aseptischer Arbeitsweisen

Die strenge Beachtung der Regeln der Basishygiene und die regelmäßige Schulung von ärztlichem und pflegerischem Personal ist zur erfolgreichen Prävention von Katheter-assoziierten Infektionen unerlässlich [9, 11, 73–80].

Die Kommission empfiehlt:

- Personen, welche die Katheterisierung vornehmen, zum aseptischen Vorgehen, zum Umgang mit dem liegenden Katheter und in der Erkennung Katheter-assoziiierter Komplikationen regelmäßig zu schulen (Kat. II),
- vor und nach jeder Manipulation am Blasenverweilkatheter oder Drainagesystem eine hygienische Händedesinfektion vorzunehmen (Basishygiene),
- die Katheterisierung aseptisch vorzunehmen (Basishygiene),
- sterile Handschuhe, steriles Abdeckmaterial (Lochtuch), sterile Tupfer, ggf. eine Pinzette zur aseptischen Katheterinsertion, ein Schleimhautantiseptikum für die Dekontamination

der Harnröhrenöffnung und ihrer Umgebung und steriles Gleitmittel zu verwenden (Basishygiene),

- um Urothelschäden zu minimieren, die Katheterstärke an die Maße des Meatus urethrae externus anzupassen (≤ 18 Charr. beim Erwachsenen),
- den Ballon eines Blasenverweilkatheters mit sterilem Aqua dest. nach Herstellerangaben, oder besonders bei kleinen Blockvolumina vorzugsweise mit einer sterilen 8–10%igen Glycerin-Wasserlösung zu füllen und eine Überblockung zu vermeiden (Letztere minimiert das Risiko einer Verklebung des Blockkanals und dichtet die Membranporen des Ballonblocks von innen ab und beugt so einem spontanen Entblocken vor.),
- nur geschlossene Ableitungssysteme einzusetzen, welche die hygienischen Anforderungen an die Probenentnahmestelle für bakteriologische Untersuchungen, an die Rückflusssperre, das Luftausgleichsventil, den Ablassstutzen sowie an das Ablassventil erfüllen (DIN EN ISO 8669-2: 1997-04) (Kat. II),
- durchhängende Schläufen des Ableitungssystems, in denen der Urin länger verweilt, zu vermeiden [81, 82] (Kat. II),
- den Auffangbeutel vor jedem Transport des Patienten zu leeren, vor allem wenn eine Umlagerung des Patienten (z. B. auf eine Trage oder auf einen OP-Tisch) erforderlich ist [81, 82] (Kat. II),
- beim Entleeren des Drainagebeutels auf Spritzschutz und die Verhinderung des Nachtropfens (an der Rückstecklasche) zu achten (Kat. II),
- den Katheter und den Drainageschlauch grundsätzlich, außer bei spezifischen urologischen Indikationen, nicht zu diskonnizieren (Kat. II). Ausnahmen können für mobile Patienten beim Wechsel von einem Beinbeutel und/oder Nachtbeutel bestehen. Dabei sind folgende Maßnahmen zur Desinfektion und Asepsis einzuhalten:
 - die Konnektionsstelle vorher mit einem alkoholischen Präparat zu wisch- oder sprühdesinfizieren,

wenn eine Diskonnektion nicht zu vermeiden ist (Kat. II),

- bei Diskonnektion eine erneute Verbindung von Katheter und Konus des Drainageschlauches nur unter aseptischen Kautelen nach Wisch- oder Sprühdesinfektion mit einem alkoholischen Präparat (z. B. einem Hautdesinfektionsmittel) durchzuführen (Kat. II),
- den Auffangbeutel rechtzeitig zu entleeren, bevor der Harn mit der Rückflusssperre in Kontakt kommt (Kat. II) und dabei aus Gründen des Personalschutzes keimarme Einmalhandschuhe zu tragen (Kat. IV),
- bei der Harnentsorgung den Ablassstutzen nicht mit dem Auffanggefäß in Kontakt kommen zu lassen (Kat. II),
- das Auffanggefäß patientenbezogen einzusetzen und nach der Entleerung desinfizierend zu reinigen (Kat. II).

4.3 Pflege des Meatus urethrae und des Katheters

Die Kommission empfiehlt:

- die Reinigung des Genitales mit Trinkwasser und Seifenlotion ohne Zusatz antiseptischer Substanzen im Rahmen der normalen, täglichen Körperpflege vorzunehmen (Kat. II),
- Inkrustationen des Katheters im Bereich der Urethraöffnung schonend zu entfernen (Kat. II),
- eine Abknickung der Harnableitung (Katheter und Drainageschlauch) zu vermeiden (Kat. II),
- den Auffangbeutel frei hängend ohne Bodenkontakt und stets unter Blaseniveau anzubringen (Kat. II).

4.4 Wechselintervalle

Ein regelmäßiger Wechsel des Katheters oder Auffangbeutels nach festen Intervallen hat bezüglich der Prävention von Katheter-assoziierten Infektionen keine Vorteile gebracht [83, 84].

Die Kommission empfiehlt:

- den Blasenverweilkatheter aus Gründen der Infektionsprävention nicht routinemäßig in festen Intervallen zu

wechseln. Bei Infektion, Inkrustation, Obstruktion, Verschmutzung, technischem Defekt des Katheters/Drainagesystems usw. erfolgt der Wechsel nach individuellen Gesichtspunkten und nach ärztlicher Indikationsstellung (Kat. II),

- keinen routinemäßigen Wechsel des Harnwegskatheters:
 - als festen Bestandteil einer Sepsisevaluation [58]
 - bei Übernahme eines Patienten mit Harnwegskatheter aus einem Pflegeheim [23].
- Im Falle einer Katheter-assoziierten Harnwegsinfektion ist der Katheter wenn möglich zu Beginn (bzw. im Verlauf) der antibiotischen Therapie ganz zu entfernen oder zu wechseln [8, 27, 85] (Kat. II).
- beim Wechseln eines Blasenverweilkatheters stets das gesamte Harnableitungssystem mit auszutauschen (Kat. II).

4.5 Gewinnung von Harnproben und mikrobiologische Überwachung

Die Kommission empfiehlt:

- für die mikrobiologische Diagnostik den Harn nach vorheriger Wischdesinfektion mit einem alkoholischen Präparat nur aus der dafür vorgesehenen patientennahen Entnahmestelle am Drainagesystem zu entnehmen (Kat. II),
- eine bakteriologische Harnuntersuchung dauerkatheterisierter Patienten grundsätzlich nur bei klinischer Symptomatik, vor Operationen am Harntrakt oder aus epidemiologischen Gründen durchzuführen (Kat. II).

4.6 Antibiotische Prophylaxe und Spülungen der Harnblase

Eine antibiotische Prophylaxe, die Verwendung von antiseptischen Substanzen im Harnableitungssystem und die regelmäßige Spülung der Harnblase haben bezüglich der Prävention von Harnwegsinfektionen nach dem Legen eines Katheters keine Vorteile gebracht [9, 11, 65, 86–90].

Die Kommission empfiehlt:

- keine prophylaktische Anwendung von Antibiotika bei Legen eines Dauerkatheters bzw. während der Katheterliegedauer (Kat. II),
- außer bei speziellen urologischen Indikationen (z. B. nach transurethralen Operationen) auf regelmäßige Spülungen der Harnblase bei liegendem Katheter zu verzichten (Kat. II),
- keine Instillation von antiseptischen oder antimikrobiellen Substanzen in das Harndrainagesystem zur Behandlung und Prävention Katheter-assoziiierter Infektionen (Kat. II).

Die Kommission stellt fest:

Es kann keine Empfehlung bezüglich der Ansäuerung des Urins im Sinne der Infektionsprophylaxe abgegeben werden (Kat. III).

4.7 „Blasentraining“ (Abklemmen des Katheters vor der Entfernung)

Ein sog. Blasentraining vor Entfernung eines Katheters ist grundsätzlich unnötig und erhöht möglicherweise die Häufigkeit von Katheter-assoziierten Infektionen [9, 11, 65, 91].

Die Kommission empfiehlt:

- auf ein Blasentraining vor Entfernung des Katheters grundsätzlich zu verzichten (Kat. II).

4.8 Auswahl der Harndrainageform (intermittierender Katheterismus vs. transurethraler oder suprapubischer Blasenverweilkatheter)

Grundsätzlich ist zwischen

- transurethralen Blasenverweilkathetern,
- suprapubischen Blasenverweilkathetern, die mit einem geschlossenen Auffangsystem verbunden sind und
- der intermittierenden transurethralen (Selbst-) Katheterisierung

zu unterscheiden [8, 24].

Zur Prävention von Katheter-assoziierten Infektionen ist ein intermittieren-

der Katheterismus, wo immer dies praktikabel ist, dem Blasenverweilkatheter vorzuziehen. Zu der Frage, ob eine suprapubische Harnableitung gegenüber der transurethralen Ableitung zu einer signifikanten Verringerung von Infektionen beitragen kann, liegen widersprüchliche Ergebnisse vor [7–10, 87, 92, 93]. Zur Schonung der Harnröhre kann es sinnvoll sein, bei absehbarer Langzeitkatheterisierung einen suprapubischen Katheter vorzuziehen [65, 87, 92, 94–97].

Die Kommission empfiehlt:

- vor jeder Anwendung eines Blasenverweilkatheters zu überprüfen, ob alternativ nicht ein aseptischer, intermittierender Einmal- (Selbst-) Katheterismus in Frage kommt (Kat. II),
- eine Schulung des Patienten bzw. der Pflegenden vorzunehmen und möglichst durch geeignetes Informationsmaterial zu ergänzen (Kat. II),
- eine suprapubische Katheterdrainage zur Umgehung und Schonung der Harnröhre bei längerfristig Katheterisierten und nach größeren operativen Eingriffen, insbesondere im kleinen Becken und am Genitale, in Betracht zu ziehen (Kat. II).

4.9 Kathetermaterial bzw. Beschichtung des Katheters

4.9.1 Latex vs. Silikon und weitere

Für den Einmalkatheterismus werden Katheter aus PVC verwendet [98]. Latex ist das Kathetermaterial mit dem höchsten allergenen Potential [99]. Vollsilkon besitzt die höchste Biokompatibilität und -stabilität und ist daher für die transurethrale und suprapubische Langzeitdrainage am besten geeignet [100]. Vollsilkon und Hydrogel-beschichtete Katheter haben Vorteile im Hinblick auf Patientenkomfort und Inkrustationsvermeidung [98, 101].

Jahn et al. führten eine zuletzt 2012 aktualisierte Cochrane-Analyse der verfügbaren Studien (Erwachsene) zum Einfluss des Kathetermaterials auf zahlreiche Endpunkte durch [102]. Dabei ergaben sich für den Endpunkt Harnwegsinfektion keine signifikanten Unterschiede in Abhängigkeit vom Kathetermaterial (Latex vs. Silikon vs. PVC). Allerdings han-

delt es sich zum großen Teil um Studien mit sehr kleiner Patientenzahl. Weitere Hinweise darauf, dass sich Latexkatheter gegenüber Silikonkathetern bezüglich der Rate Katheter-assoziiierter Infektionen unterscheiden, liegen bis heute nicht vor [13, 103, 104].

Die Kommission stellt fest:

- Aus Gründen der Infektionsprävention kann keine Empfehlung zur bevorzugten Verwendung bestimmter Kathetermaterialien gegeben werden (Kat. III).

4.9.2 Hydrogel-beschichteter Katheter vs. Silikon

Hydrogel-beschichtete Katheter scheinen bei langfristiger Anwendung besser toleriert zu werden, es gibt jedoch keinen Hinweis auf einen Vorteil aus Gründen der Infektionsprävention [102, 105].

Die Kommission stellt fest:

- Aus Gründen der Infektionsprävention kann keine Empfehlung zur bevorzugten Verwendung von Hydrogel-beschichteten Kathetern anstelle von nicht beschichteten Kathetern gegeben werden (Kat. III).

4.9.3 Antimikrobiell beschichtete Harnwegskatheter

Johnson et al. fassten 2006 zwölf Studien zu Silber-beschichteten Latexkathetern ($n=9$) oder mit Nitrofurazon-beschichteten Kathetern ($n=3$) in einer systematischen Analyse zusammen und stellten fest, dass alle Studien erhebliche methodische Mängel aufwiesen. Die wichtigste Limitation war, dass in diesen Studien nicht die *symptomatische Harnwegsinfektion* sondern ausschließlich eine *Katheter-assoziierte Bakteriurie* als Endpunkt untersucht wurde [106]. Karchmer et al. [107] untersuchten in einer prospektiven cross-over Studie¹ den Nutzen Silber-impregnierter und Hydrogel-beschichteter Harnwegskatheter auf die Infektionsrate und fanden einen signifikanten Vorteil für den beschichteten Katheter bei aus-

¹ Randomisierte Zuordnung des jeweiligen Kathetertyps zu den Studienstationen für jeweils 6 Monate; Wechsel der Zuordnung nach einer „wash-out“ Phase von einem Monat.

schließlicher Betrachtung der „Normalstationen“ ohne ICU (2,13 vs. 3,12 Infektionen pro 100 Katheter; RR 0,68 CI95 0,54–0,86; $p < 0,01$). In beiden Gruppen traten die Infektionen nach einer medianen Liegedauer von 9 Tagen auf. In einer methodisch gut konzipierten, prospektiven multizentrischen Studie² [103, 104] zum infektionspräventiven Nutzen antimikrobiell beschichteter Harnwegskatheter verglichen die Autoren Silikonkatheter, die mit Silber oder einem Antibiotikum (Nitrofurazon) beschichtet waren, mit einer Kontrollgruppe (Teflon-beschichtete Latexkatheter). In Bezug auf die Rate von symptomatischen Harnwegsinfektionen, die eine antibiotische Therapie erforderlich machten, ergaben sich in den 6 Wochen Beobachtungszeit nach Anlage des Katheters keine signifikanten Unterschiede.

Die Kommission stellt fest:

- Auf Grundlage der verfügbaren Studiendatenlage kann keine Empfehlung zur Verwendung antimikrobiell beschichteter Katheter gegeben werden (Kat. III).

Informativer Anhang

Im Folgenden werden drei Studien aus verschiedenen Ländern und in verschiedenen Settings beispielhaft vorgestellt. Bei diesen waren die Interventionsbündel eingebettet u. a. in Trainings, Qualitätskontroll- und Surveillance-Programme:

Marra et al. [59] untersuchten in einer ICU (Intensivpflegestation) und zwei SDUs (step-down units, intermediäre Stationen) in einem Krankenhaus in Brasilien den Effekt von Interventionen, die zur Reduktion der Inzidenz von Katheter-assoziierten Harnwegsinfektionen implementiert wurden. Dabei wurde u. a. zusätzlich ein Interventionsbündel, bestehend aus den folgenden Komponenten, eingesetzt:

- Zusammenstellung eines „Harnwegskatheter-Insertions-Wagens“
- Händehygiene
- Antiseptik der Haut und des Meatus urethrae mit Chlorhexidin
- Sterilfeld und sterile Handschuhe

- Nur ein Insertionsversuch pro Katheter zulässig (d. h. Einsatz eines neuen Katheters für jeden Versuch)
- Adäquate Befüllung des Blasenverweilkatheter-Ballons
- Tägliche Überprüfung der Notwendigkeit für einen Harnwegskatheter und sofortige Entfernung, wenn er nicht länger benötigt wird.

Die Rate Katheter-assoziiierter Harnwegsinfektionen in der ICU konnte signifikant von 7,6 vor Intervention auf 5,0 pro 1000 Kathetertage nach Intervention reduziert werden und in den SDUs von 15,3 vor Intervention auf 12,9 pro 1000 Kathetertage nach Intervention.

In einer Studie von Rosenthal et al. [55] in 10 pädiatrischen ICUs (PICUs) in sechs Entwicklungsländern kam es nach der Implementierung eines multidimensionalen Infektions-Kontroll-Ansatzes zu einer Reduktion der Raten Katheter-assoziiierter Harnwegsinfektionen um 57 % (von 5,9 auf 2,6 pro 1000 Kathetertage). Dieser Ansatz beinhaltete u. a. ein „Praxisbündel“ zur Prävention Katheter-assoziiierter Harnwegsinfektionen und bestand aus folgenden Interventionen:

- Schulung und Training zu Insertion und Pflege von Blasenverweilkathetern, Alternativen zu Blasenverweilkathetern und Vorgehensweisen bei Katheterinsertion, -management und -entfernung
- Insertion von Harnwegskathetern nur wenn notwendig und Entfernung der Katheter, wenn diese nicht notwendig sind
- Anwendung von Blasenverweilkathetern für perioperative und ausgewählte chirurgische Eingriffe; Monitoring der Urinausscheidung bei kritisch kranken Patienten; Management des akuten Harnverhaltes und der Harnabflussstörung; Unterstützung der Heilung von Dekubitalulzera bei Inkontinenz
- Berücksichtigung anderer Methoden zum Management, einschließlich Urinalkondome oder intermittierende Einmalkatheterisierung, wenn geeignet
- Händehygiene vor Insertion und Manipulation am Harnwegskatheter

- Verwendung des Katheters mit kleinstmöglichem Durchmesser
- Verwendung von Handschuhen, Abdecktuch und Schwämmen; sterile oder antiseptische Lösung zur Reinigung des Meatus urethrae; Packung für den Einzelgebrauch mit sterilem Gleitmittel zur Insertion
- Insertion der Harnwegskatheter unter Anwendung aseptischer Technik und Verwendung steriler Materialien
- Angemessenes Management der Harnwegskatheter, einschließlich sachgemäßer Befestigung des Blasenverweilkatheters, um Verrutschen zu vermeiden; Erhaltung eines sterilen, kontinuierlich geschlossenen Harnableitungssystems; keine Diskonnektion des Katheters und Drainageschlauchs; Ersetzen des Ableitungssystems unter Anwendung aseptischer Technik und nach Desinfektion der Katheterschlauchverbindung, bei Lücken in der aseptischen Technik, Diskonnektion oder Leckage
- Erhaltung eines ungehinderten Urinabflusses
- Den Auffangbeutel jederzeit unterhalb des Blasenniveaus halten
- Regelmäßige Entleerung des Auffangbeutels und Vermeidung des Kontaktes des Ablassstutzens mit dem Sammelbehälter
- Reinigung des Meatus urethrae als Teil der Routinehygiene
- Surveillance von Katheter-assoziierten Harnwegsinfektionen, Einsatz standardisierter Kriterien zur Identifizierung von Patienten mit Katheter-assoziierten Harnwegsinfektionen und Erfassung von Kathetertagen als Denominator

Titsworth et al. [58] führten eine prospektive Interventionsstudie in einer neurologischen ICU in den USA durch. Nach der Implementierung eines evidenzbasierten Präventionsbündels, gemeinsam mit einem kontinuierlichen Qualitätsverbesserungsprogramm, kam es zu einer signifikanten Reduktion der Anwendungsrate von Harnwegskathetern (von 100 % auf 73,3 % während der Interventionsphase) sowie der Rate Katheter-assoziiierter Harnwegsinfektionen von 13,3 auf 4,0 pro 1000 Kathetertage.

² Jugendliche ≥ 16 Jahre und Erwachsene, Liegedauer des Katheters ≤ 14 Tage, 24 Krankenhäuser in Großbritannien.

Tab. 2 Tabellarische Darstellung der beispielhaft vorgestellten Studien

	Marra et al. [59]	Rosenthal et al. [55]	Titworth et al. [58]
Länder	Brasilien	Kolumbien, El Salvador, Indien, Mexiko, Philippinen, Türkei	USA
Studiendesign	Quasi-experimentelle Studie mit unterbrochener Zeitreihe	Vorher-nachher prospektive Kohortenstudie	Prospektive Interventionsstudie
Setting	Eine medizinisch-chirurgische ICU und 2 SDUs in einem Krankenhaus	10 PICUs in 10 Krankenhäusern (Mitglieder des International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC))	Neurologische ICU in einem Krankenhaus
Bündelfaktoren			
Schulung	(X)	X	X
Strenge Indikationsstellung	(X)	X	X
Händehygiene	X	X	X
Asepsis	X	X	X
Geschlossene Harnableitungssysteme	Keine Information	X	X
Erinnerungssysteme („reminder systems“)/ Stopp-Anordnungen („stop orders“)	X	Keine Information	X
Surveillance	(X)	X	(X)
Prüfung der Compliance	Durch Harnwegs-katheter-Checkliste	Monitoring der Durchführung der Händehygiene und anderer Infektionskontrollmaßnahmen	Durch tägliche Katheter-visiten („Foley Rounds“)
Ergebnis			
Signifikante Reduktion der Rate Katheter-assoziiierter Harnwegsinfektionen	Ja	Ja	Ja

ICU = intensive care unit (Intensivpflegestation) SDUs = step-down units (intermediäre Stationen) PICUs = pediatric intensive care units (Pädiatrische Intensivpflegestationen) (X) = ja, wird umgesetzt, ist aber keine Komponente des Interventions-, bzw. Präventionsbündels

Das Präventionsbündel bestand aus:

Vermeidung einer Katheterinsertion (strenge Indikationsstellung)

- Entwicklung von Kriterien für die Indikation einer Katheterinsertion
- Grundsätzliche Entfernung des Harnwegskatheters postoperativ, wenn nicht explizit anders angeordnet
- Prüfung alternativer Methoden (intermittierende Einmalkatheterisierung in Verbindung mit Blasensonographie als bevorzugte Methode gegenüber Blasenverweilkatheter)

Produkt-Standardisierung

- Antimikrobielle Katheter
- Geschlossene Systeme
- Einsatz eines Stabilisierungssystems zur Katheterbefestigung am Bein

Aufrechterhaltung der Kathetersterilität (Asepsis)

- Schulung des Pflegepersonals
- Asepsis bei Katheteranlage und Erhaltung der Kathetersterilität während der Anwendungsdauer

- Auffangbeutel unterhalb des Blasen-niveaus, auch während des Transports, und routinemäßige Entleerung
- Befestigung der Auffangbeutel an der der Tür zugewandten Bettseite
- Vermeidung von Schlaufenbildung im Schlauchsammlersystem
- Gebrauch individueller Entleerungsbehälter
- Händehygiene

Rechtzeitiger Entfernung der Harnwegskatheter

- Begründung des Katheters durch Auswahl einer der anerkannten Indikationen für eine Katheteranlage auf einem vorgedruckten Verlaufsbogen
- Ziel der Katheterentfernung vier Tage nach Anlage, im weiteren Verlauf der Interventionsstudie nach zwei Tagen, dann nach einem Tag, außer bei fortbestehender Indikation
- Von Pflegekräften gesteuertes Protokoll zur Entfernung
- Tägliche Kathetervisiten („Foley Rounds“) zur Überprüfung des Fortbestehens der Indikation und Compliance bezüglich des Präventions-

bündels; Katheterentfernung bei fehlender Indikation

Die Darstellung der Interventionsbündel kann nur als Beispiel dienen, da bei der Zusammensetzung der einzelnen Maßnahmen und der Umsetzung eines Bündels die jeweiligen Bedingungen und Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden sollten.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Einzelmaßnahmen der oben ausführlich beschriebenen Interventionsbündel in der nachfolgenden **Tab. 2** einheitlich sieben übergeordneten Bündelfaktoren zugeordnet.

Die Empfehlungen wurden ehrenamtlich und ohne Einflussnahme kommerzieller Interessengruppen im Auftrag der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention erarbeitet von Herrn Prof. Dr. Joachim Martius (Leiter der Arbeitsgruppe), Agatharied; Herrn Prof. Dr. Martin Exner, Bonn; Herrn Prof. Dr. Hansjürgen Piechota, Minden; Herrn Prof. Dr. Arne Simon, Homburg/Saar; Frau Anna Triphaus, Bremen; Frau Dr. Martina Kraus-Haas (RKI), Berlin.