

|                                                |                                                        |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egbert Schindler                               | Qualitätsmanagement<br>Handbuch                        | <br>SCHINDLER INTENSIVPFLEGE<br>WIR LEBEN MIT DER KRANKHEIT |
| Kennzeichen/<br>Fundstelle:<br>VA - III.5 - 24 | Bezeichnung des Dokumentes:<br><br>Thromboseprophylaxe |                                                                                                                                                |

#### Durchführende:

- Pflegefachkräfte (PFK)/Pflegehilfskräfte (PHK)

#### Pflegeziel:

- Förderung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens
- entstaute Beinvenen
- verbesserter venöser Blutrückstrom
- mehrmals täglich aktivierte Muskelpumpe

#### Indikation:

- bei Immobilität bzw.
- vorliegendem ulcus cruris venosum bzw.
- bei Lähmungen bzw.
- ruhig stellende Lagerung oder Verband bzw.
- bei Varizen (Krampfadern) bzw.
- bei bestehenden Gefäßerkrankungen bzw.
- bei zu geringer Flüssigkeitsaufnahme bzw.
- bei Medikamenteneinnahme, die die Viskosität des Blutes erhöhen bzw.
- bei erhöhter Gerinnungsneigung bzw.
- nach ärztlicher Anordnung

#### Kontraindikation:

- bei Ablehnung des Patienten
- entgegenstehende medizinische Diagnosen
- bei starken Schmerzen oder zunehmender Schmerzsymptomatik, Blau- oder Weißfärbung der Zehen, akute Bewegungseinschränkungen im Bereich des Sprunggelenks, Missempfindungen wie Kribbel- oder Taubheitsgefühle in den Beinen, fehlender Fußpuls

#### Vorbereitung:

- Hände waschen
- Patient informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen bereitlegen

#### Material:

- elastische Binden, Pflaster, Anti-Thrombose-Strümpfe (ATS), Medizinische Kompressionstrümpfe bzw. – verbände (MKS)

#### Durchführung:

- die erste pflegefachliche Einschätzung (bei Aufnahme) zu Thrombosegefährdung erfolgt durch die PFK in den Themenfeldern in der „Strukturierten InformationsSammlung“ (SIS) und es erfolgt bei vorhandenen Problemen eine Aufnahme in die Maßnahmenplanung
- tritt Thrombose oder Thrombosegefährdung später neu hinzu, erfolgt eine Eintragung im Berichtesblatt und die Anpassung der Maßnahmenplanung
- Ist eine Beratung erfolgt, wird dies inhaltlich kurz im zutreffenden Themenfeld beschrieben, später notwendig werdende Beratungen sind im Berichtesblatt zu beschreiben
- grundsätzlich dient das Berichtesblatt zur Erfassung veränderter pflegerischer Situationen als anlassbezogene Evaluation in akuten Situationen oder bei besonderen Ereignissen oder Veränderungen

| Freigabe | Bearbeiter | Datum      | Änderung | Version | Seite | Verteiler |
|----------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| GF       | PDL/QMB    | 01.01.2024 |          | 001     | 1     | Verw./MA  |

|                                                |                                                        |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egbert Schindler                               | Qualitätsmanagement<br>Handbuch                        | <br>SCHINDLER INTENSIVPFLEGE<br>VOLLSTÄNDIGE VERBUNDENHEIT |
| Kennzeichen/<br>Fundstelle:<br>VA - III.5 - 24 | Bezeichnung des Dokumentes:<br><br>Thromboseprophylaxe |                                                                                                                                               |

- Erfolgt das Anlegen des ATS/MKS nicht bei entstauten Venen, ist der Patient schriftlich im Berichtsbogen über diesen Sachverhalt zu informieren: „Mir ist bekannt, dass ich zum Anlegen des ATS/MKS meine Beine mindestens 20 Minuten hochlagern muss, ich verzichte ausdrücklich hierauf. Schaden der aufgrund dieses unsachgemäßen Umgangs entsteht, geht nicht zu Lasten des Pflegedienstes“.
- Bei vorliegendem Ulcus cruris ist zusätzlich nach dem Standard „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“ vorzugehen!

#### Maßnahme der Thromboseprophylaxe:

- Förderung der Mobilität
- herzwärts ausstreichen der Venen (bei der Körperpflege und ggf. vor dem Anziehen von ATS)
- anziehen von ATS/MKS oder Wickeln der Beine erfolgt in Rückenlage durch die PFK, laut ärztlicher Anordnung,
- die Wirksamkeit der Kompression von ATS/MKS ist durch die PFK im Rahmen der Krankenbeobachtung zu prüfen (bspw. Passgenauigkeit der Verbände/Strümpfe, Messungen etc.)
- erzeugen eines Sohlendrucks durch zeitweises Anbringen von Bettverkürzern
- entstauende Lagerung: Unterschenkel mittels Keilmaträtze oder Fußende des Bettes erhöht lagern (ca. 15 cm), mindestens 20 Minuten vor dem Anlegen der ATS/MKS
- Kompressionsbinden als auch Strumpfsysteme sind kontinuierlich (24h) lang zu tragen
- Regelmäßig, spätestens alle 4 Wochen sind Vorfuß-, Knöchel- und Wadenumfang immer an der gleichen Stelle zu messen um den Erfolg der Kompressionstherapie zu überprüfen und Umfangsveränderungen feststellen zu können, die Dokumentation erfolgt im Pflegebericht
- **passive Bewegungsübungen:** mit oberen und unteren Extremitäten, jedes Gelenk durchbewegen
- **aktive Bewegungsübungen:** Aufforderung zu Bewegungen der Zehen, der Füße und der Beine, Wadenmuskulatur anspannen lassen
- **Mobilisation außerhalb des Bettes:** Sitzen am Bettrand, Patient einige Schritte gehen lassen, zu den Mahlzeiten an den Tisch setzen, Körperpflege am Waschbecken durchführen, Steigerung der Mobilisation entsprechend der Arztanordnung und der Belastbarkeit des Patienten
- Antikoagulantengabe laut ärztlicher Anordnung (Medikament zur Verzögerung der Blutgerinnung)
- auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten und ggf. Trinkplan erstellen (mindestens 1,5 l/Tag)
- bei Anlegen eines Kompressionsverbandes immer von distal (körperfern) nach proximal (körpernah) wickeln, vermeiden einer distalen Stauung, den Verband faltenfrei anlegen
- mit den Betroffenen ist ein Beratungsgespräch (siehe Anlage) zu führen. Diese Beratung ist bei Bedarf, jedoch mindestens in halbjährlichen Abständen, zu wiederholen. Sind Patienten oder Angehörigen kognitiv nicht fähig den Inhalt zu verstehen und Hinweise umzusetzen bzw. sind Angehörige nicht erreichbar, so ist das Beratungsblatt einzulegen, im freien Textfeld sind die unternommenen Beratungsaktivitäten einzutragen. Die PFK/PHK handelt dann als Assistenz.
- bei der allgemeinen Betreuung und der Wundversorgung bei einem Dekubitus, einem Ulcus cruris bzw. einem Diabetischen Fußsyndrom ist nach unserem Standard „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“ zu verfahren

| Freigabe | Bearbeiter | Datum      | Änderung | Version | Seite | Verteiler |
|----------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| GF       | PDL/QMB    | 01.01.2024 |          | 001     | 2     | Verw./MA  |




|                                                |                                                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egbert Schindler                               | Qualitätsmanagement<br>Handbuch                        | <br>SCHINDLER INTENSIVPFLEGE<br><small>MIT LERNEN. MIT TEILNAHME.</small> |
| Kennzeichen/<br>Fundstelle:<br>VA - III.5 - 24 | Bezeichnung des Dokumentes:<br><br>Thromboseprophylaxe |                                                                                                                                                              |


#### Nachbereitung:

- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL bzw. diensthabende PFK

#### Anlegen eines Kompressionsverbandes nach Sigg



#### nach Pütter



| Freigabe | Bearbeiter | Datum      | Änderung | Version | Seite | Verteiler |
|----------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| GF       | PDL/QMB    | 01.01.2024 |          | 001     | 3     | Verw./MA  |