
M2 Non-responders have no regional pocket; responders are elevated in every region
ISR (prespecified): OLs in the control top 1 %, observed / expected
up driver genes (data-derived): OLs in the control top 1 %, observed / expected
RB4620 (cont)
RB4658 (cont)
RB4676 (cont)
RB4282 (cont)
RB4350 (cont)
RB4498 (cont)
RB4630 (non-)
RB4653 (non-)
RB4403 (non-)
RB4627 (resp)
RB4401 (resp)
RB4405 (resp)
0.4 1.1 1.0 1.9 0.5 0.0
1.4 1.2 1.0 0.8 2.0 0.0
1.4 0.6 0.9 0.6 1.2 3.9
0.8 0.7 1.3 1.1 0.8 0.0
1.1 1.3 0.6 2.3 0.9 4.5
1.1 1.0 0.9 0.2 1.1 0.0
1.3 1.6 0.7 0.7 1.1 2.6
1.1 0.9 0.5 1.2 0.7 1.5
0.8 0.7 0.7 0.5 0.4 0.5
11.5 8.8 6.3 9.0 6.3 8.2
7.6 4.5 5.9 2.5 6.1 2.3
8.9 9.2 6.0 6.4 6.3 4.6
0.4 1.4 0.4 1.5 0.4 0.0
0.5 0.9 1.4 0.8 1.7 0.0
2.6 0.7 1.4 0.7 1.5 4.7
0.1 0.3 0.5 0.8 0.4 0.7
2.7 3.3 3.1 1.4 2.7 6.8
1.2 0.5 0.5 1.0 0.7 0.6
0.2 1.1 0.8 0.6 0.9 0.0
0.7 2.2 1.2 1.2 3.1 0.7
0.6 0.4 0.6 0.8 0.3 0.0
33.5 29.0 30.1 23.2 25.9 2.5
23.5 12.1 23.2 10.1 17.3 7.6
36.8 37.3 37.1 32.0 26.9 20.4
Thalamus
Fiber tracts
Hypothalamus
Striatum
Cortex
Hippocampus
Thalamus
Fiber tracts
Hypothalamus
Striatum
Cortex
Hippocampus
log2 observed / expected
4
2
0
−2
−4