
A P(responder) per mouse
RB4627 P21
RB4405 P60
RB4401 P60
RB4630 P21
RB4653 P21
RB4403 P60
RB4498 P60
RB4676 P21
RB4658 P21
RB4282 P60
RB4350 P60
RB4620 P21
P > 0.99
P > 0.99
P > 0.99
P = 0.17
P < 0.01
P < 0.01
P = 0.08
P = 0.05
P = 0.04
P < 0.01
P < 0.01
P < 0.01
controls: each scored as if unlabelled
(left out of the reference in turn)
0
5
10
15
20
whole-section OL ISR vs slide controls (control SDs)
B Responding fraction
mean 0.52
90% CI 0.23-0.80
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fraction of mtDSB mice that respond
C Prior sensitivity: P(responder)
default 1.00 0.17 <.01 1.00 <.01 1.00
pi ~ Beta(0.5, 0.5) 1.00 0.18 <.01 1.00 <.01 1.00
pi ~ Beta(2, 2) 1.00 0.16 <.01 1.00 <.01 1.00
pi ~ Beta(1, 3) (few respond) 1.00 0.11 <.01 1.00 <.01 1.00
shift up to 6 SD 1.00 0.67 <.01 1.00 <.01 1.00
shift up to 25 SD 1.00 0.04 <.01 0.99 <.01 1.00
responder spread = control 0.99 0.01 <.01 1.00 <.01 0.99
responder spread up to 5x 1.00 0.34 <.01 1.00 <.01 1.00
two-sided responders 1.00 0.18 0.03 1.00 0.05 1.00
RB4627 R
RB4630 NR
RB4653 NR
RB4401 R
RB4403 NR
RB4405 R
D Rule for the next cohort
predicted P(responder)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
P >= 0.50 at >= 1.11x
P >= 0.90 at >= 1.17x
P >= 0.95 at >= 1.19x
dots: the six mtDSB mice
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
new mouse: ISR fold vs its slide's control mean